

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו - 1986
התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד

פריקאט
תמיסה להזרקה לתוך השריר

הרכב:

כל אמפולה מכילה 1 מ"ל.

כל 1 מ"ל מכיל:

haloperidol 100 mg (as decanoate)

הלופרידול 100 מ"ג (כדקאנואט)

חומרים בלתי פעילים ואלרגניים בתכשיר - ראה סעיף "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה" וסעיף 6 "מידע נוסף".

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

תרופה זו נרשמה לטיפול במחלתך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מחלתם דומה.

1. למה מיועדת התרופה?

פריקאט מיועד לטיפול אחזקה בסכיזופרניה ובהפרעה סכיזואפקטיבית בחולים מבוגרים המיוצבים כעת באמצעות הלופרידול במתן דרך הפה.

קבוצה תרופוטית: הלופרידול שייך לקבוצת האנטי-פסיכוטיים ממשפחת הבוטיירונונים.

2. לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה אם:

- אתה רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל (הלופרידול) או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (ראה סעיף 6 "מידע נוסף").
 - אתה פחות מודע לדברים סביבך או התגובות שלך נעשות איטיות באופן לא רגיל.
 - יש לך פרקינסון.
 - יש לך דמנציה (שיטיון) מסוג דמנציה עם גופיפי לוי ('Lewy body dementia').
 - יש לך מחלה עצבית ניוונית של המוח - Progressive Supranuclear Palsy (PSP).
 - יש לך הפרעה בלב המכונה תסמונת מקטע QT מוארך, או כל בעיה אחרת בקצב הלב אשר מופיעה כממצא חריג בתרשים אק"ג-אלקטרוקרדיוגרם).
 - יש לך אי ספיקת לב או היה לך התקף לב לאחרונה.
 - יש לך רמה נמוכה של אשלגן בדם, אשר לא טופלה.
 - אתה נוטל את אחת התרופות המופיעות ברשימה של תרופות שאין ליטול ביחד עם **פריקאט** (ראה סעיף 2 "תגובות בין-תרופתיות").
- אין להשתמש בתרופה זו אם אחד מהרשומים מעלה נוגע לך. אם אינך בטוח, היוועץ ברופא לפני נטילת התכשיר.

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה

תופעות לוואי חמורות

פריקאט עלול לגרום לבעיות בלב, לבעיות בשליטה על תנועות הגוף או הגפיים ותופעת לוואי חמורה הנקראת 'תסמונת נירולפטית ממאירה'. הוא יכול גם לגרום לתגובות אלרגיות חמורות ולקרישי דם. עליך להיות מודע לתופעות לוואי חמורות בעת שאתה נוטל **פריקאט** מכיוון שאתה עשוי להזדקק לטיפול רפואי דחוף. ראה "תופעות לוואי חמורות" בסעיף 4.

אנשים קשישים ואנשים עם דמנציה

דווחה עלייה קטנה במקרי מוות ושבץ באנשים קשישים עם דמנציה הנוטלים תרופות אנטי-פסיכוטיות. שוחח עם הרופא שלך לפני שתיטול **פריקאט** אם אתה קשיש, במיוחד אם אתה סובל מדמנציה.

לפני השימוש בפריקאט ספר לרופא אם יש לך:

- קצב פעימות לב איטי, מחלת לב, או מישהו מבני המשפחה הקרובה שלך מת באופן פתאומי מבעיות לב.
- לחץ דם נמוך, או חש סחרחורת בעת מעבר למצב ישיבה או עמידה.
- רמה נמוכה של אשלגן או מגנזיום (או אלקטרוליט אחר) בדם. הרופא שלך יחליט כיצד לטפל בזה.
- אי פעם היה לך דימום במוח או אם הרופא אמר לך שהסיכוי שלך ללקות בשבץ גדול משל אנשים אחרים.
- בעיות בכליות, בכבד או בבלוטת התריס.

- אפילפסיה או אם בעבר סבלת מפרוכוסים (עוויות).
- רמה גבוהה של ההורמון פרולקטין בדם, או סרטן העלול להיגרם על ידי רמות גבוהות של פרולקטין (כגון סרטן שד).
- היסטוריה של קרישי דם, או אם למישהו מבני המשפחה שלך יש היסטוריה של קרישי דם.
- דיכאון.

ייתכן כי תזדקק למעקב צמוד יותר, וייתכן שיהיה צורך לשנות את המינון של פריקאט שאתה נוטל. אם אינך בטוח האם אחד המצבים המפורטים לעיל רלוונטי לגבייך, התייעץ עם הרופא שלך או הרוקח טרם נטילת פריקאט.

ילדים ומתבגרים

אין להשתמש בפריקאט בילדים ובמתבגרים מתחת לגיל 18. זאת מאחר שהתרופה לא נחקרה בקבוצת גיל זו.

בדיקות ומעקב

ייתכן שהרופא שלך ירצה להפנות אותך לבדיקות אלקטרוקרדיוגרם (אק"ג) לפני או במהלך הטיפול בפריקאט. בדיקת אק"ג מודדת את הפעילות החשמלית של הלב.

בדיקות דם ייתכן שהרופא שלך ירצה לבדוק את הרמות של אשלגן או מגנזיום (או אלקטרוליט אחר) בדם, לפני או במהלך הטיפול בפריקאט.

אינטראקציות/תגובות בין תרופתיות

אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח. אין ליטול פריקאט אם אתה נוטל תרופות מסוימות לטיפול:

- בעיות בקצב הלב שלך (כגון: אמיודארון, דופטיליד, דיזופיראמיד, דרונדארון, איבוטיליד, כינידין, וסוטלול).
- דיכאון (כגון: ציטאלופראם ואסציטאלופראם).
- בפסיכוזות (כגון: פלופנאזין, לבומפרומזין, פרפנאזין, פימוזיד, פרוכלורפרזין, פרומאזין, סרטינדול, תיורידאזין, טריפלואופרזין, טריפלופרומזין, וזיפרסידון).
- בזיהומים בקטריאליים (כגון: אזיתרומיצין, קלריתרומיצין, אריתרומיצין, לבופלוקסצין, מוקסיפלוקסצין, וטליתרומיצין).
- בזיהומים פטרייתיים (כגון פנטאמידין).
- במלריה (כגון הלופנטרין).
- בחילות והקאות (כגון דולסטרון).
- בסרטן (כגון טורמיפן וונדטניב).

כמו כן, דווח לרופא אם אתה נוטל בפרידיל (לטיפול בכאב בחזה או להורדת לחץ דם) או מתדון (לשיכוך כאבים או לטיפול בהתמכרות לסמים).

תרופות אלו עלולות להגביר את הסיכון לבעיות לב, לכן עליך להתייעץ עם הרופא אם אתה נוטל אחת מתרופות אלו ואל ליטול פריקאט (ראה סעיף 2 "אין להשתמש בתרופה אם").

ייתכן שיידרש מעקב מיוחד אם אתה נוטל ליתיום ופריקאט בו-זמנית.

יש לדווח לרופא מיד ולהפסיק ליטול את שתי התרופות בו זמנית אם אתה סובל מ:

- חום לא מוסבר או תנועות שאינך יכול לשלוט בהן.
- בלבול, חוסר התמצאות (דיסאוריינטציה), כאב ראש, בעיות בשיווי המשקל ותחושת ישנוניות. אלה הם סימנים למצב חמור.

תרופות מסוימות עלולות להשפיע על אופן הפעולה של פריקאט או להגביר את הסיכון לבעיות לב.

דווח לרופא אם אתה נוטל:

- אלפראזולאם או בוספירון (לטיפול בחרדה).
- דולוקסטין, פלואוקסטין, פלובוקסמין, נפזודון, פארוקסטין, סרטלין, St. John's wort (היפריקום פרפורטום) או ונלפאקסין (לטיפול בדיכאון).
- בופופיון (לטיפול בדיכאון או לסיוע בהפסקת עישון).
- קארבאמאזפין, פנוברביטל, או פניטואין (לטיפול באפילפסיה).
- ריפאמפיצין (לטיפול בזיהומים בקטריאליים).
- איטראקונאזול, פוסאקונאזול או ווריקונאזול (לטיפול בזיהומים פטרייתיים).
- טבליות קטוקונאזול (לטיפול בתסמונת קושינג).
- אינדינאביר, ריטונאביר או סקווינאביר (לטיפול בנגיף הכשל החיסוני האנושי - HIV).
- כלורפרומאזין או פרומתאזין (לטיפול בבחילות והקאות).
- וראפאמיל (לטיפול ביתר לחץ דם או בבעיות לב).

כמו כן, דווח לרופא אם אתה נוטל תרופות אחרות להורדת לחץ דם, כגון תרופות משתנות. ייתכן כי הרופא יצטרך לשנות את המינון של פריקאט שאתה נוטל אם אתה נוטל אחת מתרופות אלה.

פריקאט יכול להשפיע על אופן הפעולה של תרופות מהסוגים שלהלן:

ספר לרופא אם אתה נוטל תרופות לצורך:

- הרגעה או לסיוע בהפרעות שינה (תרופות הרגעה).

- טיפול בכאב (משככי כאבים חזקים).
- טיפול בדיכאון (נוגדי דיכאון טריציקליים).
- הורדת לחץ דם (כגון גואנטידין ומתילדופה).
- טיפול בתגובות אלרגיות חמורות (אדרנלין).
- טיפול בהפרעות קשב והיפראקטיביות (ADHD) או בנרקולפסיה (ידועות כתרופות ממריצות).
- טיפול במחלת פרקינסון (כגון לבדופה).
- דילול דם (פנינדיין).

התייעץ עם הרופא טרם נטילת פריקאט אם אתה נוטל אחת מתרופות אלה.

שימוש בתרופה וצריכת אלכוהול

שתיית אלכוהול במהלך נטילת פריקאט עלולה לגרום לישנוניות והפחתת ערנות. משמעות הדבר היא כי עליך לנהוג משנה זהירות לגבי כמות האלכוהול שאתה שותה. התייעץ עם הרופא לגבי שתיית אלכוהול בעת נטילת פריקאט, ודווח לרופא על כמות האלכוהול שאתה שותה.

הריון, הנקה ופוריות

הריון - אם את בהריון, חושבת שאת בהריון או מתכננת להרות, פני לרופא להתייעצות. הרופא עשוי ליעץ לך לא ליטול פריקאט במהלך ההריון. הבעיות שלהלן עלולות להתרחש בילודים של אימהות הנוטלות פריקאט במהלך 3 החודשים האחרונים להריון (השליש האחרון):

- רעד שרירים, נוקשות או חולשת שרירים
- ישנוניות או אי-שקט
- קשיי נשימה או קושי בהאכלה

שכיחותן המדויקת של בעיות אלו אינה ידועה. אם נטלת פריקאט במהלך ההריון ותינוקך מפתח אחת מתופעות לוואי אלו, פני לרופא.

הנקה - התייעצי עם הרופא אם את מיניקה או מתכננת להניק. זאת מאחר שכמויות קטנות של התרופה עלולות לעבור לחלב האם ומשם לתינוק. הרופא ידון עמך בסיכונים וביתרונות של הנקה כאשר את נוטלת פריקאט.

פוריות - פריקאט עלול להגביר את הרמות של הורמון המכונה פרולקטין, אשר עלול להשפיע על הפריין בגברים ובנשים. יש להתייעץ עם הרופא אם יש לך שאלות בעניין זה.

נהיגה ושימוש במכונית

פריקאט עלול להשפיע על היכולת לנהוג ולהשתמש בכלים ובמכונית. תופעות לוואי, כגון תחושת ישנוניות, עלולות לפגוע בערנות, במיוחד בתחילת הטיפול או לאחר מתן מינון גבוה. אין לנהוג או להשתמש בכלים או במכונית כלשהן מבלי לדון בכך עם הרופא תחילה.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה

תרופה זו מכילה 15 מ"ג בנזיל אלכוהול בכל 1 מ"ל תמיסה. בנזיל אלכוהול עלול לגרום לתופעות אלרגיות. התייעץ עם הרופא או הרוקח אם יש לך מחלת כבד או כליות, או אם את בהריון או מיניקה. זאת מאחר שכמויות גדולות של בנזיל אלכוהול יכולות להצטבר בגוף דבר שעלול לגרום לתופעות לוואי (מכונה 'חמצת מטבולית'). תרופה זו מכילה גם שמן שומשום, אשר עלול לגרום, במקרים נדירים, לתגובה אלרגית חמורה.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

יש להשתמש בתכשיר תמיד בהתאם להוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר. המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד, וייתכן שהרופא שלך ייתן לך סוג של הלדול למתן דרך הפה. **אין לעבור על המנה המומלצת.** אין לבלוע.

מנת הפריקאט שתקבל תלויה ב:

- בגילך.
- באם יש לך בעיות בכליות או בכבד.
- בתגובה שלך להלופרידול בעבר.
- בתרופות נוספות אותן אתה נוטל.

מבוגרים

- המינון ההתחלתי שלך יהיה בדרך כלל בין 25 מ"ג ל-150 מ"ג.
- יתכן שהרופא שלך יתאים את המינון בעד 50 מ"ג כל 4 שבועות, על מנת למצוא את המינון שהכי מתאים לך (בדרך כלל יהיה בין 50 מ"ג ל-200 מ"ג כל 4 שבועות).
- אתה לא תקבל יותר מ-300 מ"ג כל 4 שבועות.

קשישים

- אנשים קשישים יתחילו טיפול במינון נמוך יותר, בדרך כלל בין 12.5 מ"ג ל-25 מ"ג כל 4 שבועות.
- יתכן שהמינון יותאם עד שהרופא שלך ימצא את המינון שהכי מתאים לך (שבדרך כלל יהיה בין 25 מ"ג ל-75 מ"ג כל 4 שבועות).
- אתה תקבל מינון גבוה מ-75 מ"ג כל 4 שבועות רק אם הרופא יחליט שזה בטוח עבורך.

כיצד ינתן לך הטיפול בפריקאט

פריקאט ינתן על ידי רופא או אחות. הוא מיועד להזרקה לתוך השריר, כשהזריקה ניתנת עמוק לשריר. מנה אחת של **פריקאט** תשפיע בדרך כלל במשך-4 שבועות. אין להזריק **פריקאט** לתוך הווריד.

אם קיבלת בטעות מינון גבוה יותר

רופא או אחות ייתנו לך את התרופה, כך שהסבירות נמוכה שתקבל יותר מדי ממנה. אם אתה מודאג שוחח עם הרופא או האחות. אם קיבלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מייד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא אריזת התרופה איתך. **אם פספסת מועד מתן של פריקאט או שהפסקת את הטיפול** אין להפסיק הטיפול בתרופה זו אלא אם כן הרופא אמר לך להפסיק, מכיוון שהתסמינים עלולים לחזור. אם פספסת מועד מתן, צור קשר עם הרופא מייד לקבוע מועד חדש.

יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא.

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה בכל פעם שאתה נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם אתה זקוק להם. אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש ב**פריקאט** עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. ייתכן שלא תסבול מאף אחת מהן.

שים לב לתופעות לוואי חמורות

דווח לרופא מייד אם תבחין או תחשוד באחת התופעות שלהלן. ייתכן כי תזדקק לטיפול רפואי דחוף.

בעיות לב:

- הפרעה בקצב הלב – תופעה זו מפסיקה את פעולתו התקינה של הלב ועלולה לגרום לאיבוד הכרה.
- קצב פעימות לב מהיר באופן חריג.
- פעימות לב נוספות.
- תסמונת מקטע QT מוארך.

בעיות לב אינן שכיחות בקרב אנשים המשתמשים ב**פריקאט** (עלולות להופיע בעד משתמש אחד מתוך 100). מקרי מוות פתאומי התרחשו במטופלים שנטלו תרופה זו, אך שכיחותם המדויקת של מקרי מוות אלה אינה ידועה. כמו כן, דום לב (הלב מפסיק לפעום) אירע גם באנשים שנטלו תרופות אנטי-פסיכיות.

בעיה חמורה המכונה "תסמונת נירולפטית ממאירה". תופעה זו גורמת לחום גבוה, נוקשות שרירים חמורה, בלבול ואיבוד הכרה. השכיחות המדויקת של תופעת לוואי זו בקרב אנשים הנוטלים **פריקאט** אינה ידועה.

בעיות בשליטה בתנועות הגוף או הגפיים (הפרעה אקסטר-פירמידלית), כגון:

- תנועות הפה, הלשון, הלסת ולעיתים הגפיים (tardive dyskinesia).
 - תחושת חוסר מנוחה או קושי לשבת במנוחה, תנועות גוף מוגברות.
 - תנועות גוף איטיות או מופחתות, עוויתות או תנועות עוויתיות.
 - רעד או נוקשות בשרירים, הליכה מתנדנדת.
 - אי יכולת לזוז.
 - היעדר הבעת פנים תקינה, הבעה אשר לעיתים נראית כמו מסיכה.
- תופעות אלו הן שכיחות מאוד בקרב אנשים הנוטלים **פריקאט** (עלולות להופיע ביותר ממשתמש אחד מתוך 10). אם תסבול מאחת מתופעות אלו, ייתכן כי תקבל תרופה נוספת.

תגובה אלרגית חמורה העלולה לכלול:

- נפיחות בפנים, בשפתיים, בפה, בלשון או בגרון.
 - קושי בבליעה או בנשימה.
 - פריחה המלווה בגרד (סרפדת).
- השכיחות המדויקת של תגובה אלרגית באנשים המשתמשים ב**פריקאט** אינה ידועה.

קרישי דם בוורידים, בדרך כלל ברגליים (פקקת בוורידים עמוקים -DVT). אלה דווחו באנשים הנוטלים תרופות אנטי-פסיכוטיות. סימני DVT ברגל כוללים נפיחות, כאב ואודם ברגל, אך הקריש עלול להיסחף לריאות, תוך גרימת כאב בחזה וקשיי נשימה. קרישי דם עלולים להיות חמורים מאוד, לכן דווח לרופא מייד אם תבחין באחת מבעיות אלו.

דווח לרופא מייד אם תבחין באחת מתופעות הלוואי החמורות המפורטות לעיל.

תופעות לוואי נוספות

דווח לרופא אם תבחין או תחשוד באחת מתופעות הלוואי שלהלן:

תופעות לוואי שכיחות - תופעות שמופיעות בעד משתמש אחד מתוך 10:

- דיכאון.
- קשיי שינה או תחושת ישנוניות.
- עצירות.
- יובש בפה או הפרשת רוק מוגברת.
- קושי בתפקוד מיני.
- גירוי, כאב או הצטברות מוגלה (מורסה) במקום ההזרקה.
- עלייה במשקל.

תופעות לוואי שאינן שכיחות - תופעות שמופיעות בעד משתמש מתוך 100:

- מתח שרירים חריג.
- כאב ראש.
- תנועה כלפי מעלה של העיניים או תנועות עיניים מהירות שאינן יכול לשלוט.
- בעיות בראייה, כגון ראייה מטושטשת.

תופעות לוואי ששכיחותן אינה ידועה – תופעות ששכיחותן טרם נקבעה:

- בעיה נפשית חמורה, כמו להאמין בדברים שאינם נכונים (אשליות) או לראות, להרגיש, לשמוע, להריח דברים שאינם קיימים (הזיות).
- הרגשה שאתה נסער או מבולבל.
- פרכוסים.
- תחושת סחרחורת, כולל בעת מעבר למצב ישיבה או עמידה.
- לחץ דם נמוך.
- בעיות העלולות לגרום לקשיי נשימה, כגון :
 - נפיחות סביב תיבת הקול, או עווית רגעית של מיתרי הקול העלולה להשפיע על הדיבור.
 - היצרות דרכי האוויר בריאות.
 - קוצר נשימה.
 - בחילות, הקאות.
- שינויים בדם, כגון :
 - השפעה על תאי הדם- ספירה נמוכה של כל סוגי תאי הדם, כולל ירידה חמורה במספר תאי הדם הלבנים ומספר נמוך של טסיות (תאים המסייעים בקרישת הדם).
 - רמה גבוהה של הורמונים מסוימים בדם- פרולקטין והורמון אנטי-דירטי (תסמונת הכרוכה בהפרשה לקויה של הורמון אנטי-דירטי).
 - רמת נמוכה של סוכר בדם.
- שינויים בכבד המופיעים בבדיקות דם ובעיות כבד אחרות, כגון :
 - הצהבת העור או הלבן של העיניים (צהבת).
 - כבד מודלק.
 - אי ספיקת כבד פתאומית.
- הפחתת זרימת נוזל המרה בצינור המרה.
- בעיות בעור, כגון :
 - פריחה או גרד.
 - רגישות מוגברת לאור השמש.
 - היווצרות קשקשים בעור או קילוף העור.
 - דלקת בכלי דם קטנים, שמובילה לפריחה עורית המלווה בבליטות אדומות או סגולות קטנות.
- הזעת יתר.
- פירוק רקמת השריר (תמס שריר).
- התכווצות שרירים, עוויתות או התכווצויות שאינן יכול לשלוט בהן, כולל התכווצות בצוואר הגורמת לראש להתפתל לצד אחד.
- קושי או חוסר יכולת לפתוח את הפה.
- קישיון שרירים ומפרקים.
- חוסר יכולת להטיל שתן או לרוקן את שלפוחית השתן לחלוטין.
- זקפה ממושכת המלווה בכאב בפין.
- קושי להגיע לזקפה ולשמור עליה (אין אונות).
- איבוד החשק המיני או ירידה בחשק המיני.

- שינויים במחזור החודשי (וסת) כגון הפסקת מחזור, או מחזור ארוך, דימום כבד, כאבי מחזור.
- בעיות בשדיים כגון:
 - כאב או חוסר נוחות.
 - ייצור לא צפוי של חלב בשדיים.
 - הגדלת שדיים בגברים.
- נפיחות הנגרמת מאגירת נוזלים בגוף.
- חום גוף גבוה או נמוך.
- בעיות בהליכה.
- ירידה במשקל.

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא ציונה בעלון, עליך להתיעץ עם הרופא.

דיווח על תופעות לוואי:

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או על ידי כניסה לקישור: <https://sideeffects.health.gov.il/> בנוסף, ניתן לדווח לחברת "אוניפארם בע"מ" בכתובת: <https://unipharm.co.il/>

5. איך לאחסן את התרופה?

מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרם להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא. אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש. יש לאחסן מתחת ל- 25°C ובמקום מוגן מאור.

6. מידע נוסף

נוסף על החומר הפעיל התרופה מכילה גם:

Sesame oil, Benzyl alcohol

כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:

האמפולות של פריקאט עשויות מזכוכית כהה ומכילות 1 מ"ל של תמיסה צלולה, שומנית, צמיגה, בגוון צהוב עד חום בהיר. האמפולות ארוזות במגשית הארוזה בקופסת קרטון. כל אריזה מכילה 5 אמפולות.

בעל הרישום ויבואן: אוניפארם סחר בע"מ, ת.ד. 21429 תל אביב, 6121301.

נערך במרץ 2023 בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות: 00 25277 04 026

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.