

توجيه محلول الحقن تحت الجلد بعلم ديلستار

- لا يجوز حقن مقدار دوائي مضاعف كتعويض عن المقدار الدوائي المنسبي.
- إفخض نسبة السكر في دمك وحيينما قم بحقن المقدار الدوائي القائم المخطط لك في الوقت الاعتيادي.
- أذن إرشادات علاج حالة فرط سكر الدم في الإطار نهاية النشرة.

في حال توافقك على استخدام توجيه

- لا يجوز التوقف عن استخدام توجيه بدون استشارة الطبيب.
- إن التوقف عن الاستعمال قد يؤدي لحدوث ارتفاع كبير بنسبة السكر في الدم وإلى حماض كيتوني (تراكم الحمض في الدم).
- لا يجوز تناول الأدوية في العتمة يجب تشخيص طابع الدواء والتاكيد من المقدار الدوائي في كل مرة تناول فيها دواء، ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.
- إذا توفرت لديك أسلطة إضافية حول إستعمال الدواء، إستشر الطبيب، الصيدلي أو الممرضة.

(4) الأعراض الجانبية

- كما بكل دواه، إن إستعمال توجيه قد يسبب أعراضًا جانبية عند بعض المستعملين.
- لا تندesh من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز أن تختفي نسبة السكر في دمك من خلف العيون.

إذا لاحظت علامات تدل على أن نسبة السكر في دمك منخفضة عن اللازم (hypoglycemia) (hipoglycemia)، فعليك أن تتخذ فوراً وسائل رفع نسبة السكر في الدم (انظر)

- يمكن أن يكون خطيراً جداً وهو شائع جداً عند العلاج بالأنسولين (من شأنه أن يؤثر على أكثر من 1 من بين 1000 شخص).
- إذا انتفخت نسبة السكر في دمك أكثر مما يمكنه فقد فقد الوعي.
- إن نسبة منخفضة جداً من السكر قد تسبب ضرباً دماغياً وقد تشكل خطراً على الحياة.

ردو فعل تحسسي خطير (نادرة)، من شأنها أن تؤثر على حتى 1 من بين 1000 شخص). يمكن للأعراض أن تشمل طفح وحكة بكمال الجسم، انتفاخ البطن، القلب، وتعقي، إن ردو الفعل التحسسي الخطير قد تشكل خطراً على الحياة. توجه إلى الطبيب إذا كنت تشعر بعلامات لرد فعل تحسسي خطير.

أعراض جانبية أخرى راجع الطبيب، الصيدلي أو الممرضة، إذا كنت تقاسي من إحدى الأعراض الجانبية التالية:

- إذا كنت تحزن في نفس المكان، فإن الجلد قد يتقلص (lipodystrophy) (lipohypertrophy) (يمكن أن يؤثر على حتى 1 من بين 1000 شخص).

يمكن أن تتشكل درنات تحت الجلد جراء تراكم بروتين يسمى أميلوبود (الداء الشوائب الجلدي)، لا يعرف شيوخه، من الجائز أن يعمل بشكل جيد بالإنسولين الذي تقوم بحقنه إذا كنت تছن في منطقة متدرنة قد تؤدي لفقدان ملوك العين على منع حدوث هذه التغيرات في الجلد.

أعراض جانبية نادرة (يمكن أن تؤثر على حتى 1 من بين 1000 شخص):

- ردو فعل في العينين: إن حدوث تغيير حاد في العينين (تحسن أو تفاقم) في السيطرة على نسب السكر في الدم قد يسبب اضطراباً في الرؤية.

على العينين، مما شدداً وشاداً آثاماً، مما يعيق بصر العينين، إن غالبية ردود الفعل الطفيف للإنسولينات تتزول عادة خلال عدة أيام حتى عدة أسابيع.

أعراض جانبية نادرة جداً (يمكن أن تؤثر على حتى 1 من بين 10000 شخص):

- إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقمت إحدى الأعراض الجانبية، أو عندما

تعاني من عرض جانبي لم يكن في هذه النشرة، عليك استشارة الطبيب.

بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الرابط "بلغ عن أعراض جانبية عقب علاج دوائي" الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يوجه إلى الموقع المباشر للبلدينة

نسبة السكر في الدم.

الأعراض التي تدل على انتفاخ العين أو غير ثابتة، نسب السكر في دمك هي تقريراً عاماً أو غير ثابتة.

قم بتغيير منطقة الجلد التي تحقن فيها إنسولين (من الفخذ إلى أعلى الذراع

مثلًا)، كثيرون من الناس يجدون أن تغيير منطقة الجلد يحسن توزيع إنسولينهم.

كثيرون من الناس يجدون أن تغيير منطقة الجلد يحسن توزيع إنسولينهم.

الآن، قل لك ما يفعله إنسولينك في دمك.

الآن، قل لك

