

عِرْمُونِيَا پَلُوس

كبسولات صلبة

تحتوي كل كبسولة على 0.5 ملغ دوتاستيرайд (dutasteride) و 0.4 ملغ تامسولوسين هيدروكلوريد (tamsulosin hydrochloride). لائحة الماد غير الفعالة ومعلومات الحساسية في المستحضر أنتظر الفقرة 2 «معلومات هامة عن بعض مركيبات الدواء» والفقرة 6 «معلومات إضافية». إقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل إستعمالك للدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي. وصف هذا الدواء للطبيب لا تحطمه للأخرين. فهو قد يضرهم حتى ولو بدا لك أن حالتهم الطبية مشابهة لحالتك. هذا الدواء مخصص للرجال فقط.

(1) لأى غرض مخصوص الدواء؟

- معالجة أعراض تضخم غدة البروستات الحميد (BPH) المتوسطة حتى الشديدة. - التقليل من خطورة إحتباس البول الحاد (AUR) والعملية الجراحية المرسلى لهم أعراض متوسطة حتى شديدة لتضخم غدة البروستات الحميد.

الفصيلة العلاجية: عِرْمُونِيَا پَلُوس هو مزيج من دوائين مختلفين يسمىان دوتاستيرайд و تامسولوسين. ينتمي دوتاستيرайд إلى فصيلة الأدوية المسماة مثبطات 5 - ألفا - ريدوكاتاز ويتنتمي تامسولوسين إلى فصيلة الأدوية المسماة حاجبات ألفا.

عِرْمُونِيَا پَلُوس يستعمل لمعالجة تضخم غدة البروستات لدى الرجال (تضخم غدة البروستات الحميد) - ورم غير سرطاني لغدة البروستات، ناتج عن زيادة إنتاج هورمون يسمى ديهيدروستيروزون. إن تضخم غدة البروستات يمكن أن يؤدى إلى حدوث مشاكل في الجهاز البولي، مثل صعوبة التبول وال الحاجة المتكررة للذهاب إلى المرحاض. كما أنه، قد يبطئ ويسعف من جريان البول، مما دون علاج، هناك خطر أن يحدث حجب تام لجريان البول لديك (إحتباس البول الحاد). هذه الحالة تستلزم علاجاً طبياً فوريًا. يحتاج الأمر أحياناً إجراء عملية جراحية لإزالة أو لتصغير غدة البروستات.

دوستاستيرайд يقلل من إنتاج هورمون يسمى ديهيدروستيروزون. وبذلك يساعد على تصغير غدة البروستات وتخفيف الأعراض. الأمر الذي يقلل من خطورة إحتباس البول الحاد وال الحاجة لإجراء عملية جراحية. تامسولوسين يعمل بواسطة إرخاء عضلات غدة البروستات، وبذلك يسهل التبول ويخفف من الأعراض بسرعة.

(2) قبل إستعمال الدواء

لا يجوز إستعمال عِرْمُونِيَا پَلُوس: - إذا كنت حساساً (الergicي) للمواد الفعالة دوتاستيرайд وتامسولوسين هيدروكلوريد، لمثبطات أخرى للإنزيم 5 - ألفا - ريدوكاتاز، للصواب، لفسق العبيد أو لأى واحد من المركيبات الإضافية التي يحتويها الدواء المفصولة في الفقرة 6 «معلومات إضافية».

- لدى النساء لأن الدواء مخصوص للرجال فقط. - لدى أطفال أو مراهقين دون عمر 18 سنة. - إذا وجد لديك ضغط دم منخفض الذي يسبب لك دوار، الشعور بأنك توشك على الإغماء أو إغماء (انخفاض ضغط الدم الإنصابي). - إذا كان لديك مرض كبدي شديد.

+ إذا كنت تعتقد بان واحد مما ذكر ينطبق عليك، فلا تتناول الدواء وإن لططبيك.

تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء

تحذر مع طببك قبل تناولك عِرْمُونِيَا پَلُوس. في عدة أحيان سريرية، عانى من قصور القلب عدد أكبر من المعالجين الذين تناولوا دوتاستيرайд ودواء آخر يسمى حاجب ألفا، مثل تامسولوسين، مما هو عليه لمعالجين تناولوا دوتاستيرайд لوحده أو حاجب ألفا لوحده. إن قصور القلب معناه أن قلبك لا يضخ الدم كما هو طلوب.

- تأكى من أن طببك يعلم بأن لديك مشاكل في الكبد. إذا حدث لديك أي مرض أثر على الكبد، فمن الجائز أن تحتاج لإجراء فحوص إضافية أثناء تناول عِرْمُونِيَا پَلُوس.

- تأكى من أن طببك يعلم بأن لديك مشاكل شديدة في الكلية.

- عملية جراحية الكاتاراكت (عكر عدسة العين). إذا كنت مقدماً على إجراء عملية إزالة الكاتاراكت، فمن شأن طببك أن يطلب منك التوقف عن تناول عِرْمُونِيَا پَلُوس لمدة معينة قبل العملية. قبل العملية، إحك طبيب العيون الخاص بك بأنك تتناول عِرْمُونِيَا پَلُوس أو تامسولوسين (أو قد تناولت هذه الأدوية في الماضي). سيسطرط طبيب العيون إلى اتخاذ وسائل الحذر الملائمة للمساهمة في منع حدوث اختلالات خلال العملية الجراحية.

- يرجو على النساء، الأطفال والمراهقين تجنب ملامسة كبسولات عِرْمُونِيَا پَلُوس مسيرة لأن المادة الفعالة يمكن أن تتصدى عن طريق الجلد. أشطف منطقة التماس حالاً بالماء والصابون إذا حصلت أي تماس مع الجلد.

- يجب إستعمال الكوندوم أثناء إقامة علاقات جنسية. لقد وجد دوتاستيرайд في السائل المنوي للرجال الذين تناولون عِرْمُونِيَا پَلُوس. إذا كانت زوجتك حامل أو من شأنها أن تكون حامل،

فيتوجب عليك تجنب تعريضها لسائلك المنوي لأن دوتاستيرайд قد يؤثر على التطور السليم لجنين ذكري. لقد ثبت أن دوتاستيرайд يقلل من تعداد النطاف، حجم السائل المنوي ومن حركة النطاف. لذا فإن خصوبة الرجل قد تقل.

السيادة واستعمال الماكنتات قد يسبب عِرْمُونِيَا پَلُوس الدوار لبعض الأشخاص، لذلك فهو قد يؤثر على قدرتك على السيادة أو تشنفيل ماقنات بأمان.

- لا تقوى أو تشنفلي الماكنتات إذا كنت تتعرضاً بهذا التأثير.

الخصوصية لقد ثبت أن عِرْمُونِيَا پَلُوس يقلل من تعداد النطاف، حجم السائل المنوي ومن حركة النطاف. لذا فإن خصوبة الرجل قد تقل.

السيادة واستعمال الماكنتات قد يسبب عِرْمُونِيَا پَلُوس الدوار لبعض الأشخاص، لذلك فهو قد يؤثر على قدرتك على السيادة أو تشنفيل ماقنات بأمان.

- لا تقوى أو تشنفلي الماكنتات إذا كنت تتعرضاً بهذا التأثير.

معلومات هامة عن بعض مركيبات الدواء يحتوى عِرْمُونِيَا پَلُوس على ليسيتين من الصويا، الذي من شأنه أن يحتوى على زيت الصويا. لا تستعمل هذا المستحضر الطبى إذا كنت حساساً لفستق العبيد أو للصويا.

كل كبسولة من عِرْمُونِيَا پَلُوس تحتوى على 299 ملغ بروبيلين چليكول، الذي يعادل 4.27 ملغ/كلغ.

يجب دائماً إستعمال المستحضر حسب تعليمات الطبيب، عليك الاستيقاظ من الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن واثقاً بخصوص المقدار الدوائي وطريقة الملاحة بالمستحضر.

المقدار الدوائي وطريقة الإعتيادي هو عادة كبسولة واحدة يتمتناولها مرة في اليوم، بعد 30 دقيقة من نفس الوجبة بكل يوم.

لا تتجاوز الجرعة الموصى بها.

يجب بلع الكبسولة بشكلها الكامل مع الماء. ممنوع مضغ وممنوع فتح وبعثرة محتوى الكبسولة لأن ملامسة محتوى الكبسولة قد يسبب الالم في الفم أو في الحنجرة.

تعليمات فتح عبوة القينية - لنزاع الغطاء، يجب الضغط نحو الأسفل وفي نفس الوقت التدوير نحو اليسار (ضد إتجاه عقارب الساعة).

تعليمات إغلاق عبوة القينية - يجب وضع الغطاء على الطرف المفتوح من القينية والتدوير نحو اليمين (مع إتجاه عقارب الساعة) حتى الإغلاق التام.

إذا تناولت بالخطأ مقداراً دوائياً أكبر فعليك إستشارة الطبيب أو الصيدلي الخاص بك.

إذا تناولت جرعة دوائية مفرطة أو إذا بلع طفل بالخطأ من الدواء، توجه حالاً إلى الطبيب أو لغرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر علك علبة الدواء.

إذا نسيت تناول هذا الدواء في الوقت المخصص، فلا يجوز تناول جرعة مضاعفة. تناول الجرعة القادمة في الوقت الإعتيادي وإستشر الطبيب.

إذا توقفت عن تناول الدواء يجب موازنته على العلاج كما أوصى به الطبيب. لا يجوز التوقف عن العلاج بالدواء بدون استشارة الطبيب، حتى ولو طرأ تحسن على حالتك الصحية، إذا كنت لا تتناول الدواء بشكل دائم، فإن مراقبة نسب الـ PSA لديك قد تتأثر.

لا يجوز تناول الأدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتأكد من المقدار الدوائي في كل مرة تتناول فيها دواء.

ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

إذا توفرت لديك أسلطة إضافية حول إستعمال الدواء، إستشر الطبيب أو الصيدلي.

4) الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، إن إستعمال عمرونياً بلوس قد يسبب أعراضًا جانبية عند بعض المستعملين. لا تذهب من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز أن تتعاني أي منها.

رد فعل تحسسي

علامات رد الفعل التحسسي يمكن أن تشمل:

- طفح جلدي (الذى يمكن أن يكون حاك)

- شرى (يشبه الطفح الناتج عن ملامسة نبات القرفص)

- إنتفاخ الجفونين، الوجه، الشفتين، الذراعين أو الرجلين.

- بلع الطعام حالاً إذا كنت تلاحظ إحدى تلك الأعراض وتوقف عن إستعمال عمرونياً بلوس.

دواه، الشعور بإيغاء وإنفاس

من شأن عمرونياً بلوس أن يسبب دوار، الشعور بأنك توشك على الإغماء وفي حالات نادرة إغماء. يجب الإنبعاث عند الإنقال من وضعية الاستلقاء أو الجلوس إلى وضعية الجلوس أو الوقوف، إلى أن تعرف كيفية تأثير هذا الدواء عليك، وخاصة في حال إستيقاظك أثناء الليل. إذا كنت شعر بدوران أو توشك على الإغماء في أي مرحلة خلال العلاج، يجب الجلوس أو الإستلقاء حتى زوال الأعراض.

ردود فعل جلدية شديدة

علامات رد الفعل الجلدية الشديدة يمكن أن تشمل: طفح واسع الإنتشار مع حويصلات وتقشر الجلد، خاصة من حول الفم، الأنف، العينين والأعضاء التناسلية (متلازمة ستيفنس- جونسون).

- توجه حالاً إلى الطبيب إذا كنت تلاحظ تلك الأعراض وتوقف عن إستعمال عمرونياً بلوس.

أعراض جانبية إضافية

أعراض جانبية شائعة

- أعراض تظهر لدى حتى مستعمل واحد من كل عشرة رجال يتناولون عمرونياً بلوس:

- عجز جنسي (impotence)، عدم القدرة على الحصول أو الحفاظ على انتصاب القضيب*

- تناقص الرغبة الجنسية (libido)*

- إنتصابات في قذف السائل المنوي، مثلاً إنخفاض كمية السائل المنوي المعدنوق خلال ممارسة العلاقات الجنسية*

- حساسية أو تضخم الثدي (gynecomastia) (دوار

*بعض تلك الأعراض قد تستمر لدى عدد قليل من الأشخاص بعد التوقف عن تناول عمرونياً بلوس.

أعراض جانبية غير شائعة

عمرونياً بلوس:

- قصور القلب (تصبح القلب أقل نجاعة في ضخ الدم للجسم، من الجائز أن يحدث لديك أعراض مثل ضيق تنفس، إرهاق شديد وإنفاس في الكاحلين والرجلين)

- إنخفاض ضغط الدم عند الإنقال لوضعية الوقوف

- تسرب نبض القلب (خفقان القلب)

- إمساك، إسهال، تقيؤات، غثيان

- ضعف عام أو قلة طاقة

- صداع

- إنسداد الأنف، حكة في الأنف أو رشح (التهاب الأنف)

- طفح جلدي، شرى، حكة

- تناقض شعر (عادة من الجسم) أو نمو شعر

أعراض جانبية نادرة

هذه قد تظهر لدى حتى مستعمل واحد من كل 1,000 رجل يتناولون

عمرونياً بلوس:

- إنتفاخ الجفنين، الوجه، الشفتين، الذراعين أو الرجلين (وذمة

وعاء)

- إغماء

أعراض جانبية نادرة جداً

هذه قد تظهر لدى حتى مستعمل واحد من كل 10,000 رجل

يتناولون عمرونياً بلوس:

- انتصاب متواصل ومؤلم للقضيب التناسلي

- ردود فعل جلدية شديدة (متلازمة ستيفنس - جونسون).

أعراض جانبية ذات شدة غير معروفة

لقد ظهرت أعراض جانبية أخرى لدى عدد قليل من الرجال، لكن

شيوعها غير معروف (ليس بالإمكان تقييم شيوعها من المعلومات

المتوفرة):

- نبض غير منتظم أو سريع للقلب (اضطرابات بنظم القلب أو

تسريع النبض أو رجفان أذيني)

- ضيق تنفس

- إكثار

- ألم وانتفاخ في الخصيتين

- رعاف

- طفح جلدي شديد

- تغيرات في الرؤية (تشوش الرؤية أو اختلال في الرؤية)

- جفاف الفم

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقمت إحدى الأعراض الجانبية،

أو عندما تعانى من عرض جانبي لم يذكر في هذه المنشورة،

عليك إستشارة الطبيب.

التبليغ عن أعراض جانبية

بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط

على الرابط التالي: <https://sideeffects.health.gov.il/>

بالإضافة لذلك، بالإمكان تبليغ شركة "يونيفارم.م.ض" على العنوان:

<https://unipharm.co.il/>

5) كيفية تخزين الدواء

- تجنب التسميم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان

مغلق بعيداً عن متناول أيدي و المجال رؤية الأطفال و/أو الرضع،

وذلك لتقلدي إصابتهم بالتسوس. لا تسبب التسميم تعلميات

صريحة من الطبيب.

- لا يجوز إستعمال الدواء بعد إنقضاء تاريخ الصلاحية (exp.

date) الذي يظهر على عليه الكرتون والقينية. يشير تاريخ

الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

- يجب تخزين دون 25 درجة مئوية. يجب إستعمال خلال 90

يوماً من الفتح للمرة الأولى وبما لا يتجاوز تاريخ انتهاء صلاحية

المستحضر.

6) معلومات إضافية

تحتوي الدواء بالإضافة للمواد الفعالة أيضاً:

غلاف الكبسولة الصلبة:

Black Iron Oxide (E172); Red Iron Oxide (E172);

Titanium Dioxide (E171); Yellow Iron Oxide (E172); Gelatin.

داخل الكبسولة الصلبة:

Propylene Glycol Monocaprylate, Type II;

Cellulose microcrystalline; Gelatin; Glycerol;

Metacrylic acid - ethyl acrylate copolymer (1:1)

dispersion 30 percent; Silica, colloidal hydrous;

Diethyl sebacate; Titanium dioxide (E171); Calcium

stearate; Polysorbate 80; Butylhydroxytoluene

(E321); Triglycerides (Medium chain); Soy Lecithin

(may contain soya oil).

حبر أسود:

Shellac; Black Iron Oxide (E172); Propylene Glycol (E1520); Concentrated Ammonia solution;

Potassium Hydroxide.

- كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العلبة:

هذا الدواء هو عبارة عن كبسولة مطاولة صلبة مع حسم بلون

بني وغطاء بلون بيج مطبوع عليه C001 بالحبر الأسود.

الكبسولات معبأة ضمن قنينة ذات غطاء يصعب فتحه.

الكبسولات متوفرة بعلب ذات 7-30- و-90 كبسولة. من الجائز

الأتسوق كافة أحجام العلب.

- صاحب الإمتياز والمستورد: يونيفارم للتجارة م.ض، ص.ب.

21429 تل أبيب، 6121301.

- تم إعدادها في كانون الثاني 2023 بموجب تعليمات وزارة

الصحة.

- رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة:

166 88 36264 00