

ערכומוניה פלוס כמוסות קשיות

כל כמותה של **ערכומוניה פלוס** מכילה 299 מ"ג פרופילין גליקו, אשר מתקבל ב-4.27 מ"ג/ק"ג.

3. כיצד תשמש בתורפה?

יש להשתמש בתכשיר תמיד בהתאם להוראות הרופא. עלך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אין בטוח בנסיבות המינוי ואופן הטיפול יקבע על ידי הרופא בלבד.

המינוי המוגבל בדרך כלל הוא כמושה אחת הניתנת בעם בימי, 30 דקוט' לאחר אורה הארוחה בכל יום.

אין לעבור על המונה המומלצת

יש לבשלו את הכמותה בשלמותה עם מים. אסור לעלום ואסור לפתח ולפזר את תוכן הכמותה כי מע עם תוכן הקומוסה עלול לגרום לאככים בפה או בגרון.

ההוראות פיתוח אריזת הבקבוק – כדי להסיר את הפיק. יש להרחוץ מטה וbone-אמני לשובב שמאלה (נגד כיוון השעון).

ההוראות סגירת אריזת הבקבוק – יש להניח את הפיק על הקצה הפתוח של הבקבוק ולשובב לכיוון ימין (בכיוון השעון) עד לסגירה מלאה.

אם נטלת בטעות מינוי גבוה יותר עליך להיוועץ ברופא או ברוקח שלך.

אם נטלת מנת יתר או אם בטעתה בעלך מן התורופה, פנה מיד לרופא או לחדר מيون של בית החולים והבא אריזת התורופה איתך.

אם שחתה ליטול תורופה זו בזמן המיעוד, אין ליטולמנה.

כפליה. קח את המונה הבאה בדופן הרגיל והיוועץ ברופא.

אם אתה מפסיק את **נטילת התורופה** יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא. גם אם חל שיפור במצב בריאותך, אין להפסיק את הטיפול בתורופה ללא התיעיצות עם הרופא.

אם איןך נועל את התורופה באופן קבוע, הניטור של רמות PSA-שלך עשוי להיות מושפע.

אין ליטול תורופות בחושך! בדוק את התוויות והמנה בכל פעילותה跟你ות תורופה. הרוכב משקפיים אם אין פיק מהר. קיימת שזרמת השתן שלך תחסם לחלטיין (אץ' רופיה). מצב זה מחייב טיפול רפואי מיידי.

עליך שצורך בתייחות להסתת את הדנטיניות של בולוטת הערכומוניה.

דוטאסטטריד מקטינה את הייצור של ההורמון הנקריא דהידרוציטוסטנון ובכך מסייעת להקטנת בלוטת הערכומוניה ולהקלת על ההסתמנים. הדבר יפחית את הסיכון לצרפתה והרזה את החזרה. טומסולטין פועלן מכך על מנת השתן של הרופאים ומשפרת בהירותם את התסמים.

מקלה על הזרמת השתן ומשפרת בהירותם את התסמים.

2. לפני השימוש בתורופה

אין להשתמש בערכומוניה פלוס:

- אם אתה מטופל בגלדי (��נוך גלדי) לחומרם הפעילים דוטאסטטריד וטומסולטין הידרוכולוריד, למרכיבים אחרים לאגדים-5-אלפא-דרוקטاز, פולוין, לבוטני או כל מהר מכיל התורופה כמפורט בסעיף 6 "מידע נסף".

- בשים (מכיוון שהתרופה מօעדת לגברים בלבד).

- בילדים מ-18 שנים ומעלה.

- אם יש לך לחץ דם נורם שגורם לך לסתורות, לשחרשה שאירה עמד להתעלף (תת לחץ דם אורותוסטט). אם יש לך מחלת כבד חמורה.

← אם אתה חושב שאתה מוגע לך, אל תיטול את התורופה וספר לרופא שלך.

אזהרת מיחוזות הנוגעות לשימוש בתורופה.

שחם עם מחקרים קליניים, יותר מטופלים שנשלו-

דוטאסטטריד ותורופה אחורית הנקריאת מינימום גודלה בולוטת טומסולטין,חוואיסקויקת לב מארט טופלים שנשלו-

dotastatrid בלבד או חוםם אלפא בלבד. אי ספיקת לב פירושה לשילובו להוביל לכך השחתה, לא-

דו-אילריה של יונד און מזירים דם כנדראש. אם יש לך לחץ דם נורם שגורם לך לסתורות,

שחצרך לעבר בדיקות נוספת בזמן נטילת ערכומוניה פלוס.

דו-אילריה שלך יודע אם יש לך בעיתות כליה-

תינוקות (עכירות של עדשות העין). אם אתה

עתיד לעבורי ויתח על הסורת קרטרקט, הרופא שלך יודע במשך תקופה

לבקש מפרק פנוי הנינו. לנבי הנינו, ספר ליטול ערכומוניה פלוס או טומסולטין פולוין,

שלך עתה נוטל ערכומוניה פלוס או טומסולטין פולוין, שנטלת תרופה אלה בעבר. רופא העיניים יצטרך

לנקוט באמצעי ההיררכיה המתאים על מנת לסייע

למנוע סיבוכים במליה הנינו.

נשים, ילדים ומתבגרים להיבנעם מגע עם

כמוסות ערכומוניה פלוס או מפעני השחרור הפעיל,

יכול להשפיע על תפקודו תקינה של העור, את נפה

מצאו כידוטאסטריד מוריידה את ספירת הזרע, את נפה נחל הרוע והתונתיתות שלו. הדבר עלול להפחית את הפוריות שלך.

PSA פלוס משפיינע על בדיקת דם-**L**

לגיילו סרטן בולוטת הערכומוניה. הרופא שלך יודע בלהיות מודע להשפעה זהה על הזרע, יכל להקלת

הברורות האלה כולהן או עשויה לסייע בהרין, או שגורם בדיקה זו על מנת לאלו סרטן בולוטת הערכומוניה.

dotastatrid על דרכו של דריך העור. שוטר את אזור המגע מיד.

השתמש בקונדומים בעת מגע מיני. dotastatrid נמצא בוגרם עם סיכון מוגבר לרטרון בולוטת הערכומוניה.

במחקר קליני בוגרים עם סיכון מוגבר לרטרון בולוטת הערכומוניה, שגרם נטול דוטאסטטריד, שגרם מוגבר לרטרון בולוטת הערכומוניה והוא שגורם בדקה דג'ון סרין.

עררכומוניה פלוס שעשויה לגרום להגדלה ולגרושים בשד.

אם הדבר יופר מוגבר לרטרון, או אם אתה מב奸 בגושם

בשד או בהפרשה מן הפטמה שגורם לזרע של שארת סימני

שלב עיריה נרחבת ורחבת. שוטר את אזור המגע מיד.

← פנה לרופא או לרופא אחר אם יש לך שאלות כלשהן בנוגע לנטילת ערכומוניה פלוס.

ילדים ומתבגרים

אין להשתמש בערכומוניה פלוס בילדים ובמתבגרים

תחת גיל 18.

אינטראקציות/תגובה בין תרופות:

אם אתה לוקה, או אם אתה לוקה לאחרונה, תרופות אחרות

כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על-

לרופא או לרופק. במיוחד אם אתה לוקה את התורופה

הboveות:

אין ליטול ערכומוניה פלוס (טיפול בולוטת ערכומוניה מוגדלת)

או בלחץ דם (גבוהה).

עררכומוניה פלוס איניה מומלצת עם התרופות הבאות:

- **קטוקונאזול** (גולד דיקאון), שימושה לטיפול בזיהומי פטריטיים

תרופות מסוימות שישוית להגבירם עם ערכומוניה פלוס, דבר

העלול להעלאת את הסבירות שירוי לך תופעת

dotastatrid על דרכו של דריך העור, את נפה נחל הרוע והתונתיתות שלו. הדבר עלול להפחית את הפוריות שלך.

עררכומוניה פלוס שעשויה לגרום להגדלה ולגרושים בשד.

אם הדבר יופר מוגבר לרטרון, או אם אתה מב奸 בגושם

בשד או בהפרשה מן הפטמה שגורם לזרע של שארת סימני

שלב עיריה נרחבת ורחבת. שוטר את אזור המגע מיד.

← פנה לרופא או לרופא אחר אם יש לך שאלות כלשהן בנוגע לנטילת ערכומוניה פלוס.

פירות

נמצא ערכומוניה פלוס עלולה לגרום להגדלה ולגרושים בשד.

אם הדבר יופר מוגבר לרטרון, או אם אתה מב奸 בגושם

בשד או בהפרשה מן הפטמה שגורם לזרע של שארת סימני

שלב עיריה נרחבת ורחבת. שוטר את אזור המגע מיד.

← פנה לרופא או לרופא אחר אם יש לך שאלות כלשהן בנוגע לנטילת ערכומוניה פלוס.

רנטגן, נקה ופוריות

עררכומוניה פלוס אסורה לשימוש בנשים.

הירין

שנים בhiriron (או שעשווית להירין) חייבות

להימנע מגע עם כמוסות Dolofant.

dotastatrid נטול ערכומוניה פלוס או טומסולטין פולוין,

העלם מלחשוף אותה לירין או שגורם לזרע של שארת סימני

שלב עיריה נרחבת ורחבת. שוטר את אזור המגע מיד.

← פנה לרופא או לרופא אחר אם יש לך שאלות כלשהן בנוגע לנטילת ערכומוניה פלוס.

פירות

נמצא ערכומוניה פלוס עלולה לגרום להגדלה ולגרושים בשד.

אם הדבר יופר מוגבר לרטרון, או אם אתה מב奸 בגושם

בשד או בהפרשה מן הפטמה שגורם לזרע של שארת סימני

שלב עיריה נרחבת ורחבת. שוטר את אזור המגע מיד.

← פנה לרופא או לרופא אחר אם יש לך שאלות כלשהן בנוגע לנטילת ערכומוניה פלוס.

רנטגן, נקה ופוריות

עררכומוניה פלוס אסורה לשימוש בנשים.

הירין

שנים בhiriron (או שעשווית להירין) חייבות

להימנע מגע עם כמוסות Dolofant.

dotastatrid נטול ערכומוניה פלוס או טומסולטין פולוין,

העלם מלחשוף אותה לירין או שגורם לזרע של שארת סימני

שלב עיריה נרחבת ורחבת. שוטר את אזור המגע מיד.

← פנה לרופא או לרופא אחר אם יש לך שאלות כלשהן בנוגע לנטילת ערכומוניה פלוס.

פירות

נמצא ערכומוניה פלוס עלולה לגרום להגדלה ולגרושים בשד.

אם הדבר יופר מוגבר לרטרון, או אם אתה מב奸 בגושם

בשד או בהפרשה מן הפטמה שגורם לזרע של שארת סימני

שלב עיריה נרחבת ורחבת. שוטר את אזור המגע מיד.

← פנה לרופא או לרופא אחר אם יש לך שאלות כלשהן בנוגע לנטילת ערכומוניה פלוס.

פירות

נמצא ערכומוניה פלוס עלולה לגרום להגדלה ולגרושים בשד.

אם הדבר יופר מוגבר לרטרון, או אם אתה מב奸 בגושם

בשד או בהפרשה מן הפטמה שגורם לזרע של שארת סימני

שלב עיריה נרחבת ורחבת. שוטר את אזור המגע מיד.

← פנה לרופא או לרופא אחר אם יש לך שאלות כלשהן בנוגע לנטילת ערכומוניה פלוס.

פירות

נמצא ערכומוניה פלוס עלולה לגרום להגדלה ולגרושים בשד.

אם הדבר יופר מוגבר לרטרון, או אם אתה מב奸 בגושם

בשד או בהפרשה מן הפטמה שגורם לזרע של שארת סימני

שלב עיריה נרחבת ורחבת. שוטר את אזור המגע מיד.

← פנה לרופא או לרופא אחר אם יש לך שאלות כלשהן בנוגע לנטילת ערכומוניה פלוס.

פירות

נמצא ערכומוניה פלוס עלולה לגרום להגדלה ולגרושים בשד.

אם הדבר יופר מוגבר לרטרון, או אם אתה מב奸 בגושם

בשד או בהפרשה מן הפטמה שגורם לזרע של שארת סימני

שלב עיריה נרחבת ורחבת. שוטר את אזור המגע מיד.

← פנה לרופא או לרופא אחר אם יש לך שאלות כלשהן בנוגע לנטילת ערכומוניה פלוס.

פירות

נמצא ערכומוניה פלוס עלולה לגרום להגדלה ולגרושים בשד.

אם הדבר יופר מוגבר לרטרון, או אם אתה מב奸 בגושם

בשד או בהפרשה מן הפטמה שגורם לזרע של שארת סימני

שלב עיריה נרחבת ורחבת. שוטר את אזור המגע מיד.

← פנה לרופא או לרופא אחר אם יש לך שאלות כלשהן בנוגע לנטילת ערכומוניה פלוס.

פירות

נמצא ערכומוניה פלוס עלולה לגרום להגדלה ולגרושים בשד.

אם הדבר יופר מוגבר לרטרון, או אם אתה מב奸 בגושם

בשד או בהפרשה מן הפטמה שגורם לזרע של שארת סימני

שלב עיריה נרחבת ורחבת. שוטר את אזור המגע מיד.

← פנה לרופא או לרופא אחר אם יש לך שאלות כלשהן בנוגע לנטילת ערכומוניה פלוס.

פירות

נמצא ערכומוניה פלוס עלולה לגרום להגדלה ולגרושים בשד.

אם הדבר יופר מוגבר לרטרון, או אם אתה מב奸 בגושם

בשד או בהפרשה מן הפטמה שגורם לזרע של שארת סימני

שלב עיריה נרחבת ורחבת. שוטר את אזור המגע מיד.

← פנה לרופא או לרופא אחר אם יש לך שאלות כלשהן בנוגע לנטילת ערכומוניה פלוס.

פירות

נמצא ערכומוניה פלוס עלולה לגרום להגדלה ולגרושים בשד.

אם הדבר יופר מוגבר לרטרון, או אם אתה מב奸 בגושם

בשד או בהפרשה מן הפטמה שגורם לזרע של שארת סימני

שלב עיריה נרחבת ורחבת. שוטר את אזור המגע מיד.

← פנה לרופא או לרופא אחר אם יש לך שאלות כלשהן בנוגע לנטילת ערכומוניה פלוס.

פירות

נמצא ערכומוניה פלוס עלולה לגרום להגדלה ולגרושים בשד.

אם הדבר יופר מוגבר לרטרון, או אם אתה מב奸 בגושם

בשד או בהפרשה מן הפטמה שגורם לזרע של שארת סימני

שלב עיריה נרחבת ורחבת. שוטר את אזור המגע מיד.

← פנה לרופא או לרופא אחר אם יש לך שאלות כלשהן בנוגע לנטילת ערכומוניה פלוס.

פירות

נמצא ערכומוניה פלוס עלולה לגרום להגדלה ולגרושים בשד.

אם הדבר יופר מוגבר לרטרון, או אם אתה מב奸 בגושם

בשד או בהפרשה מן הפטמה שגורם לזרע של שארת סימני

שלב עיריה נרחבת ורחבת. שוטר את אזור המגע מיד.

← פנה לרופא או לרופא אחר אם יש לך שאלות כלשהן בנוגע לנטילת ערכומוניה פלוס.

פירות

נמצא ערכומוניה פלוס עלולה לגרום להגדלה ולגרושים בשד.

אם הדבר יופר מוגבר לרטרון, או אם אתה מב奸 בגושם

בשד או בהפרשה מן הפטמה שגורם לזרע של שארת סימני

שלב עיריה נרחבת ורחבת. שוטר את אזור המגע מיד.

← פנה לרופא או לרופא אחר אם יש לך שאלות כלשהן בנוגע לנטילת ערכומוניה פלוס.

פירות