

- ألم عند التبول يترافق بدم في البول.
- زيادة نسبة الشحوم.

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقمت إحدى الأعراض الجانبية، أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة، عليك استشارة الطبيب.

التالي عن أعراض جانبية

بالممكان التالي عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "تبليغ عن أعراض جانبية عقب ملاج روائي" الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يوجهك إلى النموذج المباشر للتبليغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق تصفح الرابط:

<https://sideeffects.health.gov.il>

بإضافة لذلك، بالإمكان التبليغ لشركة پاداچیس بواسطة العنوان التالي: padagis.co.il

5 كيفية تخزين الدواء؟

- تحفظ التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي و المجال رؤية الأطفال وأو الرضع، وذلك لتفادي إصابتهم بالتسمم. لا تنسى التقييد بدون تعليمات صريحة من الطبيب.
- لا يجوز إستعمال الدواء بعد انتهاء تاريخ الصلاحية (exp. date) (الذي يظهر على ظهر العبوة، كيس الألومونيوم واللوبيدة (بليستر). بشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.
- يجب تخزين دون 25 درجة مئوية.
- بعد فتح كيس الألومونيوم الذي يغلف اللويهات (بليستر) بالإمكان إستعمال الكبسولات لمدة 3 أشهر، لكن بما لا يتجاوز تاريخ انتهاء الصلاحية.
- يوجد داخل كيس الألومونيوم كيس ماص للرطوبة. لا يجوز بعه أو إخراجه من كيس الألومونيوم.

6 معلومات إضافية:

يحتوي الدواء بالإضافة للمركب الفعال أيضاً على:
تاكتروسل 0.5 ملخ كبسولات

Lactose monohydrate, gelatin, titanium dioxide, magnesium stearate, croscarmellose sodium, hypromellose, yellow iron oxide, sodium lauryl sulfate, sorbitan monolaurate.

تاكتروسل 1 ملخ كبسولات

Lactose monohydrate, gelatin, croscarmellose sodium, hypromellose, magnesium stearate, titanium dioxide, red iron oxide, sodium lauryl sulfate, sorbitan monolaurate.

تاكتروسل 5 ملخ كبسولات

كل كبسولة من تاكتروسل 0.5 ملخ تحتوي على 48.489 ملخ لكتوز مونوهيدرات و- 0.021 ملخ صوديوم كل كبسولة من تاكتروسل 1 ملخ تحتوي على 47.378 ملخ لكتوز مونوهيدرات و- 0.040 ملخ صوديوم كل كبسولة من تاكتروسل 5 ملخ تحتوي على 236.890 ملخ لكتوز مونوهيدرات و- 0.193 ملخ صوديوم.

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العبوة:
الكبسولات معبأة ضمن لوحيات (بليستر) الموجودة ضمن كيس الألومونيوم مختوم.

كل لوبيدة تحتوي على 10 كبسولات.
محتوى العبوة: تاكتروسل 0.5 ملخ - 50 كبسولة، تاكتروسل 1 ملخ - 100 كبسولة، تاكتروسل 5 ملخ - 50 كبسولة.

لون الكبسولات: تاكتروسل 0.5 ملخ - أبيض وعاجي، تاكتروسل 1 ملخ - أبيض وبني فاتح، تاكتروسل 5 ملخ - أبيض وبرتقالي.

صاحب الامتياز: وکالات پاداچیس إسرائیل. م.ض..، شارع راكيفيت 1، شوہام.

المنتج: لیک فارماسیوتیکالس. d.، لیوبیانا، سلووینیا.

تم إعدادها في آذار 2023 بموجب تعليمات وزارة الصحة.

رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة:

تاكتروسل 0.5 ملخ: 14854.33452

تاكتروسل 1 ملخ: 14855.33453

تاكتروسل 5 ملخ: 14856.33455

من أجل سهولة وتهوين القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكر. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.

- حالات لنقص الكريات المحببة (agranulocytosis) (انخفاض خطير في عدد خلايا الدم البيضاء الذي يترافق بغيرات في القلب، السخونة وتواثن). من الجائز الا تكون لديك أعراض أبداً أو أن تشعر بسخونة مفاجئة، لكنه قد يترافق بأعراض أخرى: طفح حار وفما فوق (شري، إنفاس في اليدين، في راحتي القدمين، الكاحلين، الوجه، الشفتين، الفم أو الحنجرة (التي من شأنه أن يسبب صعوبات في الابreath أو أنه قد تشعر بذلك توشك على الإغماء).
- متلازمة إنتقال الدماغي الخلفي المكسوس (Posterior reversible encephalopathy syndrome) [PRES]: صداع، إرتياح، تغيرات في المزاج، اختلالات وإضطرابات في الرؤية. هذه يمكن أن تكون علامات لمتلازمة إنتقال الدماغي الخلفي المكسوس، حيث يبلغ منها لدى عدد من المتعالجين الذين علوا به تاکروسلوس.
- الإعتلال العصبي البصري (تضرر عصب الرؤية): مشاكل في الرؤية مثل: تشوش الرؤية، تغيرات في رؤية الألوان، صعوبة في رؤية التفاصيل أو اختصار مجال رؤيتك.

الأعراض الجانبية المفضلة أدناه قد تحدث بعد تناول تاكتروسل وقد تكون خطيرة:

- أعراض جانبية شائعة جداً (قد تؤثر على أكثر من 1 من بين 10 متعالجين):
 - ارتفاع نسبة السكر في الدم، سكري، ارتفاع نسبة البوتاسيوم في الدم.
 - صعوبات في النوم.
 - إرتجاف، صداع.
 - ارتفاع ضغط الدم.
 - ناتج غير سليم في فحوص الأداء الوظيفي الكبد.
 - إسهال، غثيان.
 - مشاكل في الكلى.

أعراض جانبية شائعة (قد تؤثر على حتى 1 من بين 10 متعالجين):

- إنخفاض تعداد كريات الدم (الصفائح الدموية، كريات الدم الحمراء أو البيضاء)، زيادة تعداد كريات الدم البيضاء، تغيرات في تعداد كريات الدم الحمراء (التي تظهر في فحوص الدم).
- إنخفاض نسبة المغنيزيوم، الفوسفات، البوتاسيوم، الكالسيوم أو الصوديوم في الدم، ارتفاع نسبة حمض البول أو نسبة الشحوم في الدم، إنخفاض الشهية للطعام، ارتفاع في حموضة الدم، تغيرات أخرى في الملايين الدم.
- أعراض قلق ارتياح، توهان، إكتئاب، تغيرات في المزاج، كوابيس، هلوسات، إضطرابات نفسية.
- اختلالات، إضطرابات في الإدراك، وخز والشعور بالتنميل (تنارق أحياناً بألم) في اليدين وراحتي القدمين، دوار، تضمر القرفة على الكتابة، إضطرابات في الجهاز العصبي.
- حساسية زائدة للصوت، مشاكل في العينين.
- طنين (رنين) في الأذنين.
- نقص جريان الدم أو تأم الأدوية الدموية في القلب، نبضات قلب سريعة.
- نزف، إنسداد جزئي أو تأم الأدوية الدموية، إنخفاض ضغط الدم.
- ضيق تنفس، تغيرات في نسجية الرئتين، تراكم سوائل حول الرئتين، إنتهاك البلعوم، سعال، أعراض مشابهة للإنفلونزا.
- التهابات أو تقرحات المسية للألام في البطن أو لإسهال، ألم في المعدة، إنتفايات أو تقرحات في القولون، تراكم سوائل في البطن، تقيؤات، آلام في البطن، عسر مفم، إمساك، غازات، نفخة، براز لقين، مشاكل في المعدة.
- تغيرات في وظيفة الكبد وفي إنzymات الكبد، إصفرار الجلد على خلفية مشاكل في الكبد، ضرر في نسيج الكبد، التهاب الكبد.
- حكة، طفح، تساقط شعر، حب شباب، تعرق زائد.
- ألم في الأطراف، في الأطراف، في الظهر وراحتي القدمين، تقلصات عضلية.
- قصور كلوي، إنخفاض في انتاج البول، خلل أو ألم عند التبول.
- ضعف عام، سخونة، تراكم سوائل في الجسم، ألم و عدم إرتياح، ارتفاع نسبة الإنزيم فوسفاتان القلوي (alkaline phosphatase) في الدم، زيادة في الوزن، الشعور بإختلال في درجة حرارة الجسم.

أعراض جانبية غير شائعة (قد تؤثر على حتى 1 من بين 100 متعالج):

- تغيرات في تغير الداء، إنخفاض في كافة تعداد خلايا الدم.
- تجفاف.

• إنخفاض في نسب البروتين أو السكر في الدم، ارتفاع نسبة الفوسفات في الدم.

- سبات، نزف في الدماغ، سكتة دماغية، شلل، إضطرابات في الدماغ، خلل في النطق واللغة، مشاكل في الذاكرة.
- تشوش الرؤية بسبب خلل في عدستي العينين.
- خلل في السمع.

• نقص غير منظم، سكتة قلبية، إنخفاض في وظيفة القلب، إضطرابات في عضلة القلب، تضخم عضلة القلب (hypertrophic cardiomyopathy)، نبض قوي، شدود في التخطيط الكهربائي للقلب، نظم ونبض قلب شاذان.

- خترة دموية في وريد الأطراف، صدمة (shock).
- صعوبات في التنفس، إضطرابات في الطرق التنفسية، ربو.

• إنسداد الأمعاء، ارتفاع نسبة إنزيم الأميلاز في الدم، إرتداد محتوى المعدة إلى الحنجرة (reflux) تأخير في إفراغ المعدة.

- إنتهاك في الجلد، الشعور بحرقة عند التعرض للشمس.
- اضطرابات في المفاصل.
- عدم القدرة على التبول، آلام الطمث ونزف طمي شاذ.

• فشل في الأداء الوظيفي لأعضاء معينة، مرض شبيه بالإنفلونزا، حساسية مفرطة للحرارة والبرودة، الشعور بضغط في الصدر، صعوبة أو شعور غير عادي، ارتفاع في نسبة الإنزيم لاكتات ديهيدروجيناز في الدم، إنخفاض الوزن.

أعراض جانبية نادرة (قد تؤثر على حتى 1 من بين 1,000 متعالج):

- أذنة طفيفة في الجلد نتيجة خثارات دموية.
- تصلب زائد للعضلات.
- صمم.

• تراكم سوائل حول القلب.

- ضيق نفس حاد.
- تشکل كيسة في البنكرياس.

• مشاكل في جريان الدم في الكبد.

- نمو مفرط الشعور.

• عطش، ميل للسقوط، شعور بشد في الصدر، نقص في الحركة، قرحة (ulcer).

أعراض جانبية نادرة جداً (قد تؤثر على حتى 1 من بين 10,000 متعالج):

- ضعف العضلات.
- عدم سلامة نتائج فحص تخطيط صدى القلب.

• قصور الكبد، تضيق القناة الصفراوية.