

إنسيلار**رغوة للاستعمال على الجلد**

المادة الفعالة:

بيتاميثازون 0.5 ملغم/غرام
كالسيپوتريول 50 مكغم/غرام

المادة الفعالة في الدواء - انظر للبندين 6 و7 معلومات إضافية وللبند 2 معلومات مهمة عن قسم من مركيات الدواء:
أقرأ النشرة بتفصيل حتى نهايتها وذلك قبل البدء باستعمال الدواء. يحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا كانت لديك أسلنة إضافية، توجه إلى الطبيب أو الصيدلي.
ووصف هذا الدواء من أخطل، لا تطعمه للأخرين؛ لأنّه قد يضرّ بهم، حتى لو بدا لك تشابه بين حالتك وحالتهم الصحية.

1. لم أعد هذا الدواء!

إنسيلار مع الاستعمال على الجلد في الصدفية الشائعة (psoriasis vulgaris) لدى البالغين.

الفصيلة العلاجية:

ـ هو مشتق أصنباعي لفيتامين D المستعمل للعلاج الخارجي للصدفية.

ـ هو كورتيكosteroidin أصنباعي - Betamethasone

تحدد الصدفية نتيجة انسداد خلايا الجلد بسرعة كبيرة جداً، مما يسبب احمراراً تكون قشرة وزيادة سماعة الجلد.
يحتوي إنسيلار على Calcipotriol على التحكم بوتيرة تكون خلايا الجلد ويفعل Betamethasone.

2. قبل استعمال الدواء أذا:

ـ كنت حساساً (أرجى) للمادتين الفاعلتين (Calcipotriol, Betamethasone) أو أحد المركبات الأخرى التي يحتويها الدواء (انظر للبند 6).

ـ كانت لديك اضطرابات في مستويات الكالسيوم في الدم (اسأل الطبيب).

ـ بما أن إنسيلار يتضمن ستيروئيداً قوياً، لا يجوز استعمال إنسيلار على مناطق جلدية متاثرة به.

ـ تلوثات جلدية ناجمة عن فيروسات (مثل: فر Hatch، برد أو جريء الماء)

ـ تلوثات جلدية ناجمة عن فطر (مثل: فطر أحصنة القدم أو athlete's foot أو ringworm)

ـ تلوثات جلدية ناجمة عن جراثيم (مثل الجرب)

ـ التسل (perioral dermatitis)

ـ طفح أحمر حول الفم (perioral dermatitis)

ـ جلد رقيق، أوردة تتضخم بسهولة، علامات شد

ـ سماك (جلد جاف مع قشرة)

ـ حب الشباب (بشر الأبلو)

ـ احمرار الرؤوس (أحمرار وخيم في جلد الوجه) (rosacea)

ـ فر Hatch أو جروح

تحذيرات خاصة متعلقة باستعمال الدواء:

ـ قبل الالعاج ينسلل، لأنّك قد تحتاج إلى إيقاف العلاج.

ـ كنت تعاني من السكري (أنـسـيلـارـ يـوـنـدـ قد يـوـثـرـ فيـ مـسـطـوـيـ السـكـرـ فيـ الدـمـ).

ـ كنت تستعمل أدوية أخرى تتضمن ستيروئيدات، لذلك قد تتعاني من أمراض جانبية.

ـ كنت تعاني من نوع معين من الصدفية يدعى: الصدفية الفنزوية (guttate psoriasis).

ـ خلال العلاج ينسلل، أغير الطبيب أذا:

ـ استعملت هذا الدواء وقتاً طويلاً، وكانت تخطلل لإيقاف استعماله (هناك احتمال أن تتفاقم الصدفية أو تظهر مجدداً بعد إيقاف الستيروئيدات

ـ يشكل مفاجئ).

ـ أوصي بالجلد الملوث، لأنّك قد تحتاج إلى إيقاف العلاج.

ـ احتذرت شفون الروبة أو اضطرابات أخرى في مستوى الكالسيوم في الدم (انظر البندين 4 و5 معلومات إضافية).

ـ يجب الانتباه عن الاستعمال على مناطق جلد المتضرر، لأنّه تزديداً متقدماً في ذلك الخطوة تزيد امتصاص الستيروئيد.

ـ الحصول على 15 غراماً من المستحضر بعد المسح بالماء يزيد امتصاصه جلد تعالج ساحة بد شخص بالغ.

ـ يجب الانتباه عن الاستعمال على مناطق واسعة من الجلد المتضرر، الأنسجة المخاطية أو على ثنيات الجلد (الأربية، الإبط، تحت الثديين) لأنّ هذه الخطوة تزيد امتصاص الستيروئيد.

ـ يجب تجنب الاستعمال على جلد الوجه والأعضاء التناسلية لأنّ هذه المناطق حساسة جداً للستيروئيدات.

ـ المستحضر قابل للاشتعال جداً. انظر للبند 5 (يُفـرـ يـخـزـنـ الدـاوـيـ)" لمزيد من المعلومات.

يمنع تدخين أو الاقرابة من نار مكشافة - خطر التعرض لحرق خطير. قماش (ملابس، شراشف، ضمادات وما شابه) الذي يلامس هذا الممحض، يحترق بسهولة كبيرة وبشكل خطأ الحدوث حرق خطير. عمل الملابس والشارافذ قد يقلل من تراكم المستحضر لكنه لا يزال يه.

ـ تماماً.

ـ الأطفال والمراهقون: إذا كنت تتناول تناولت أدوية أخرى، بما فيها أدوية دون وصفة طبية ومكملات غذائية، أغير الطبيب أو الصيدلي بذلك.

ـ إذا كنت تأكل أو ترمضه تعتقدين أنك حامل، أو تخططن للحمل، عليك استشارة الطبيب قبل استعمال هذا الدواء. إذا أغيرت الطبيب بانك تستطيعين الارضاع، عليك استعمال بذر، ولا يجوز لك دهنه على منطقة الصدر (انظر "طريقة الاستعمال" في البندين 3).

ـ السياقة واستعمال الماكينات: لا ينفع أن يؤثر هذا الدواء في قدرتك على السياقة أو تشغيل الماكينات.

ـ هذا الدواء غير معد للاستعمال لدى الأطفال دون سن 18 عاماً.

ـ التفاعلات بين الأدوية: إذا كنت تتناول تناولت أدوية أخرى، وقد تتناول أدوية أخرى، بما فيها أدوية دون وصفة طبية.

ـ الحمل، الارضاع والخصوبة: إذا كنت تأكل أو ترمضه تعتقدين أنك حامل، أو تخططن للحمل، عليك استشارة الطبيب قبل استعمال هذا الدواء. إذا أغيرت الطبيب بانك

ـ تستطيعين الارضاع، عليك استعمال بذر، ولا يجوز لك دهنه على منطقة الصدر (انظر "طريقة الاستعمال" في البندين 3).

ـ الأدوية المترافقون: إذا كنت تتناول أدوية أخرى، قد تتناول أدوية أخرى، أو قد تتناول أدوية أخرى، بما فيها أدوية دون وصفة طبية.

ـ إذا كنت تتناول تناولت أدوية أخرى، بما فيها أدوية دون وصفة طبية.

ـ إذا كنت تأكل أو ترمضه تعتقدين أنك حامل، أو تخططن للحمل، عليك استشارة الطبيب قبل استعمال هذا الدواء.

ـ إذا كنت تأكل أو ترمضه تعتقدين أنك حامل، أو تخططن للحمل، عليك استشارة الطبيب قبل استعمال هذا الدواء.

ـ إذا كنت تأكل أو ترمضه تعتقدين أنك حامل، أو تخططن للحمل، عليك استشارة الطبيب قبل استعمال هذا الدواء.

ـ إذا كنت تأكل أو ترمضه تعتقدين أنك حامل، أو تخططن للحمل، عليك استشارة الطبيب قبل استعمال هذا الدواء.

ـ إذا كنت تأكل أو ترمضه تعتقدين أنك حامل، أو تخططن للحمل، عليك استشارة الطبيب قبل استعمال هذا الدواء.

ـ إذا كنت تأكل أو ترمضه تعتقدين أنك حامل، أو تخططن للحمل، عليك استشارة الطبيب قبل استعمال هذا الدواء.

ـ إذا كنت تأكل أو ترمضه تعتقدين أنك حامل، أو تخططن للحمل، عليك استشارة الطبيب قبل استعمال هذا الدواء.

ـ إذا كنت تأكل أو ترمضه تعتقدين أنك حامل، أو تخططن للحمل، عليك استشارة الطبيب قبل استعمال هذا الدواء.

ـ إذا كنت تأكل أو ترمضه تعتقدين أنك حامل، أو تخططن للحمل، عليك استشارة الطبيب قبل استعمال هذا الدواء.

ـ إذا كنت تأكل أو ترمضه تعتقدين أنك حامل، أو تخططن للحمل، عليك استشارة الطبيب قبل استعمال هذا الدواء.

ـ إذا كنت تأكل أو ترمضه تعتقدين أنك حامل، أو تخططن للحمل، عليك استشارة الطبيب قبل استعمال هذا الدواء.

ـ إذا كنت تأكل أو ترمضه تعتقدين أنك حامل، أو تخططن للحمل، عليك استشارة الطبيب قبل استعمال هذا الدواء.

ـ إذا كنت تأكل أو ترمضه تعتقدين أنك حامل، أو تخططن للحمل، عليك استشارة الطبيب قبل استعمال هذا الدواء.

ـ إذا كنت تأكل أو ترمضه تعتقدين أنك حامل، أو تخططن للحمل، عليك استشارة الطبيب قبل استعمال هذا الدواء.

ـ إذا كنت تأكل أو ترمضه تعتقدين أنك حامل، أو تخططن للحمل، عليك استشارة الطبيب قبل استعمال هذا الدواء.

ـ إذا كنت تأكل أو ترمضه تعتقدين أنك حامل، أو تخططن للحمل، عليك استشارة الطبيب قبل استعمال هذا الدواء.

ـ إذا كنت تأكل أو ترمضه تعتقدين أنك حامل، أو تخططن للحمل، عليك استشارة الطبيب قبل استعمال هذا الدواء.

ـ إذا كنت تأكل أو ترمضه تعتقدين أنك حامل، أو تخططن للحمل، عليك استشارة الطبيب قبل استعمال هذا الدواء.

ـ إذا كنت تأكل أو ترمضه تعتقدين أنك حامل، أو تخططن للحمل، عليك استشارة الطبيب قبل استعمال هذا الدواء.

ـ إذا كنت تأكل أو ترمضه تعتقدين أنك حامل، أو تخططن للحمل، عليك استشارة الطبيب قبل استعمال هذا الدواء.

ـ إذا كنت تأكل أو ترمضه تعتقدين أنك حامل، أو تخططن للحمل، عليك استشارة الطبيب قبل استعمال هذا الدواء.

ـ إذا كنت تأكل أو ترمضه تعتقدين أنك حامل، أو تخططن للحمل، عليك استشارة الطبيب قبل استعمال هذا الدواء.

ـ إذا كنت تأكل أو ترمضه تعتقدين أنك حامل، أو تخططن للحمل، عليك استشارة الطبيب قبل استعمال هذا الدواء.

ـ إذا كنت تأكل أو ترمضه تعتقدين أنك حامل، أو تخططن للحمل، عليك استشارة الطبيب قبل استعمال هذا الدواء.

ـ إذا كنت تأكل أو ترمضه تعتقدين أنك حامل، أو تخططن للحمل، عليك استشارة الطبيب قبل استعمال هذا الدواء.

ـ إذا كنت تأكل أو ترمضه تعتقدين أنك حامل، أو تخططن للحمل، عليك استشارة الطبيب قبل استعمال هذا الدواء.

ـ إذا كنت تأكل أو ترمضه تعتقدين أنك حامل، أو تخططن للحمل، عليك استشارة الطبيب قبل استعمال هذا الدواء.

ـ إذا كنت تأكل أو ترمضه تعتقدين أنك حامل، أو تخططن للحمل، عليك استشارة الطبيب قبل استعمال هذا الدواء.

ـ إذا كنت تأكل أو ترمضه تعتقدين أنك حامل، أو تخططن للحمل، عليك استشارة الطبيب قبل استعمال هذا الدواء.

ـ إذا كنت تأكل أو ترمضه تعتقدين أنك حامل، أو تخططن للحمل، عليك استشارة الطبيب قبل استعمال هذا الدواء.

ـ إذا كنت تأكل أو ترمضه تعتقدين أنك حامل، أو تخططن للحمل، عليك استشارة الطبيب قبل استعمال هذا الدواء.

ـ إذا كنت تأكل أو ترمضه تعتقدين أنك حامل، أو تخططن للحمل، عليك استشارة الطبيب قبل استعمال هذا الدواء.

ـ إذا كنت تأكل أو ترمضه تعتقدين أنك حامل، أو تخططن للحمل، عليك استشارة الطبيب قبل استعمال هذا الدواء.

ـ إذا كنت تأكل أو ترمضه تعتقدين أنك حامل، أو تخططن للحمل، عليك استشارة الطبيب قبل استعمال هذا الدواء.

ـ إذا كنت تأكل أو ترمضه تعتقدين أنك حامل، أو تخططن للحمل، عليك استشارة الطبيب قبل استعمال هذا الدواء.

ـ إذا كنت تأكل أو ترمضه تعتقدين أنك حامل، أو تخططن للحمل، عليك استشارة الطبيب قبل استعمال هذا الدواء.

ـ إذا كنت تأكل أو ترمضه تعتقدين أنك حامل، أو تخططن للحمل، عليك استشارة الطبيب قبل استعمال هذا الدواء.

ـ إذا كنت تأكل أو ترمضه تعتقدين أنك حامل، أو تخططن للحمل، عليك استشارة الطبيب قبل استعمال هذا الدواء.

ـ إذا كنت تأكل أو ترمضه تعتقدين أنك حامل، أو تخططن للحمل، عليك استشارة الطبيب قبل استعمال هذا الدواء.

ـ إذا كنت تأكل أو ترمضه تعتقدين أنك حامل، أو تخططن للحمل، عليك استشارة الطبيب قبل استعمال هذا الدواء.

ـ إذا كنت تأكل أو ترمضه تعتقدين أنك حامل، أو تخططن للحمل، عليك استشارة الطبيب قبل استعمال هذا الدواء.

ـ إذا كنت تأكل أو ترمضه تعتقدين أنك حامل، أو تخططن للحمل، عليك استشارة الطبيب قبل استعمال هذا الدواء.

ـ إذا كنت تأكل أو ترمضه تعتقدين أنك حامل، أو تخططن للحمل، عليك استشارة الطبيب قبل استعمال هذا الدواء.

ـ إذا كنت تأكل أو ترمضه تعتقدين أنك حامل، أو تخططن للحمل، عليك استشارة الطبيب قبل استعمال هذا الدواء.

ـ إذا كنت تأكل أو ترمضه تعتقدين أنك حامل، أو تخططن للحمل، عليك استشارة الطبيب قبل استعمال هذا الدواء.

ـ إذا كنت تأكل أو ترمضه تعتقدين أنك حامل، أو تخططن للحمل، عليك استشارة الطبيب قبل استعمال هذا الدواء.

ـ إذا كنت تأكل أو ترمضه تعتقدين أنك حامل، أو تخططن للحمل، عليك استشارة الطبيب قبل استعمال هذا الدواء.

ـ إذا كنت تأكل أو ترمضه تعتقدين أنك حامل، أو تخططن للحمل، عليك استشارة الطبيب قبل استعمال هذا الدواء.

ـ إذا كنت تأكل أو ترمضه تعتقدين أنك حامل، أو تخططن للحمل، عليك استشارة الطبيب قبل استعمال هذا الدواء.

ـ إذا كنت تأكل أو ترمضه تعتقدين أنك حامل، أو تخططن للحمل، عليك استشارة الطبيب قبل استعمال هذا الدواء.

ـ إذا كنت تأكل أو ترمضه تعتقدين أنك حامل، أو تخططن للحمل، عليك استشارة الطبيب قبل استعمال هذا الدواء.

ـ إذا كنت تأكل أو ترمضه تعتقدين أنك حامل، أو تخططن للحمل، عليك استشارة الطبيب قبل استعمال هذا الدواء.

ـ إذا كنت تأكل أو ترمضه تعتقدين أنك حامل، أو تخططن للحمل، عليك استشارة الطبيب قبل استعمال هذا الدواء.

ـ إذا كنت تأكل أو ترمضه تعتقدين أنك حامل، أو تخططن للحمل، عليك استشارة الطبيب قبل استعمال هذا الدواء.

ـ إذا كنت تأكل أو ترمضه تعتقدين أنك حامل، أو تخططن للحمل، عليك استشارة الطبيب قبل استعمال هذا الدواء.

ـ إذا كنت تأكل أو ترمضه تعتقدين أنك حامل، أو تخططن للحمل، عليك استشارة الطبيب قبل استعمال هذا الدواء.

ـ إذا كنت تأكل أو ترمضه تعتقدين أنك حامل، أو تخططن للحمل، عليك استشارة الطبيب قبل استعمال هذا الدواء.

ـ إذا كنت تأكل أو ترمضه تعتقدين أنك حامل، أو تخططن للحمل، عليك استشارة الطبيب قبل استعمال هذا الدواء.

ـ إذا كنت تأكل أو ترمضه تعتقدين أنك حامل، أو تخططن للحمل، عليك استشارة الطبيب قبل استعمال هذا الدواء.

ـ إذا كنت تأكل أو ترمضه تعتقدين أنك حامل، أو تخططن للحمل، عليك استشارة الطبيب قبل استعمال هذا الدواء.

ـ إذا كنت تأكل أو ترمضه تعتقدين أنك حامل، أو تخططن للحمل، عليك استشارة الطبيب قبل استعمال هذا الدواء.

ـ إذا كنت تأكل أو ترمضه تعتقدين أنك حامل، أو تخططن للحمل، عليك استشارة الطبيب قبل استعمال هذا الدواء.

ـ إذا كنت تأكل أو ترمضه تعتقدين أنك حامل، أو تخططن للحمل، عليك استشارة الطبيب قبل استعمال هذا الدواء.

ـ إذا كنت تأكل أو ترمضه تعتقدين أنك حامل، أو تخططن للحمل، عليك استشارة الطبيب قبل استعمال هذا الدواء.

ـ إذا كنت تأكل أو ترمضه تعتقدين أنك حامل، أو تخططن للحمل، عليك استشارة الطبيب قبل استعمال هذا الدواء.

ـ إذا كنت تأكل أو ترمضه تعتقدين أنك حامل، أو تخططن للحمل، عليك استشارة الطبيب قبل استعمال هذا الدواء.

ـ إذا كنت تأكل أو ترمضه تعتقدين أنك حامل، أو تخططن للحمل، عليك استشارة الطبيب قبل استعمال هذا الدواء.</