

نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيالة
(مستخلصات) 1986

يسوق الدواء بموجب وصفة طبيب فقط.

نيريذرم كريم

ديفلوكورتولون الجليريات

0.1 غرام/100 غرام
Diflucortolone Valerate
0.1 gr/100 gr

مواد غير فعالة و مواد مسببة للحساسية في المستحضر - انظر بند 2 "معلومات هامة عن قسم من مركبات الدواء" و بند 6 في النشرة.

اقرأ النشرة بعناية حتى نهايتها قبل ان تستعمل الدواء تحتوي هذه النشرة على معلومات مخصصة عن الدواء. إذا كانت لديك أسئلة إضافية، توجه إلى الطبيب أو الصيدلي.

وصف هذا الدواء لأملاك، لا تعطه إلا لخبرين. فهو ليس الضرع لهم حتى إذا بدا لك أن وضعهم في صحتهم ضار.

1. لأي عرض مخصص الدواء؟

نيريذرم مخصص لعلاج التهابات الجلد غير التوتيرية التي تسببها للكورتيكوستيرويدات.

الوصفة العلاجية: كورتيكوستيرويدات لعلاج

يحتوي نيريذرم على المركب الفعال ديفلوكورتولون الجليريات التي يعتبر كورتيكوستيرويد (أو ستيرويد) موضعي (لدى على الجلد). تستعمل الكورتيكوستيرويدات من هذا النوع لتقليل الاحمرار والحكة الناتجة عن مشاكل جلد مختلفة.

نيريذرم مرهم ملانم لحالات جلد جفا، ويوفر طبقة دهنية التي تمنع فقدان الماء، ويساهم في شفاء الجفاف وتفتت الجلد.

نيريذرم مرهم كريم ملانم لحالات جلد مؤثر. هذا يسمح للإبرازات من الجلد بالتصرف. نيريذرم كريم ملانم أيضاً لمناطق جلد رطبة، متشوشة، ومشمرة.

استعمل نيريذرم كريم أو نيريذرم مرهم لتحديد من قبل الطبيب.

2. قبل استعمال الدواء

لا يجوز استعمال الدواء إذا:

كنت حساساً (رجي) للمادة الفعالة من ديفلوكورتولون الجليريات أو لكل واحد من المركبات الإضافية التي يحتوي عليها الدواء (انظر بند 4).

كنت تعاني من العد الوردي (rosacea)، مرض جلدي التهابي الذي يسبب احمرار (الوجه).

كنت تعاني من التهاب حول الفم (المرض جلدي في منطقة الفم).

كنت تعاني من مرض في العين.

يوجد لديك حب الشباب.

كنت تعاني من مشكلة في منطقة الأعضاء التناسلية أو فتحة الشرج (إلا إذا أوصى طبيبك على العلاج).

كنت تعاني من المرض الجلدي الفيروسي مثل كروت البرد، العقوبولة البسيطة (هربس)، عقوبولة المنطقه (Shingles) أو جندي الماه.

بعد لقاح نيك رد فعل جلدي في المنطقة المصابة.

لديك توت جرتومة أو فطري غير ملتحج.

كنت حامل.

كنت مرضعة، ولديك مشكلة في جلد الثدي.

توجه إلى الطبيب إذا كنت تعتقد بأن إحدى الحالات المسجلة أعلاه تنطبق عليك.

نيريذرم غير مخصص للأطفال دون عمر سنة ولعلاج الطغ الحفاني.

تحذيرات خاصة بخصوص استعمال الدواء قبل العلاج بنيريذرم كريم أو مرهم آخر (الطبيب إذا):

كان لديك تيج في الجلد في القسم السفلي من الرجلين dermatitis بمشاكل في اللورة التوتيرية

stasis dermatitis أو تقرحات في الرجلين، ولكل أنلأن من الممكن أن يكون موجود

بخطأ معزز لرد فعل تحسني بنيريذرم.

تطور توت جدي خلال العلاج بهذا الدواء، لأنه من المحتمل أن يصف لك طبيبك أيضاً دواء لعلاج التوت الجدي.

كنت تعاني من الصدفية، لأن العلاج بنيريذرم قد يؤدي لتفاقم أنواع معينة من الصدفية.

كان لديك توت في الجلد، لأنه قد يتفاقم.

كنت تعاني من جلوكوما - ضغط مرتفع داخل العين الذي قد يؤدي إلى فقدان البصر.

لا يجوز دهن كمية أكبر من نيريذرم أو الاستعمال لفترة أطول من توصية الطبيب.

ممنوع أن يلامس الدواء العينين، في حال ملاصقة العينين يجب التوقف بماء بارد.

الأطفال والرضع لا يجوز استعمال نيريذرم لدى أطفال دون عمر سنة.

لا يجوز استعمال هذا الدواء بشكل مستمر لفترة طويلة من الزمن. نيريذرم قد يقلل من نشاط

الغدة الكظرية وبذلك التسبب بانخفاض المقاومة للأرضع. قد تظهر أعراض مشابهة لدى المرضى بعد استعمال واسع بنيريذرم من قبل والدته، خلال الأسابيع الأخيرة من الحمل أو أثناء الإرضاع.

تصميم المنطة المعالجة

إذا أوصى الطبيب بتصميم المناطق المنصبة من جلديك المعالجة بنيريذرم، عليك تنفيذ تعليماتك بأمانة لتؤتيه استبدال الصادات وكيفية النيريذرم في كل استعمال بشكل عام.

لا يجوز إبقاء أي صماد لفترة تزيد عن 4 ساعات، 24 من يوم، يوصي الطبيب في حالات معينة باستخدام الصادات كل 12 ساعة، لا يجوز إبقاء الصادات لأكثر من الفترة الزمنية الموصى بها. يجب فصل الجلد بحذر عندما تستبدل الصماد. إذا بدأ جلدي ملتعب أكثر من السابق أو إذا ظهرت بقور تحتوي على قيح، توقف عن استخدام الصادات وتوجه إلى الطبيب في أسرع وقت ممكن.

تداخلات/تفاعلات بين الأدوية

إذا كنت تأخذ، أو إذا أخذت في الأونة الأخيرة أدوية أخرى، بما في ذلك الأدوية بوصفة

طبيب وإضافات تغذية، أخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك.

لم يُثبت بأن نيريذرم ردد فعل سلبية مع الأدوية الأخرى.

الإرضاع

الحمل: حتى في الجرعة الاعتيادية، لا يمكن التفي بنتاً إمكانية وجود اختلال صغير جداً

على تطور الجنين لدى النساء الحوامل اللواتي تعالجن بنيريذرم.

لذلك لا يجوز استعمال الدواء إذا كنت حامل، تتناولين الدخول في الحمل أو مرضعة، إلا إذا كان العلاج يعتبر ضرورياً من قبل طبيبك.

الإرضاع: إذا كنت مرضعة، لا يجوز دهن نيريذرم على الثديين.

السيفالة واستعمال الآلات

لم يُثبت وجود تأثير لنيريذرم على القدرة السيفالة أو تشغيل الآلات.

معلومات هامة عن جزء من مركبات الدواء

يحتوي نيريذرم كريم على stearyl alcohol الذي قد يؤدي إلى ردود فعل موضعية في الجلد

(مثل التهاب الجلد بالتماس)، ويحتوي أيضاً على إيبينبات التي قد تؤدي إلى ردود فعل أرجية (من الجائز حدوث ردود فعل متأخرة).

3. كيفية استعمال الدواء؟

توقف دائماً استعمال المستحضر وفقاً لتعليمات الطبيب. غسل اليدين قبل وبعد استعمال نيريذرم.

إدهن بلطف طبقة رقيقة من نيريذرم على المنطقة المنصابة من الجلد. لا تستعمل كمية أكبر أو بوتيرة أكبر من الموصى به من قبل الطبيب.

عليك أن تفحص مع الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكدًا بالنسبة للجرعة وطريقة العلاج بالمنصضر.

الجرعة وطريقة العلاج يُحددن من قبل الطبيب فقط الجرعة الاعتيادية عادةً هي:

البالغون: الجرعة الاعتيادية عادةً هي: يجب دهن طبقة رقيقة على المكان المنصاب مرتين في اليوم، عندما يتحسن الوضع قد يأمر الطبيب

بالاستعمال مره في اليوم. لا يجوز استعمال نيريذرم لفترة أكثر من 4 أسابيع إلا إذا أمرك الطبيب بذلك.

إذا كان الدهن على الوجه لا يجوز استعمال نيريذرم لفترة أكثر من 5 أيام

ولا يجوز تصميد أو تعظية المنطقه.

الأطفال من جيل 6 والبرافين:

الجرعة الاعتيادية عادةً هي: يجب دهن طبقة رقيقة على المكان المنصاب مرتين في اليوم، عندما يتحسن الوضع قد يأمر الطبيب بالاستعمال مره في اليوم. لا يجوز استعمال نيريذرم بحذر وليس لمدة أكثر من 1-2 أسابيع.

إذا تم الدهن على الوجه لا يجوز استعمال نيريذرم لفترة أكثر من 5 أيام ولا يجوز تصميد أو تعظية المنطقه.

أطفال من جيل 1-4:

الجرعة الاعتيادية عادةً هي: يجب دهن طبقة رقيقة على المكان المنصاب مرتين في اليوم،

استعمل نيريذرم بحذر شديد بفترة زمنية قصيرة وبشكل عام فقط بصبغة طبيب مختص بطلب

الجلد. لا يجوز استعمال نيريذرم لفترة أكثر من 5 أيام. لا يجوز استعمال صمادات لتعظية المكان المنصاب بالجلد.

لا يجوز تناول الجرعة الموصى بها. للاستعمال الخارجي فقط.

لا يجوز البلع.

إذا ذهبت عن طريق الخطأ جرعة أو بعضي أو فطرت بتناول الجرعة أو إذا بدأ غط أو أخصى

آخر بالخطأ من الدواء، توجه فوراً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى واحضر عبوة الدواء معك.

إذا نسيبت دهن الدواء في الوقت المحدد، لا يجوز دهن كمية أكبر للعرض عن المرة المتعددة

عند تذكرك، إدهن الجرعة التالية كما وصفت لك، واستمر مع الجدول الزمني للعلاج.

لا يجوز استعمال العلاج كما أوصى من قبل الطبيب.

حتى لو طراً تحسين على وضعك الصحي، لا يجوز إيقاف العلاج بالدواء دون استشارة الطبيب أو الصيدلي.

لا يجوز تناول أدوية في الظلام تحقق من المصق والجرعة في كل مرة تتناول بها دواء.

أضالع أيضاً على إذا كانت لديك أي أسئلة إضافية فيما يتعلق باستعمال الدواء، استشر الطبيب أو الصيدلي.

4. الأعراض الجانبية

كما في كل دواء، قد يسبب استعمال نيريذرم أعراض جانبية لدى جزء من المستخدمين.

تفرغ من قراءة قائمة الأعراض الجانبية، من الممكن أن لا تصاب بأي واحدة منها.

قد يحدث في أوقات نادرة رد فعل تحسني بنيريذرم، إذا كنت تشعر بذلك تعالني من رد فعل تحسني، توقف عن استعمال هذا الدواء وتوجه فوراً إلى الطبيب.

في بعض الأحيان بعد استعمال نيريذرم، أنت قد تشعر بحرقه، حكة أو تيج في الجلد. من شأن ذلك أن يكون أيضاً أمرًا مؤرود.

يجب التوجه إلى الطبيب بأسرع وقت ممكن إذا كنت تشعر بالأعراض التالية أثناء استعمال نيريذرم:

• تحول الجلد في المنطقة المعالجة أو من حولها إلى رقيق.

• بقور تشبه حب الشباب.

• علامات شد.

• التهاب جلدي حول الفم (مرض جلدي في منطقة الفم).

• تجمع أو عية متصغيرة التي تبرز تحت الجلد (telangiectasia).

• تزايد نمو الشعر (زيادة الشعر - فُرط الأَشعار).

• جلوكوما (ضعفمرق داخل العين).

• زيادة احتمال ظهور أعراض جانبية عندما يتم العلاج بنيريذرم على مناطق واسعة (10% وأكثر) من سطح الجسم، ولفترات زمنية متواصلة (أكثر من أربعة أسابيع)، خاصة إذا تم استعمال صمادات مقاومة للماء، يزداد الخطر لجلوكوما

إذا تم استعمال نيريذرم على الجلد حول العين.

قد يسبب نيريذرم في أوقات نادرة جذا أعراض جانبية مثل انخفاض في إنتاج الهرمونات الطبيعية من قبل الغدة الكظرية، التي قد يؤدي لبعض مثل متلازمة كوشينغ (أحد كورتيزول (دم).

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقم أحد الأعراض الجانبية، أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يُذكر في هذه النشرة، عليك استشارة الطبيب.

التفليغ عن الأعراض الجانبية:

يمكن التفليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الصيغة على الرابط "التفليغ

عن الأعراض الجانبية عقب علاج دولي" الموجود في صفحة اليت بموقع وزارة الصحة (www.health.gov.au).

الموجهة للاستشارة أو عن طريق الدخول الرابط.

https://sideeffects.health.gov.au بالإضافة، يمكن تبليغ شركة باياديبس بواسطة العنوان التالي: 011 Padagis

5. كيفية تفليغ الدواء؟

تجنب التخزين يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي ومجال رؤية الأطفال و/أو الرضع وبذلك تمنع التسمم.

تجنب التقيؤ دون تعليمات صريحة من الطبيب.

لا يجوز استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على العبوة. تاريخ انتهاء الصلاحية يرجع إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

يجب التخزين في مكان بارد تحت الـ 25 درجة مئوية.

بعد الفتح الأولى للماسورة يمكن استعمال نيريذرم لمدة 3 شهور، لكن ليس بعد تاريخ انتهاء الصلاحية.

6. معلومات إضافية

• بالإضافة إلى المادة الفعالة يحتوي نيريذرم أيضاً على:

نيريذرم كريم: Purified Water, Vaseline White, Paraffin Liquid Heavy, Stearyl Alcohol, Polyoxyl 40 Stearate, Carbopol 980, Edetate Disodium Dihydrate, Methyl Parahydroxy Benzoate, Sodium Hydroxide, Propyl Parahydroxy Benzoate.

نيريذرم مرهم: Vaseline white, Purified Water, Paraffin Liquid Heavy, Dehymuls® E, Bees wax.

كيف يبدو نيريذرم وما محتواه العبوة:

نيريذرم كريم هو كريم معتم بلون أبيض حتى أوف وايت (off-white).

نيريذرم مرهم هو مرهم معتم بلون أبيض حتى أبيض مثل إلى الأصفر.

تم تصميد نيريذرم كريم مرهم بماسورة ألومنيوم التي تحتوي على 30 غرام.

المنتج، صاحب التسجيل وعنوانه: باياديبس إسرائيل فارماسيوتيكاس، محض، شارع راكيفت 1، شوهام.

تم الإعداد في آذار 2023 حسب تعليمات وزارة الصحة.

رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة:

نيريذرم كريم: 6150.24636

نيريذرم مرهم: 6151.24647

للتسجيل، تصميد الرابط، تمت تصياغة هذه النشرة بصيغة المذكر، بالرغم من ذلك، الدواء مخصص لأبناء كل الجنسين.

16.03.23