

بطاقة معلومات  
حول الأمان  
للمتعامل

ريمسيما  
**120**  
ملغ / مل  
تحت الجلد  
إنفليكسيماب  
(Infliximab)

أطلب من طبيبك أن يوثق أدناه  
نوع و تاريخ الفحص  
(الفحوص) الأخير (الأخيرة)  
للكشف عن السلل الذي / التي  
أجري / ت لك:

فحص: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

تاريخ: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

نتيجة: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

قائمة تحسسات (آлерجيا)  
معروفة:

قائمة أدوية إضافية تتناولها:

REM 120 SOL PEN  
SH270323

تاريخ بدء العلاج بـ ريمسيما  
120 ملغ / مل تحت الجلد :

تحوي بطاقة المعلومات  
حول الأمان للمتعامل على  
معلومات هامة حول الأمان،  
عليك معرفتها  
قبل بدء العلاج

بـ ريمسيما **120** ملغ / مل  
تحت الجلد، وخلافه.

متعالج: \_\_\_\_\_

طبيب: \_\_\_\_\_

رقم الهاتف: \_\_\_\_\_

من المهم أن تكتب أنت وطبيبك  
الإسم التجاري للدواء الذي  
تتلقيه وكذلك رقم التشغيلة  
للمقدار الدوائي.

اسم المستحضر:

رقم التشغيلة:

إقرأ بتمعن "نشرة المستهلك"  
ـ ريمسيما 120 ملغ / مل  
تحت الجلد قبل أن تبدأ  
باستعمال هذا الدواء.

ريمسيما 120 ملغ / مل تحت  
الجلد عبارة عن مستحضر  
مشابه حيوى، لمعلومات إضافية  
عن المستحضرات المشابهة حيوياً  
يجب تصفح موقع وزارة  
الصحة:

[https://www.health.gov.il/  
UnitsOffice/HD/MTI/Drugs/  
Registration/Pages/Bio  
similar.aspx](https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/MTI/Drugs/Registration/Pages/Biosimilars.aspx)

## • تلوثات

قبل إستعمال ريمسيما

• إحك لطبيبك إذا كنت تعاني من أي تلوث.

• من المهم جداً أن تحك لطبيبك إذا أصبت ذات مرة بمرض السل، أو إذا كنت على تفاصيل العلامات التي تشير إلى التلوث، مثل: سيفحصك الطبي بالسل أو أصيبي في الماضي بالسل. سيفحصك الطبي للتأكد فيما إذا كنت مصابة بالسل. أطلب من طبيبك أن يوثق على بطاقةك نوع و تاريخ الفحص (الفحوص) الأخيرة (الأخيرة) للكشف عن السل الذي / التي أجري / ت لك.

## • خلل العلاج بـ ريمسيما

• بلغ طبيبك حالاً إذا كنت تعاني من علامات تلوث. هذه العلامات تشمل سخونة، إرهاق، سعال (متواصل)، ضيق تنفس، إنخفاض الوزن، تعرق ليلاً، إسهال، جروح، مشاكل في الأسنان، الشعور بحرقة أثناء التبول أو علامات تشبه الإلفلانزا.

## • مشاكل في القلب

قبل إستعمال ريمسيما

• إحك لطبيبك إذا كنت تعاني من مشاكل في القلب أيًا كانت، مثل قصور القلب.

## • خلل العلاج بـ ريمسيما

• بلغ طبيبك حالاً إذا كنت تلاحظ أعراض لشكلة في القلب. هذه الأعراض تشمل ضيق في التنفس، إنتفاخ الرجلين أو تغيرات بنظم القلب.

## • الحمل واللقاءات

إذا تلقيت هذا الدواء خلال الحمل، فمن المهم إبلاغ الطاقم الطبي عن ذلك قبل أن يتلقى رضيعك أي لقاح. لا يجوز إعطاء "القاح حي" لرضيعك خلال الـ 6 أشهر الأولى بعد الولادة. لا يجوز إعطاء رضيعك لقاح BCG (المخصص لمنع مرض السل)، خلال الـ 12 شهراً الأولى بعد الولادة.

إضافة لذلك، بالإمكان تلقيه شركة پاداپيس بواسطة العنوان التالي:

[Padagis.co.il](http://Padagis.co.il)

من أجل سهولة وتهوين القراءة، تمت صياغة هذه البطاقة بصيغة المذكر. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.

تم المصادقة عليها من قبل وزارة الصحة في  
نisan 2023