

## أچیستن پاستا

### کلورتیمازول ۱% W/W

- **كيف تستطيع المساندة في نجاح العلاج؟**
- على الرغم من أن المنطقة المصابة تسبب الحكة، تجنب حكها. إن الحك يسبب ضرراً سطح الجلد مما يؤدي إلى انتشار التلوث.
- حافظ علىبقاء المكان المصايب جافاً، لكن يجب تجنب الفرك الزائد.
- تغفر الرطوبة نمو الفطريات، لذا يجب الحفاظ علىبقاء المكان المصايب جافاً، لكن يجب تجنب عسل المنطقة المصابة وتحفيفه قبل كل عملية دهن للدواء، بين استعمال وأخر - يمكن استعمال سوسيروض مضاد للفطريات للحفاظ علىبقاء المكان جافاً.
- يجب غسل اليدين دواماً بعد علاج التلوث من أجل منع انتشاره.
- لا تشارك أخرين بالمناشف، سجادات حوض الاستحمام وما شابه، لأن ذلك قد يؤدي إلى انتقال التلوث إليهم.
- إذا كان العلاج لقمنين -
- يجب على شغل جيد وتشيف خصيصاً بين أصابع الإبهام في القدمين.
- من المفضل استعمال حوارب قطنية: يجب الانتباه عن ارتداء حوارب من الم sof ملطف أو مواد أصطناعية من المفضل تبييضه عدة مرات في اليوم (حسب كمية العرق).
- اغسل العوارب جيداً، حوارب النيلون والجوارب الطوبية بماء ساخن لإزالة كل الجد الذي تنشر أو الأبواو الفطري.
- في الفصول المناسبة ينصح بارتداء الصندل بدون حوارب.
- لا تستعمل الأدوية في العتمة: يجب تشخيص طبع اللواء والتاكيد من المقدار الوائي في كل مرة تتناول فيها لواء ضعف النظرات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.
- إذا توفر لديك أسلنة إضافية حول استعمال الدواء، استشر الطبيب أو الصيدلي.

### ٤. الأعراض الجانبية

- كما بكل دواء، إن إسعمال أچیستن پاستا قد يسبب أعراضًا جانبية عند بعض المستعملين. لا تتدنى هذه من قراءة قائمة الأعراض الجانبية.
- كما بكل الأدوية، هناك أشخاص قد تكون لديهم حساسية للدواء. إذا كنت أنت أو طفلك تعانين من حساسية، فإن رد فعل سباق حارلاً بعد بدء الاستعمال، في حال ثابتت أنت أو طفلك من رد فعل تحسسي، يجب التوقف عن الاستعمال والتوجه حالاً للتلقى مساعدة طبية. علامات رد الفعل التحسسي من شأنها أن تشمل:
- طفح، مشاكل في البالع أو في التقفن، انتفاخ الشفتين، الوجه، الحنجرة أو اللسان، ضعف، غثيان، دوار أو إصعاء.
- كلذك، توقف عن العلاج وراجع الطبيب إذا ظهر بعد الاستعمال: احرار، تبيّح أو طفح في الجلد (بارداً)، حكة، حوصلات حرقة، اتزاع، انتفاخ، تنشر الجلد.
- إذا ظهر عارض جانبي، إذا تفاقمت أحدي الأعراض الجانبية، أو عندما تعاني أنت أو طفلك من عرض جانبي لم يذكر في الشرة، عليك استشارة الطبيب.

#### التلميح عن أعراض جانبية:

بالإمكان التلميح عن أعراض جانبية عقب ادخال العلاج بواسطة الضغط على الرابط "تلميح عن اعراض جانبية" عقب ادخال العلاج "ادخل" الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة تصفح الرابط:  
<https://sideeffects.health.gov.il>

بالإضافة لذلك، بالإمكان تبيين الشركة على العنوان التالي: [Padagis.co.il](http://Padagis.co.il)

### ٥. كيفية تخزين الدواء؟

- تجنب التسمم: يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن مجال رؤية ومتناول أيدي الأطفال وأو الرضع وذلك لتفادي إصابتهم بالتسوس. لا تسببي التبييض بدون تعليمات صريحة من الطبيب.
- لا يجب استعمال الدواء بعد اقضاء تاريخ الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على العلبة. يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهير.
- يخزن ما دون 25 درجة مئوية. بعد الفتح الأول يمكن الاستعمال لمدة 6 أشهر.

### ٦. معلومات إضافية:

- يحتوي الدواء بالإضافة لل المادة الفعالة أيضًا:
- Wool fat, kaolin, paraffin white soft, isopropyl myristate, zinc oxide, titanium dioxide, heavy liquid paraffin, dimethicone, squalane, propyl parahydroxy benzoate, butyl hydroxy toluene.
- كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العلبة:
- أنبوب من الألومنيوم تحيطى 30 غرام ياستا بلون تقريراً أبيض.
- اسم المنتج وصاحب التسجيل: ياديسيس إسرائيل فارماسيتيكا. م.ض.، شارع رحفت 1، شوهام.
- تم إعدادها في تشرين الثاني 2022 بموجب تعليمات وزارة الصحة.
- رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة: 147-39-33586.
- من أجل سهولة وتوسيع القراءة، تمت صياغة هذه الشرة بصيغة المذكرة. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكل الجنسين.

### ١. لأي غرض مخصوص الدواء؟

لعلاج التسممط (التهاب الجلد) الناجم عن سلالات الفطريات الحساسة للكلورتيمازول.

**الفصيلة العلاجية:** مستحضر مضاد للفطريات من فصيلة الإيميدازولات.

### ٢. قبل استعمال الدواء

لا يجوز استعمال الدواء:

- إذا كنت أنت أو طفلك تعاني من حساسية (اليرجيا) للمادة الفعالة، أو لكل واحد من المركبات المصنوعة من المطاط مثل الواقع التكسي أو الديفراكس (الغاز الألأني). لذلك، إذا كان الدواء مخصوصاً للاستعمال في الأعضاء التناسلية، عليك استعمال مواع حمل بديلة لمدة خمسة أيام على الأقل بعد استعمال هذا الدواء.
- لا يجوز استعمال هذا الدواء في أولات حروق متقاربة أو لفترات زمنية طويلة بدون استشارة الطبيب.
- لا يجوز الاستعمال على حروق مفتوحة.
- يجب تجنب تناول المستحضر مع العينين أو الفم، في حالة التماس مع العينين أو الفم، يجب الشطف جيداً بالماء ومرة واحدة الطبيب.

تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال الدواء:

- مثل مستحضرات أخرى دهنية مثل مرهم فارلين، قد يقلل أچیستن پاستا من نجاعة مواع الحمل المصنوعة من المطاط مثل الواقع التكسي أو الديفراكس (الغاز الألأني). لذلك، إذا كان الدواء مخصوصاً للاستعمال في الأعضاء التناسلية، عليك استعمال مواع حمل بديلة لمدة خمسة أيام على الأقل بعد استعمال هذا الدواء.
- لا يجوز استعمال هذا الدواء في أولات حروق متقاربة أو لفترات زمنية طويلة بدون استشارة الطبيب.
- لا يجوز الاستعمال على حروق مفتوحة.
- يجب تجنب تناول المستحضر مع العينين أو الفم، في حالة التماس مع العينين أو الفم، يجب الشطف جيداً بالماء ومرة واحدة الطبيب.

قبل العلاج يأپيسيت پاستا، ادخل للطبيب إذا:

- لم تكن واثقاً أنك أو طفلك، في حالة ظفح الخصائص) تعاني من تلوث فطري.
- كان متلقى العلاج حساساً أي طعام أو لأي دواء.

إذا كنت أنت أو طفلك تستعملان، أو إذا استعملتا مoxizأراً دوائية أخرى، بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، ادخل للطبيب أو الصيدلي عن ذلك.

الحمل والرضاع: إذا كنت حاملاً، تحاولين الحمل أو مرضعة، يجب استشارة الطبيب أو الطاقم الطبي قبل استعمال الدواء.

- في حال أنه قد أبلغت الطبيب / الطاقم الطبي، يجب اتباع توجيهاتهم بحذر.

معلومات مهمة عن بعض مركبات الدواء

- أچیستن پاستا يحتوي على هيدروكستيلولون بوطيل (Butylated hydroxytoluene) وولفات (wool fat) (الذان قد يؤدي إلى أعراض جلدية موضعية (مثل التهاب الجلد التماسي)، أو تبيّح بالعينين وفي الأغشية المخاطية).

### ٣. كيف تستعمل الدواء؟

- عليك الاستئناف من الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن واثقاً في حفظ ذلك الدواء بدون وصفة طبيب يجب اتباع تعليماته.
- إذا اقتربت الندواء بدون وصفة طبيب يجب اتباع التعليمات التالية بحذر:
- المقدار الوائي الاحتياطي يشكل علبة: يجب دهن 2-3 مرات في اليوم في المنطقة المصابة.

كثيفة الاستعمال: ادهن بشكل متساو طبقاً دقيقة من الواسطة على جلد تطيف، جاف ومهوى وأدخله إلى داخل الجلد بالدلوك الطيفي. يشكل علامة تفكي كمية قليلة بقدر 1/6 سم بأسنان التقطيع منطقية بحجم كفة اليد.

- مدة العلاج تتفق بنوع التلوث. يشكل علامة تفكي كافية لفترة زمنية لا تقل عن الأربعة، ولكن قد تكون هناك حاجة لفترة علاج من 4 أسابيع.
- في حالة تلوث في الجلد، مثل الحكة أو الالم، يمكن أن تتحسن في غضون بضعة أيام من العلاج. بالرغم من ذلك، علامات كالاحمرار وتنفس الجلد قد تختفي بعد وقت أطول. إذا استمرت الأعراض، اشتهر الطبيب.

لا تتجاوز المقدار الدوائي الموصى به.

لا يستعمل الخارجى فقط.

- إذا بلع طفل أو شخص آخر بالخطأ من الدواء، توجه حالاً للطبيب أو لغرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر عليه الدواء معك.

إذا نسيت استعمال الدواء في الوقت المطلوب، استعمل الدواء بأسرع وقت ممكن وواصل