

אגיסטון® פסטה

קלוטרימזול 1% W/W Clotrimazole

חומרים בלתי פעילים ואלרגניים בתכשיר - ראה סעיף 2 "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה" וסעיף 6 "מידע נוסף".

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע ממציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

עליך להשתמש בתרופה בצורה נכונה. היוועץ ברוקח אם הנך זקוק למידע נוסף. עליך לפנות אל הרופא באם סימני המחלה (סימפטומים) מחמירים או שאינם משתפרים לאחר 7 ימים.

1. למה מיועדת התרופה?

לטיפול בשפשופות וזיהומי עור הנגרמים על ידי זני פטריות הרגישים לקלוטרימזול.

קבוצה תרופוטית: תכשיר אנטי-פטריתי מקבוצת האימיזאזולים.

2. לפני שימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה:

- אם אתה או ילדך רגישים (אלרגיים) לחומר הפעיל, או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה.
- לטיפול בזיהומים בקרקפת או בציפורניים.

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה:

כמו תכשירים אחרים שומנים כדוגמת משחת זולין, אגיסטון פסטה עלול להפחית את היעילות של אמצעי מניעה העשויים גומי, כגון קונדום או דיאפרגמה. לכן, אם התרופה מיועדת לשימוש באברי המין, עליך להשתמש באמצעי מניעה חלופי למשך לפחות חמישה ימים לאחר השימוש בתרופה זו.

• אין להשתמש בתרופה זו לעיתים קרובות או לתקופה ממושכת בלי היוועץ ברופא.

• אין להשתמש על פצעים פתוחים.
• יש להימנע ממגע התכשיר עם העיניים והפה. במקרה של מגע עם העיניים או הפה, יש לטשוף היטב עם מים ולפנות לרופא.

לפני הטיפול באגיסטון פסטה, ספר לרופא אם:

- אינך בטוח שאתה (או ילדיך, במקרה של תפירת חיטולים) סובל מזיהום פטריתי.
- המטופל רגיש למזון כלשהו או לתרופה כלשהי.

אם אתה או ילדך לוקחים, או אם לקחתם לאחרונה תרופות אחרות, כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.

הריון והנקה:

אם הנך בהריון, מנסה להרות או מניקה, יש להיוועץ ברופא או בצוות הרפואי לפני השימוש בתרופה.
במידה וכבר יידעת את הרופא/הצוות הרפואי, יש לעקוב בזהירות אחר הנחיותיהם.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה

אגיסטון פסטה מכיל הידרוקסיטולואן בוטיל (Butylated hydroxytoluene), וול פאט (Wool fat), העלולים לגרום לתופעות מקומיות בעור (למשל דלקת עור ממגע), או גירוי בעיניים ובריריות ממברנות.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח.

מרח בצורה והתרופה נרשמה לך על ידי הרופא יש לעקוב אחר הנחיותיו.
אם רשעת את התרופה ללא מרשם יש לעקוב בזהירות אחר ההוראות הבאות:

- **המינון המקובל** בדרך כלל: יש למרוח 2-3 פעמים ביום באזור הנגוע. אופן השימוש:

מרח בצורה שווה שכבה דקה מהפסטה על עור נקי, יבש ומאוורר והחדר אל תוך העור ע"י עיסוי עדין. בדרך כלל תספיק כמות קטנה באורך של 1/2 ס"מ פסטה לניסוי אזור בגודל כף היד.

משך הטיפול תלוי בסוג הזיהום. באופן כללי, נדרש להשתמש לפרק זמן של לפחות שבועיים, אולם ייתכן שיידרש זמן טיפול של 4 שבועות.

במקרה של זיהום בכף הרגל, כדאי להשתמש גם באבקה אנטי-פטריתית. היוועץ ברופא או ברוקח לקבלת המלצה על תכשיר מסוים.

התסמינים של זיהום בעור, כגון גרד או כאב, אמורים להשתפר תוך מספר ימי טיפול. עם זאת, סימנים כגון אדמומיות וקילוף העור עשויים להיעלם לאחר זמן רב יותר. אם התסמינים נמשכים, התייעץ עם הרופא.

אין לעבור על המנה המומלצת.

שימוש חיצוני בלבד.

אין להכניס את התרופה לפה או לבלוע.

אם בטעות בלע ילד או מישהו אחר מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מיון

של בית חולים והבא את אריזת התרופה איתך.
אם שכחת להשתמש בתרופה בזמן הדרוש, השתמש בתרופה בהקדם האפשרי והמשך בטיפול כרגיל.

כיצד תוכל לסייע להצלחת הטיפול?

• על אף שהאזור הנגוע יגדל, יש להימנע מגירודו. הגירוד יגרום נזק לפני השטח של העור וכך יגרום להתפשטות הזיהום.

• שמור על האזור הנגוע נקי.
• לחות מעודדת את צמיחת הפטריות, לכן יש לשמור על יובש במקום הנגוע, אך יש להימנע משפשוף יתר.

• יש לרחוץ את האזור הנגוע ולייבשו לפני כל מריחה של התרופה. בין טיפול לטיפול - ניתן להשתמש באבקה נגד פטריות כדי שהמקום יישאר יבש.

• יש לטשוף את הידיים תמיד לאחר הטיפול בזיהום על מנת למנוע את התפשטותו.

• אל תחלוק עם אנשים אחרים מגבות, שטיחוני אמבטיה וכדומה, כיוון שהזיהום עלול לעבור אליהם.

• אם הטיפול הינו ברגליים -
• יש להקפיד על רחיצה יסודית וייבוש במיוחד בין הבהונות.

- רצוי להשתמש בגרביים מכותנה; יש להימנע מלגרום גרביים מצמר או מחומרים סינטיטיים. רצוי להחליפם מספר פעמים ביום (לפי כמות הזיעה).

- כבס ביסודיות את הגרביים, גרבי הניילון והגרביונים במים חמים כדי להסיר את כל העור שהתקלף את את נבגי הפטריות.

- בעונות המתאימות מומלץ לנעול סנדלים ללא גרביים.
• אין ליטול תרופות בחושר! בדוק את התוויות והמנה בכל פעם שהנך נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הנך זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש באגיסטון פסטה עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. יתכן שלא תסבול מאף אחת מהן.

כמו בכל התרופות, ישנם אנשים שעלולים להיות אלרגיים לתרופה. אם אתה או ילדך אלרגיים, התגובה תתפתח מיד לאחר התחלת השימוש. במידה ואתה או ילדך חווים תגובה אלרגית, יש להפסיק את השימוש ולפנות מיד לקבלת סיוע רפואי. הסימנים לתגובה אלרגית עשויים לכלול:

פריחה, בעיות בבליעה או בנשימה, נפיחות של השפתיים, הפנים, הגרון או הלשון, חולשה, בחילה, סחרחורת או עילפון.

כמו כן, הפסק את הטיפול ופנה לרופא אם לאחר השימוש מופיעים: אדמומיות, גירוי או פריחה בעור (נדיר), גרד, שלפוחיות, צריבה, אי נוחות, נפיחות, קילוף של העור.

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה, או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צוינה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

דייווח על תופעות לוואי:

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דייווח על תופעות לוואי" עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או ע"י כניסה לקישור: <https://sideeffects.health.gov.il>

בנוסף, ניתן לדווח לחברה באמצעות הכתובת הבאה: Padagis.co.il

5. איך לאחסן את התרופה?

• מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופות אחרות יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם של ילדים /או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.

• אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה/השפופרת. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.

• אחסן מתחת ל-25°C. לאחר פתיחה ראשונה ניתן להשתמש במשך 6 חודשים.

6. מידע נוסף

נוסף על החומר הפעיל התרופה מכילה גם:

Wool fat, kaolin, paraffin white soft, isopropyl myristate, zinc oxide, titanium dioxide, heavy liquid paraffin, dimethicone, squalane, propyl parahydroxy benzoate, butyl hydroxy toluene.

• כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:
• שפופרת אלומיניום המכילה 30 גרם פסטה בצבע כמעט לבן.

יצרן ובעל הרישום: פאדאגיס ישראל פרמצבטיקה בע"מ, רח' רקפת 1, שוהם. נערך בנובמבר 2022 בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות: 147-39-33586

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לשני המינים.