

## **Инструкция по применению в соответствии с Положением о фармацевтах (препаратах) – 1986**

Это лекарство отпускается без рецепта врача

# Агистен Паста

## **Клотримазол Clotrimazole 1% W/W**

Неактивные вещества и аллергены в составе препарата - см. раздел 2 "Важная информация о некоторых ингредиентах препарата" и раздел 6 "Дополнительная информация".

**Внимательно прочитайте эту инструкцию полностью, прежде чем использовать лекарство.** Эта инструкция содержит краткую информацию о лекарстве. Если у Вас есть дополнительные вопросы, обратитесь к врачу или фармацевту.

Правильно применяйте лекарство. Проконсультируйтесь с фармацевтом, если Вам нужна дополнительная информация. Обратитесь к врачу, если симптомы болезни ухудшаются или не улучшаются через 7 дней.

### **1. Для чего предназначено лекарство?**

Для лечения потертостей и кожных инфекций, вызванных видами грибов, чувствительными к клотримазолу.

**Терапевтическая группа:** противогрибковый препарат из группы имидазолов.

### **2. Перед использованием лекарства**

#### **Не используйте лекарство:**

• Если у Вас или Вашего ребенка повышенная чувствительность (аллергия) к активному ингредиенту или к любому из других ингредиентов, содержащихся в этом лекарстве.

• Для лечения инфекций кожи головы или инфекций ногтей.

#### **Особые предостережения в связи с применением этого лекарства:**

• Как и другие жиросодержащие препараты, такие как вазелиновая мазь, паста Агистен может снижать эффективность противозачаточных средств, изготовленных из резины, таких как презерватив или диафрагма. Поэтому, если лекарство предназначено для лечения инфекций половых органов, используйте иные контрацептивы в течение, по меньшей мере, пяти дней после применения этого лекарства.

• Не используйте это лекарство часто или в течение длительного периода без консультации с врачом.

• Не используйте на открытых ранах.

• Избегайте контакта препарата с глазами и ртом. При попадании в глаза или рот тщательно промойте водой и обратитесь к врачу.

#### **Перед использованием пасты Агистен сообщите врачу, если:**

• Вы не уверены, страдаете ли Вы (или Ваш ребенок, в случае опрелостей) грибковой инфекцией.

• Пациент чувствителен к каким-либо пище или лекарствам.

**Если Вы или Ваш ребенок принимаете или недавно принимали другие лекарства,** включая лекарства, отпускаемые без рецепта, и пищевые добавки, сообщите об этом врачу или фармацевту.

#### **Беременность и кормление грудью:**

Если Вы беременны, планируете забеременеть или кормите грудью, проконсультируйтесь с врачом или медицинским персоналом перед использованием лекарства.

Если Вы уже проинформировали врача/медицинский персонал, внимательно следуйте их инструкциям.

#### **Важная информация о некоторых ингредиентах этого лекарства**

Паста Агистен содержит бутилгидрокситолуол (Butylated hydroxytoluene) и шерстяной воск (Wool fat), которые могут вызывать местные эффекты на коже (например, контактный дерматит) или раздражение глаз и слизистых оболочек.

### **3. Как использовать лекарство?**

Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом, если Вы не уверены.

Если лекарство было прописано Вам врачом, следуйте его указаниям.

Если Вы приобрели лекарство без рецепта, внимательно соблюдайте следующие правила:

• **Стандартная дозировка:** как правило, следует наносить на пораженный участок 2-3 раза в день.

#### **Способ применения:**

Равномерно нанесите тонкий слой пасты на чистую, сухую и проветренную кожу и легкими массирующими движениями вотрите в нее. Небольшого количества пасты длиной 1/2 см, как правило, достаточно, чтобы покрыть площадь кожи размером с ладонь.

Продолжительность лечения зависит от типа инфекции. В большинстве случаев лекарство используют в течение как минимум двух недель, хотя иногда может потребоваться лечение в течение 4 недель.

В случае инфекции стопы рекомендуется дополнительно использовать противогрибковый порошок. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом для рекомендации подходящего препарата.

Симптомы кожной инфекции, такие как зуд или боль, должны исчезнуть в течение нескольких дней лечения. Однако такие признаки, как покраснение и шелушение кожи, могут исчезнуть позже. Если симптомы продолжают, обратитесь к врачу.

**Не превышайте рекомендуемую дозу.**

**Только для наружного применения.**

**Не следует брать лекарство в рот или глотать его.**

Если ребенок или кто-то другой случайно проглотил лекарство, немедленно обратитесь к врачу или в приемный покой больницы и возьмите с собой упаковку лекарства.

Если Вы забыли применить лекарство в требуемое время, используйте лекарство как можно скорее, а затем продолжайте лечение в обычном режиме.

#### **Как Вы можете способствовать успеху лечения?**

• Хотя пораженный участок может зудеть, не расчесывайте его. Расчесывание повредит поверхности кожи и вызовет распространение инфекции.

• Содержите пораженный участок в чистоте.

• Влага способствует росту грибка, поэтому держите пораженный участок сухим, но избегайте чрезмерного растяжения кожи.

• Необходимо вымыть и высушить пораженный участок перед каждым применением лекарства. В перерывах между процедурами можно использовать противогрибковый порошок, чтобы участок оставался сухим.

• Всегда мойте руки после обработки инфицированного участка, чтобы предотвратить распространение инфекции.

• Не используйте полотенца, коврики для ванны и т. д., которыми также пользуются другие люди, так как инфекция может им передаваться.

• Если требуется лечение ног –

- Тщательно вымойте и высушите ноги, особенно между пальцами.

- Желательно использовать хлопчатобумажные носки; не носите носки из шерсти или синтетических материалов. Желательно менять носки несколько раз в день (по мере накопления пота).

- Тщательно стирайте носки, нейлоновые носки и колготки в теплой воде, чтобы удалить отшелушившуюся кожу или споры грибов.

- В соответствующие сезоны рекомендуется носить сандалии без носков.

• Не принимайте лекарства в теплом! Проверьте этикетку и дозу **при каждом применении** лекарства. Если Вы пользуетесь очками, наденьте их.

Если у Вас есть дополнительные вопросы по применению препарата, обратитесь к врачу или фармацевту.

### **4. Побочные эффекты**

Как любое лекарство, паста Агистен может вызвать побочные эффекты у некоторых пользователей. Не беспокойтесь, читая перечень этих явлений. Возможно, что Вы не испытаете ни одного из них.

Как и в случае с любым лекарством, у некоторых пациентов может вывиться аллергия на данное лекарство. Если у Вас или Вашего ребенка есть аллергия, реакция разовьется сразу после начала использования. Если Вы или Ваш ребенок испытываете аллергическую реакцию, немедленно прекратите лечение и обратитесь к врачу. Признаки аллергической реакции могут включать: сыпь, проблемы с глотанием или дыханием, отек губ, лица, горла или языка, слабость, тошноту, головокружение или обморок.

Кроме того, прекратите лечение и обратитесь к врачу, если после применения лекарства возникнут следующие явления: покраснение, раздражение кожи или сыпь (редко), зуд, волдыри, жжение, неприятные ощущения, отек, шелушение кожи.

При возникновении побочного явления, ухудшения какого-либо из побочных явлений или при появлении побочного эффекта, не указанного в данной инструкции, Вам следует проконсультироваться у врача.

#### **Сообщение о побочных эффектах:**

О побочных эффектах можно сообщить в Министерство здравоохранения, нажав на ссылку "Сообщение о побочных явлениях вследствие лекарственного лечения" расположенную на главной странице интернет-сайта Министерства здравоохранения ([www.health.gov.il](http://www.health.gov.il)), которая направляет Вас к онлайн-форме для сообщения о побочных эффектах, или перейдя по ссылке:

<https://sideeffects.health.gov.il>

Кроме того, Вы можете обратиться напрямую в компанию по следующему адресу: [Padagis.co.il](mailto:Padagis.co.il)

### **5. Как хранить лекарство?**

• Избегайте отравления! Это лекарство, как и любое другое, следует хранить в закрытом месте, недоступном для детей и/или младенцев, во избежание отравления. Не вызывайте рвоту без соответствующего указания врача.

• Не используйте лекарство после истечения срока годности (exp. date), указанного на упаковке/тюбике. Срок годности относится к последнему дню месяца, указанного на упаковке.

• Хранить при температуре ниже 25°C. После первого открытия упаковки можно использовать лекарство в течение 6 месяцев.

### **6. Дополнительная информация**

В дополнение к активному ингредиенту, лекарство также содержит:

Wool fat, kaolin, paraffin white soft, isopropyl myristate, zinc oxide, titanium dioxide, heavy liquid paraffin, dimethicone, squalane, propyl parahydroxy benzoate, butyl hydroxy toluene.

• Как выглядит лекарство и что содержится в упаковке:

Алюминиевый тюбик, содержащий 30 г пасты почти белого цвета.

**Производитель и владелец регистрации:** Падагис Исраэль Фармацевтика Лтд., ул. Ракефет 1, Шохам.

Отредактировано в ноябре 2022 года в соответствии с указаниями Министерства здравоохранения.

Регистрационный номер лекарственного средства в Национальном реестре лекарственных средств Минздрава: 147-39-33586