

רסג'ילין-תרימה טבליות

חומר פעיל:
כל טבלייה מכילה:
rasagiline (as mesylate) 1 mg
רseg'ilyin (as mesylate) 1 mg

לרשימת החומרים הבלטי פיעלים בתכשיר, ראה סעיף 6 –
"מידע נסוכ".

קריא בעין את העalon עד סוף בטروم תשמש בתורופה.
עלין זה מוביל מזע ומציעו לעתורפה. אם יש לך שאלות
תורופה זו נרשה לטיפול במלחתך. אל תעביר אותה
לאחרם. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נהאה לך כי מצב
הרופא דומה.

1. מה מיודעת התרופה?
לטיפול בפרקינסון לטיפול יחיד או בשילוב עם לבודפה.
קבוצה תרפיטית:
ocabacinone או אוקסידאצ סלקטיבי מסוג B MAO.

2. לפני השימוש בתורופה:
אין להשתמש בתורופה אם:
• אהה ריש (אלרגי) לחומר הפעיל (רseg'ilyin) או לכל אחד
המרגבים הנופפים אחריו. ראה סעיף 6 – "מידע נסוכ".
• אתה סובול מאי ספיקת כבד חמורה.
הבאות:
• פתידין (משרק איבים חזק).
• מעכבי מנואמינ אוקסידאצ (בן) אם יונתנים כתורופות גנד
די-פין, בין-כך אונאקסטין או כל התוויה אחרנת,
ובכל כשרים טבויים או תשריר רפואיים (לסקלן St. John's Wort).
לא מרשם רפואי, בגין בחוץ בין-כך אוכל.
חויה להמתן 14 ימים לפחות בין הפסקה נטילת
רseg'ilyin-תרימה והתחלה הטיפול עם מעכבי מנואמין
אוקסידאצ או עם פטידין.

אלארות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתורופה:
לפני התחלת הטיפול ברseg'ilyin-תרימה, סופר על רפואי אם:
• אהה סובול מבעל בכבד.
• החנתה בשינויים שודדים בעור. טיפול עם רseg'ilyin-תרימה
על להגביה את הסיכון לסרטן העור.
יש לדוח על רפואי אם משפטים המטפל בחינוך יאנה את
המוחת התהנוות ררגאות שבחן אין עמד בדף, גירוי
עלולים להופיע על יכולת לушות זאת. רseg'ilyin-תרימה
יכול לגרום ללחזרות או למגום וכן יכול גם לגרום לאירועים
של הירדנות פתאומית.

במחלת הפרקינסון נצפו פרעות בהתנהגות, כגון התנהגות
כפיטית, מחשבות אובססיביות, התמכרות לhimories
הוואות מוגדרות, דחף להנאהות הריגת, דף מי מוגבר
או מוחשוב/יגישום מינימל מוגברים. הרופא שיקול התאמת
המנין האנקטת הורופה (ראה סעיף 4 – "מידע נסוכ").
רseg'ilyin-תרימה עלול לרמות למגום ובערך היום
בפתחות ופיזיונות אחרות (המשות לטיפול במחלת
תרופות ופיזיונות אחרות) למציג נסוכ עין בסעיף "נהיגה ושימוש במכונות".

יש לדוח על הרופא או הרוקח אם אתה מעשן או מתcenך
לבדוקם סטטוס בתכשיר. עישן יכול להזיק רמות הרseg'ilyin בדם.
הירוקן אונאקסטין טיפול קיבע על-ידי הרופא בלבד. המין
המקובל בדרך כלל הוא טבליהichert שאל 1 מ"ג עם ביום
עם או ביל אול.

יש להשתמש בתורופה זו בזמנים קבועים כפי שנקבע עלי-ידי
הרופא. העילות והבטיחות של רseg'ilyin באוכלוסייה הילידים
וחומרם לא נבדקן; אין שימוש בתורופה לטיפול במחלת
פרקינסון בלבדים ובתבגרים. לפיך, רseg'ilyin-תרימה אין
מייעד לשימוש בתבגרות לגיל 18.

גיגובות בין תרופות:
אם אתה לוקח, אם לך חקמתה לאחרונה או אם אתה מתכוון
לקחת תרופה אחרת ככל תרופה לאלה רופא או הרוקח.
במיחודה אם אתה לוקח:

• תרופות נגד דיאכאנ (างן טריציקליים, טרוציקליים, מעכבים
סלקליקינים של סופיה קודרת לשרטוטן [SERT], מעכבי
ספגואה צהרתת לשרטוטן-טראופנטין [SERT], מעכבי
טראופולוקטין [מדא-שייל]).
• דקסטרומטורופן (מדא-שייל).

ונגיד גם הדינטינטם אדרפרין או סואואדרפין.
הצטנות המילית אדרפרין או סואואדרפין.

• פטידין – ראה בסעיף 2 – "אין להשתמש בתכשיר".
יש להמן ממשום בהרבה, אז – בוגנים עם תרופה
ונגודות דיאקאנ מלכילות פלאואקטין או פלאואקטין. יש
להתמנון תקופת של 5 שבועות לפחות לאחר הפסיק הטיפול
בפלאואקטין ועד תחילת הטיפול ברseg'ilyin-תרימה. כמו
כך, אם אתה מהלך טיפול בפלאואקטין או פלאוקטמין
יש לפחותzeit את פטידין 14 ימים לאחר הפסיק הטיפול
ברseg'ilyin-תרימה.

4. תופעות לוואי:
נינת ליטול את התרופה עם או ביל אוכל.

הירין והנקה:
אם אהת בהירין או מניקה, חושדת שת באhirion או שוקלת
להיכנס להירין יש ליתוועץ ברופא או ברוקח טרם השימוש
בתרופה. את צרכיה להרמע מליקת רseg'ilyin-תרימה אם
וחורף מיי מוגבר מהרגיל או מחשבות מיניות מוגברות
ולע עברך אין יודעת.

הניגעה ושימוש במכונות:
יש להזכיר ברופא לפני שאתת נוהג ומפעלי מכונות, לאחר
שמחלפת קירוקין על גוףך, כמו גם הטיפול ברseg'ilyin-תרימה,
עלולים להופיע על יכולת לушות זאת. רseg'ilyin-תרימה
יכול לגרום ללחזרות או למגום וכן יכול גם לגרום לאירועים
של הירדנות פתאומית.

ההשפה יכולה להיות מוגברת אם אתה לוקח תרופה
שעלול להיות סיכון מוגבר לטרטן העור (מלטמה) בשימוש
בתורופה זו (ראה סעיף 2 – "לפניהם השימוש בתורופה").

3. כיצד השתמש בתורופה?
יש להשתמש בתורופה תמיד לפי הוראות הרופא. עליין
לבדוקם סטטוס בתכשיר. עישן יכול להזיק רמות הרseg'ilyin בדם.
הירוקן אונאקסטין טיפול קיבע על-ידי הרופא בלבד. המין
המקובל בדרך כלל הוא טבליהichert שאל 1 מ"ג עם ביום
עם או ביל אול.

אין לעבורי על המנה המומלצת
בביברעד קוק צחיה, אוור לחזאת את הטבליות. אין מידי לעגב
כתישה/לעיסיה. יש לבלוע את הטבליה בשלהותם עם מים.
סחזרות:
• אונאקסטין (חויסר תיאבון)

• עצירות
• יובש בפה
• חזה והקאה
• גדים בעורכת העיכול
• תוצאות לא תקין בבדיקה דם (ליקופניה – מיעוט תא
דם לבנים)
• כאבי מפרקים
• דלקת מפרקם (arteritis)
• חור כחישה וחולשה בשוריין כף היד (carpal tunnel)

• דיסיאן
• כאב שרירים
• מחלת דלקת (אך)
• גירוי של העור (דלקת עור – דרמטיטיס)
• פריחה
• עינין אדומות ונפוחות (דלקת הלחמית)
• דלקת מעתן שתן

5. תופעות לוואי:
כמו בכל תרופה, השימוש ברseg'ilyin-תרימה עלול לגרום
לתופעות לוואי בולוק הומתמשים. אל תבלול למקרה
רישמת תופעות הלוואי. יתכן שלא תסבול מכך אחות מהן.

יש לנפות מיד לרופא:
• אחת מפה התהנוויות ריגיות כגון התנהגות כבון הירין או שוקلت
מחשבות אובייסיביות, התהנוות להורם, החזאות או
רישות מגאות, השגהת מתן דף (אימופוליביטי) אם
וחורף מיי מוגבר מהרגיל או מחשבות מיניות מוגברות
(הפרעות שליטה על דחפים) (ראה סעיף 2 – "לפניהם השימוש
בתורופה").

• אהה רואה או שמע דברים שלא קיימים (הזהות).
• בעל שליחות של החיים, חום, חוסר מנוחה, רעד או הצהה
(הסמנת סרטוניון).

תופעות לוואי שכיחות איננה ידועה (לא ניתן לדעת את

השכיחות מ너וך הגנתונים הקיימים)

5. איך לאחסן את התרופה?
• מעת רעלול תרופה זו וכי תרופה אחרת יש לשמור
במקרים מסוים מחוץ לחישג ידים וטווח ראייתם של ילדים ו/או
תינוקות ועל-ידי קר המגע הרעלול. אל גורם להזקה לא
הרואה מופשטים מהרופה.

• אין להשתמש בתרופה אחריה תאריך התופגה (exp. date) (date)
הנופיע על גבי האריה. תאריך התופגה מתייחס ליום
האחרון של אותו חודש.

• תגיא אחסון: יש לאחסן בתנאי-תמפרטורת 25°C, באריה המקורית.
• אין להשיליך תרופות לביב או לאשפפה. שאל את הרוקח
יעד להש大学毕业 תרופות שכן אין בשימוש. אמצעים אלו יעוזו
לשמור על הסביבה.

6. מידע נוסף:
נכסף על המרכיב הפעיל, התרופה מכילה גם:
Mannitol, maize starch, pregelatinized starch, stearic acid, colloidal silicon dioxide.

כיצד נראית התרופה ומה תוקן האריה:
טבלייה עגולה, קמראת מימי הצדדים, בצעב בעלן.
ארזהה מילוי 10 ו-30tbl. ו-10tbl. ו-3tbl. ו-1tbl. ואילו גודל הארים מושקם.

שם היוצר ובעל הרישום וכטבבמו:
רביבה תעשיית רפואה ישראליים מعتبرות בע"מ, מعتبرות
గבריאות: 4023000, 4023000, 155-62-34403-00
ערוך במרץ 2023 בהתאם להנחיות משרד הבריאות.
מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי בישראל
גבריאות: 155-62-34403-00
לשם הפניות ולהקלת הקရאה עלון זה נוסח בלשון זכר. על
אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.

7. תופעות לוואי שכיחות איננה ידועה (לא ניתן לדעת את

השכיחות מנהר הגנתונים הקיימים)

8. משלוח ומשלוחים:
0323B מעבorthות 04023000 תעשיית רפואה ישראליים
0323B מעבorthות בע"מ

