


أكامولي

فورته

فتائل 250 ملخ



التركيز

تحتوي كل فنتلة على:

باراسيتامول 250 ملخ (mg) Paracetamol

لائحة المواد الغير الفعالة ومولدات الحساسية في المستحضر، أنتظر
 الفقرة 6 - "معلومات إضافية".

إنّ النشرة تتبعن حتى نهايتها قبل إستعمال الدواء. تحتوي
 هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا توفرت لديك
 أسئلة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي.

يُطلى هذا الدواء من دون حاجة لوصفة طبيب وهو مخصص
 للأطفال من عمر 6 سنوات وما فوق لخفض السخونة ولتسكين
 الآلام.

بالإمكان إستعمال الدواء لدى الكبار أيضًا.
 عليك مراجعة الطبيب إذا استمرت السخونة لأكثر من 3 أيام
 أو إذا تفاقمت الأعراض أو لم تزل خلال 5 أيام رغم إستعمال
 الدواء.

يجب إعطاء الدواء بالشكل الصحيح. إستشر الصيدلي إذا كنت
 بحاجة لمعلومات إضافية.

(1) لأي غرض مخصص الدواء؟

الدواء مخصص لتسكين الآلام ولخفيف السخونة.
 للإستعمال في فتحة الشرج (rectal).

الفصيلة العلاجية:
 مُسكن للآلام وخافض للسخونة.

(2) قبل إستعمال الدواء

لا يجوز إستعمال هذا الدواء إن:

- وُجدت حساسية لـ باراسيتامول أو لإحدى مركبات الدواء الأخرى المفصلة في الفقرة 6.

تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء

- إذا ظررت في الماضي لدى بالغ/ طفل أمراض جانبية جلدية نتيجة تناول مستحضرات تحوي باراسيتامول، فلا يجوز إعطاء مستحضرات تحوي باراسيتامول، كي لا تحدث ثانية أمراض جانبية جلدية خطيرة.

• يحتوي المستحضر على باراسيتامول الذي قد يسبب ضرراً في الكبد عندما:

◦ يُعطى بمقادير دوائية أعلى من الموصى بها أو لفتره مطولة.

◦ يتم شرب المشروبات الكحولية خلال فترة العلاج.

• لا يجوز تناول أدوية إضافية تؤثر على نشاط الكبد.

◦ لا يجوز إعطاء هذا الدواء في أوقات مقاربة، بدون إستشارة الطبيب.

• لا يجوز تناول أدوية إضافية لخفض السخونة ولتسكين الآلام أو أدوية للزكام بدون إستشارة طبيب أو صيدلي، وذلك لمنع حدوث فرط المقادير الوائي أو التسمم بباراسيتامول.

• لا يجوز تناول أدوية إضافية من "عائلة" أكامول أو مستحضرات إضافية التي تحوي باراسيتامول.

• يجب الامتناع عن إستعمال مقدار دوائي عالي (وذلك ضمن الحدود الموصى بها) من هذا الدواء أثناء الصوم.

• إذا وُجدت لديك أو لدى طفلك حساسية لأي طعام أو لأي دواء، عليك إبلاغ الطبيب عن ذلك قبل إعطاء الدواء.

يجب استشارة الطبيب قبل به العلاج إذا كنت أنت أو المتعالج تعاني/يعاني أو عانيت في الماضي من:

◦ مرض كبدى أو خلل في وظائف الكبد

◦ خلل في وظائف الكلية

◦ الإيدمان على الكحول

◦ يرقان

◦ إذا كانت المتعالجة في فترة الحمل أو الرضاعة

• التفاعلات بين الأدوية

إذا كان المتعالج تناول، أو إذا تناول مؤخرًا، أدوية أخرى، بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، إلخ للطبيب أو للصيدلي عن ذلك. يجب إبلاغ الطبيب أو الصيدلي بالأخضر إذا كان المتعالج يتناول دواء من المجموعات التالية أو إذا أنهى الآن العلاج بدواء:

◦ مضادات تختثر الدم، مثل وارفارين.

• مستحضرات تنشط إنتاج الإنزيمات في الكبد (على سبيل المثال: ريفامبيسين، باربیتون، باربیتونات - دواء للتخدیر).

◦ أدوية للصرع - بيتريوتين، كاربامازيبين.

• مستحضرات مضادة للإلتهاب لاستيرودية.

◦ ميتوکوبراميد أو دومپيريدون (العلاج العثاني، التقيؤ ومشاكل هضمية إضافية).

◦ كلورامفينيكول، فلوكلوكاساسيلين (مضاد حيوي).

◦ بروبيونيسيد (العلاج التقرفي ويعطى أحياناً لرفع تعب البنبيسيلين في الدم).

◦ كوليستيرامين (الخفض فائض الشحوم في الدم).

• إستعمال باراسيتامول وإستهلاك الكحول

◦ لا يجوز إستهلاك الكحول أثناء العلاج بـ باراسيتامول بسبب زيادة الخطورة لحدوث ضرر للكبد.

الحمل والإرضاع

إذا كانت المتعالجة حاملاً أو مرضعة، يجب إستشارة الطبيب قبل بدء إستعمال هذا الدواء.

الاستعمال لدى الأطفال

على الوالدين إبلاغ الطبيب المعالج عن كل عرض جانبي وكذلك عن كل دواء إضافي يعطيه لطفل.

◦ لا يجوز إعطاء الكحول لطفل أو أدوية تحتوي على الكحول، أثناء العلاج بهذا الدواء.

يتبّع

(3) كيفية إستعمال الدواء؟

عليك الاستيفاح من الطبيب أو من الصيدلي إذا لم تكن واثقاً بخصوص المقدار الدوائي وطريقة العلاج بالمستحضر.

يُحدد المقدار الدوائي حسب وزن الطفل، يجب استشارة الطبيب/ الصيدلي لتحديد المقدار الدوائي المناسب لوزن طفلك.
المقدار الدوائي الإعتيادي في حال عدم وجود تعليمات أخرى من الطبيب:

أطفال حتى عمر 6 سنوات: حسب تعليمات الطبيب فقط.

أطفال بعمر 6-12 سنة: فنتيلين، 4-5 مرات في اليوم.

كبار: فنتيلين 4 ساعات على الأقل قبل إعطاء مقدار دوائي إضافي.

عليك مراجعة الطبيب إذا استمرت السخونة لأكثر من 3 أيام أو إذا تفاقمت الأعراض أو لم تزل خالٍ 5 أيام رغم إستعمال الدواء.

لا يجوز تجاوز المقدار الدوائي الموصى به.

إذا تلقى الطفل/المتعالج بالخطأ مقداراً دوائياً مضاعفاً، يجب إستشارة الطبيب فوراً أو التوجه إلى غرفة الطوارئ.

طريقة الاستعمال

ملاحظة: إذا كانت الفتيلة رخوة بحيث لا يمكن إدخالها في الشرج،

فيالإمكان تبریدها بالتخزين في البراد لمدة 30 دقيقة تقريباً، أو بوضعها تحت تيار من الماء البارد قبل نزع الغلاف.

(1) تعليمات الفتح: إفضل فنتيلينة واحدة عن شريط القتائل، لنزع الغلاف البلاستيكي، يجب فصل اللسان من الجانب المسطوح للغلاف البلاستيكي والسحب نحو الجوانب حتى خروج الفتيلة إلى الخارج.

(2) كيفية إدخال الفتيلة: أولاً، إغسل يديك جيداً.

(3) قم بوضع الطفل على جانبه، وأدخل الفتيلة ببطء بواسطة الإصبع عيّيناً داخل فتحة الشرج.

(4) إغسل يديك جيداً بعد إدخال الفتيلة.

إذا استعمل المتعالج مقداراً دوائياً مفترطاً أو إذا بلع طفل بالخطأ من الدواء، يجب التوجّه فوراً إلى غرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر معك علبة الدواء لا تسبّب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب! حتى ولو كنت تشعر بحالة جيدة، فإن العلاج الفوري هو ضروري، بسبب خطورة تطور ضرب طفلي للأبد.

الأعراض الجانبية يمكن أن تكون: غثيان وقيء، إسهال، فقدان الشهية للطعام، آلام بطنية، انتفاخ، تعرق زائد، آلام أو سلسية في أعلى البطن التي من الممكن أن تؤدي إلى احتشاء شدة الضرر للأبد.

لا يجوزتناول أدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتأكد من المقدار الدوائي في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

إذا توفرت لديك أسلطة إضافية حول إستعمال الدواء، إستشر الطبيب أو الصيدلي.

(4) الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، إن إستعمال فتائل أكمولي فورته قد يسبب أعراضًا جانبية لدى بعض المستعملين، لا تذهب من قائمة الأعراض الجانبية.

من الممكن أن تتعافى أياً منها.

أعراض جانبية نادرة (تؤثر على حتى متعالج 1 من بين 1,000 متعالج)

أعراض جانبية خطيرة، يجب التوقف عن العلاج ومراجعة الطبيب فوراً:

إذا ظهرت ردود فعل تحسسية شديدة، مثل إنتفاخ الوجه، الشفتين، اللسان، الخدود وأو الأطراف والتي قد تسبّب صعوبات في التنفس أو في البلع.

- إذا ظهرت مشاكل في الجلد، مثل طفح أو حكة.

إذا ظهرت أعراض جانبية جدية - فإن الباراسيتامول قد يؤدي في حالات نادرة جداً إلى ظهور أمراض جلدية شديدة التي علاجها يمكن أن تكون: إحمرار، طفح، حويصلات، ضرر جلدي واسع.

أعراض جانبية شديدة قد تظهر حتى لو تناولت في المرضي مستحضرات تحوي المركب الفعال باراسيتامول بدون مشكلة.

إذا ظهرت علامات للتغيرات في جهاز الدم، مثل: أنفحة وكدمات التي تحدث بسهولة، تطور التهابات سهولة أكبر، حدوث سخونة مرتفعة وحويصلات في الفم والحنجرة.

إذا حدثت مشاكل في الكبد - من الممكن أن يتطلب منك إجراء فحوصات من أجل فحص وظائف الكبد.

أعراض جانبية شائعة (تؤثر على حتى متعالج 1 من بين 10 متعالجين):

إحمرار أو آلم في مكان إدخال الفتيلة (في فتحة الشرج) أو حوله.

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقمت إحدى الأعراض الجانبية أو عندما تتعافى من عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة، عليك إستشارة الطبيب.

التبلغي عن أعراض جانبية:

بالإمكان التبلغي عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "تبلغي عن أعراض جانبية عقب علاج دوائي" الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يوجه إلى النموذج المباشر للتبلغي عن أعراض جانبية، أو عن طريق تصفح الرابط:

<https://sideeffects.health.gov.il>

(5) كيفية تخزين الدواء؟

تحتب التسمم: يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي و المجال رؤية الأطفال و/أو الرضع، وذلك لتقلدي اصبعهم بالتسنم. لا تتسبّب التسمم بدون تعليمات صريحة من الطبيب.

(Exp. Date) لا يجوز إستعمال الدواء بعد انتهاء تاريخ الصلاحية (Exp. Date)، الذي يظهر على ظهر العلبة. يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

يجب التخزين دون 25 درجة مئوية.

(6) معلومات إضافية

يحتوي الدواء بالإضافة للمادة الفعالة أيضاً على:

Witepsol W-35, Witepsol E-76

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العلبة:

تحتوي كل علبة على لويحة بلاستيكية (بليستر) معبأ بداخلها 12 فنتيلين بلون أبيض - كريم.

اسم المنتج وصاحب الإمكانيات وعنوانه:

تقع إسرائيل، م.ض.،

شارع دفورة هنتينيه 124، تل أبيب 6944020

تم إعداد النشرة في آذار 2023 بموجب تعليمات وزارة الصحة.

رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة:

122.20.30214.00

من أجل سهولة وتوفير القراءة، تم صياغة هذه النشرة بصيغة المذكرة. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.