

## אגיסטן® ו 0.5 גרם טבליה ואגילנית

כל טבליה לנרתיק מכילה:  
**500 מ"ג קלוטרימזול (Clotrimazole 500 mg)**.  
חומרים בלתי פעילים ואלרגניים בתכשיר: ראי סעיף 6 "מידע נוסף" בעלון.  
**קראי בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמשי בתרופה.** עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פני אל הרופא או אל הרוקח.  
עליך להשתמש בתכשיר על פי ההוראות בסעיף המינון בעלון זה. היוועצו ברוקח אם הינך זקוקה למידע נוסף.  
עליך לפנות לרופא במידה ותסמיני המחלה (מספטומים) מחמירים או אינם משתפרים לאחר 7 ימים.

### 1. למה מיועדת התרופה?

תרופה אנטי-פטריותית רחבת טווח הקוטלת פטריות שוטניות (טריכומונאס), לטיפול יחיד מקומי בזיהומים נרתיקי.  
**קבוצה תרופתית:** החומר הפעיל קלוטרימזול שייך למשפחת האזולים והינו חומר אנטי פטרייתי הנלחם בגורם לזיהומים כגון זיהומים וגיאנלים.

### 2. לפני שימוש בתרופה

**אין להשתמש בתרופה:**  
• אם את רגישה (אלרגית) לחומר הפעיל קלוטרימזול או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה.  
• בזמן הווסת כיוון שאז היעילות פחותה.

**אזהרות ומיוחדות הנוגעות לשימוש בתכשיר לפני הטיפול באגיסטן ו 0.5 גרם, ספרי לרופא אם:**  
• סבלת מיותר משני זיהומים פטריטיים נרתיקים במהלך 6 החודשים האחרונים.  
• את או בן זוגך סבלתם בעבר ממחלת מין.  
• אינך בטוחה אם הינך סובלת מפטריה נרתיקי או שזו הפעם הראשונה שהינך סובלת מתסמינים אלו.  
• את מתחת לגיל 16 או מעל גיל 60.  
• היתה לך בעבר תגובה אלרגית לאגיסטן ו 0.5 גרם או לתכשירים ואגילנים אנטי-פטריטיים אחרים.  
• הינך סובלת מאחד מהתסמינים הבאים:  
• זיהום נרתיקי לא סדיר.  
• זיהום נרתיקי חריג או הפרשה ואגילנית דמית.  
• כיבים, שלפוחיות או פצעים נרתיקי או פגועים.  
• כאב בטן תחתונה.  
• כאב או קושי במתן שתן.  
• ריח או צמצורמות.  
• תחושת חולי או הקאות.  
• שלשולים.  
• הפרשה עם ריח רע נרתיקי.  
זאת כיוון שיתכן שהטיפול באגיסטן ו 0.5 גרם אינו הטיפול הנכון עבורך.

• תכשיר זה, כמו בתכשירים אחרים לשימוש תוך נרתיקי, עלול להפחית את יעילותם של אמצעי מניעה העשויים מגומי, כגון: קונדומים או דיאפרגמות. כתוצאה מכך, עליך להשתמש באמצעי מניעה הפעילים לפחות 5 ימים לאחר השימוש בתכשיר.  
• בזמן הטיפול אין להשתמש בטמפונים, בתכשירים לשיטופ ואגילניות (נרתיקות), בחומרים קוסטי זרע או בתכשירים ואגילנים אחרים.  
• יש להימנע מקיום יחסי מין כאשר הינך סובלת מזיהום פטרייתי ובזמן הטיפול, מכיוון שזו הבעיה שלך יכול להידבק.

### ילדות ומתבגרות:

אגיסטן ו 0.5 גרם אינו מיועד לילדות ומתבגרות מתחת לגיל 12.

### אינטראקציות/ תגובות בין תרופתיות:

**אם את לוקחת, או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי מזון, ספרי על כך לרופא או לרוקח לפני תחילת הטיפול.** במיוחד אם את נוטלת:  
• סטרקורלימוס או סירילימוס (תרופות הפחיתות את תגובת מערכת החיסון על-מנת למנוע מחייה של איבר לאחר שהושטל).

### הריון, הנקה ופוריות:

אם הינך בהריון, מניקה או גוססה להיכנס להריון, ספרי לרופא לפני השימוש באגיסטן ו 0.5 גרם, אם כבר סיפרת על כך לרופא יש לעקוב אחרי הוראותיו בהריון.  
לטיפול בפסטר פנימית, ייתכן שהרופא ימליץ על טיפול בטבליה ללא שימוש במוליך.

### נהיגה ושימוש במכונית:

התרופה איננה משפיעה על הנהיגה ו/או על שימוש במכונית.

### 3. כיצד תשתמשי באגיסטן ו 0.5 גרם?

עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוחה לגבי המינון ואופן הטיפול בתכשיר.  
המינון המוקבל בדרך כלל הוא:  
• טבליה אחת להחדרה לנרתיק באמצעות המוליך בערב לפני השינה.

### אין לעבור על המנה המומלצת

• תסמיני הפטרה אמורים להיעלם תוך 3 ימי טיפול. אם לא חל שיפור לאחר 7 ימים, יש לידע את הרופא.  
• אם הזיהום חזר לאחר 7 ימים, ניתן להשתמש בטיפול אחד נוסף, אולם אם כבר סבלת מזיהום פעמיים במהלך 6 החודשים האחרונים, עליך לפנות לרופא.  
• תרופה זו מיועדת לשימוש תוך-נרתיקי בלבד.


### אין להכניס לפה או לבלוע.

### אופן השימוש:



אם אגיסטן ו 0.5 גרם נרשם לך על ידי רופא, עיקבי אחר הוראותיו. אם נרשת את התכשיר ללא מרשם רופא, עקבי אחר הוראות הבאות:

יש להשתמש במוליך להחדרת הטבליה עמוק ככל הניתן לתוך הנרתיק, עדיף לפני השינה לצורך נוחות הטיפול.  
שטפי ידיים לפני הסרת הטבליה מהאריזה ופעם נוספת לאחר השימוש במוליך.

1. הוציאי את המוליך מהאריזה. משכי את הבוכנה (A) עד לעיצרתה. הוציאי את הטבליה הגויגאלית מארזית המוליך (B) אלומיניום והנכסי אותה היטב לחלק הרחב של המוליך (B).



2. על מנת להתאים את הטבליה לתוך המוליך, לחצי קלות על קצה המוליך משני צדדיו. הטבליה מתאימה בצורה הדוקה למוליך ויש לדחסה לקצה המוליך עד לעומק של כ-1 ס"מ.



4. הוציאי את המוליך. השליכי את המוליך במקום בטוח, הרחקי מהישג ידם של ילדים. אין להשליך את המוליך לאסלה.

• מאחר שהטבליה מתמוססת נרתיקי, כדאי להשתמש במגן תחתון מכיוון שדי שיכח לראות הפרשות לבנות לאחר השימוש בטבליה האוגילנית. זה לא מעיד על כך שהטיפול לא עבד. אך אם הינך מבחינה בחניניות מהטבליה שלא התמוססו, פני לרופא או לרוקח מאחר שיכול להיות שהטיפול לא עבד כראוי.  
• כדי למנוע הישנות עתידית: לבשי תחתונים מותנה שאינם הדוקים. התקליחי מדי יום. פעולת היגוב בשירותים צריכה להתבצע מלפנים לאחור, כיוון שזיהום ואגילני יכל להיות מועבר מהמעי. החליפי מגן תחתון באופן קבוע. הימנעי מלבישת תחתוני נילון ומכנסי ג'ינס הדוקים. מניימי מרחצה סבונים מבושמים או משימוש באדודורנטים באזור הנרתיקי. אין לשפשף את האזור בחזוקה באמצעות ספוגית רחצה. יש להימנע מאמבטיית חמות עם שמני בישום.

### כיצד תוכלי לסייע להצלחת הטיפול?

יתכן הדבקה של בן הזוג ולכן מומלץ להימנע ממגע מיני או על שימוש בקונדום בבת מגע מיני במשך כל תקופת הטיפול. כמו כן, רצוי להתייעץ עם הרופא בדבר הצורך בטיפול תרופתי גם בבן הזוג. אם הינך משתמשת בתרופה לשיטפת הנרתיק בין טיפול לטיפול, הקפידו: **לא להחדיר את נוזל השיטפה בעוצמה ובכמות רבה מדי** כדי לא להחמיר את הנוזל לררם – דבר העלול להעביר את הזיהום לשם.  
בעת השימוש בתרופה לנרתיק, ייתכן הכתמה של הלבנים.

אם תשתמש בטעות במינון גבוה יותר, אם בטעות בלע ילד או משהו מן התרופה, פני מיד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והביאי אריזת התרופה איתך.

**אין ליטול תרופות בחושך! בדקי את התווית והמנה בכל פעם שהינך נוטלת תרופה. הכריכי משקפיים אם הינך זקוקה להם.** אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועצו ברופא או ברוקח.

### 4. תופעות לוואי:

כמו בכל תרופה, השימוש באגיסטן ו 0.5 גרם עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשות. אל תיבהלי למקרא רשימת תופעות הלוואי. יתכן שלא תסבלי מאף אחת מהן.  
בככל התרופות, חלק מהאשמים עלולים להיות אלרגיים לטבליה האוגילנית. אם את אלרגית, תגובה אלרגית תתרחש בסמוך לשימוש בתכשיר. אם את חשה בתגובה אלרגית או אודם, צריבה, כאב, גירוד או נפיחות שמחמירים, **פסיקי את השימוש בתכשיר ופני מיד לרופא או לחדר מיון של בית חולים קרוב.**

סימנים לתגובה אלרגית עשויים לכלול:  
פריחה; בעיות בבלעיה או בנשימה; נפיחות של השפתיים, הפנים, הגרון או הלשון; חולשה, תחושת סחרחורת או עילפון; בחילה. לאחר השימוש באגיסטן ו 0.5 גרם טבליה ואגילנית את עלולה לחוות גירוד, פריחה, נפיחות, אודם, אי נוחות, צריבה, גירוי, קילוף או זיהום ואגילני, כאבים בטון או באזור האגן.

**אם הפיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה או כאשר את סובלת מתופעת לוואי שלא צוינה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.**

### דיווח על תופעות לוואי:

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה ב"תקישור" "דיווח על תופעות לוואי" עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או ע"י כניסה לקישור: <https://sideeffects.health.gov.il> בנוסף, ניתן לדווח לחברת פאדאגיס באמצעות הכתובת הבאה: [Padagis.co.il](mailto:Padagis.co.il)

### 5. איך לאחסן אגיסטן ו 0.5 גרם?

מנעי הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח אריכתם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנעי הרעלה. אל תגרמי להאקל ללא הוראה מפורשת מהרופא.  
אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date). המופיע על גבי אריזת הקרטון. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.  
• אין להשליך תרופות לביוב או לפסולת הביתית. שאלי את הרוקח כיצד ניתן להפיטר מתרופות שאינך זקוקה להן עוד. נקיטת אמצעים אלו תעזור לשמור על הסביבה.  
• יש לאחסן במקום קריר מתחת ל-25°C.

### 6. מידע נוסף:

**נוסף על המרכיב הפעיל התרופה מכילה גם:**  
Lactose monohydrate, Microcrystalline cellulose, Lactic acid, Maize starch, Crospovidone, Calcium lactate, Magnesium stearate, Colloidal anhydrous silica, Hydroxypropyl methylcellulose.  
• **כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:**  
אריזת אגיסטן ו 0.5 גרם טבליה ואגילנית מכילה: טבליה אחת בצבע לבן כמעט צהוב, ארזחז בבליסטר אלומיניום ומוליך אחד.  
• **היצרן, בעל הרישום וכתובתו:** פאדאגיס ישראל פרמצבטיקה בע"מ, רח' רקפת 1, שוהם.  
• נערך במרץ 2023 בהתאם להנחיות משרד הבריאות.  
• מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות: 031-74-25210-00.