

أجيسين كريم

المادة الفعالة:

كلوتريمازول 1% W/W Clotrimazole

المواد غير الفعالة والمستأجرة في المستحضر - انظر للبلند 2 "معلومات مهمة عن جزء من المركبات في الدواء" والبلند 6 "معلومات إضافية".

اقرأ النشرة بامعان حتى نهايتها قبل أن تستعمل الدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات ملخصة عن الدواء. إذا كانت لديك أسئلة إضافية، توجه إلى الطبيب أو إلى الصيدلي. عليك استعمال الدواء بموجب التعليمات في بند الجرعة الدوائية في هذه النشرة. استشر الصيدلي إذا كنت بحاجة لمزيد من المعلومات. عليك التوجه إلى الطبيب فوراً في حال تفاقم أعراض المرض أو لم تتحسن بعد 4 أسابيع.

1. لأي غرض مخصص الدواء؟

أجيسين كريم مخصص لعلاج ثلثات الجلد والأغشية المخاطية الناجمة عن أنواع مختلفة من الفطريات. مخصص أيضاً لعلاج كانديدا (المبيضضة جنس من الفطريات) فرج المرأة وكانديدا القضيبي. النضيفة العلاجية: مواد مضادة للفطريات للاستعمال الموضعي من فصيلة الإيميدازولات.

2. قبل استعمال الدواء

لا يجوز استعمال الدواء:

- إذا كنت حساساً (أزجياً) للمادة الفعالة أو لأي واحد من المركبات الإضافية التي يحتوي عليها الدواء، بما في ذلك كحول ستيرتيريلي (انظر للبلند 2 "معلومات مهمة عن جزء من المركبات في الدواء" والبلند 6 "معلومات إضافية").
- علاج فطر الأظفار أو على فروة الرأس.

تحذيرات خاصة فيما يتعلق باستخدام الدواء:

كما الكريمان الأخرى، قد يقلل أجيسين كريم من فعالية وسائل منع الحمل المصنوعة من المطاط مثل الواقي الذكري أو العازل الأنثوي. لذلك، إذا كنت تستخدم أجيسين كريم على فرج المرأة أو القضيب، فيجب استخدام وسائل منع حمل بديلة لمدة خمسة أيام على الأقل بعد استخدام هذا المستحضر. إذا لم يطرأ تحسن على حالتك في غضون 4 أسابيع، فيجب التوجه إلى الطبيب.

التداخلات/التفاعلات بين الأدوية:

إذا كنت تأخذ أو إذا أخذت مؤخراً دوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة وإضافات تغذية، أخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك.

الحمل، الإرضاع والخصوبة:

إذا كنت حاملاً، أو مرضعة أو تحاولين الحمل، فيجب استشارة الطبيب أو الصيدلي قبل استعمال هذا المستحضر.

القيادة واستعمال الآلات:

أجيسين كريم ليس له تأثير على القدرة على القيادة أو استعمال الآلات أو أن تأثيره لا يكاد يذكر.

معلومات مهمة عن جزء من المركبات في الدواء:

يحتوي أجيسين كريم على كحول ستيرتيريلي الذي قد يسبب تهيجاً موضعياً في الجلد (طفح، حكة أو احمرار). حكة أو احمرار). يحتوي أجيسين كريم على 10 ملغ من الكحول البنزيلي في كل 1 غرام كريم الذي قد يتسبب في رد فعل تحسسي.

3. كيف تستعمل الدواء؟

عليك التحقق من الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكدًا بشأن الجرعة الدوائية وطريقة العلاج بالمستحضر. في حال وصف المستحضر لك من قبل الطبيب فليكن الامتثال لتعليماته. في حالة أنك اشتريت هذا المستحضر بدون وصفة طبية، عليك استعمال هذا المستحضر وفقاً للتعليمات في هذا البند. الجرعة الدوائية الاعتيادية عادة هي: المعالجة مرتين إلى 3 مرات في اليوم.

طريقة الاستعمال:

- تعليمات الفتح - من أجل فتح الأنبوبية يجب أن تقلب الغطاء وتقوم بوخز القسم السائد للأنبوبية بواسطة ضغط الغطاء.
- علاج فطر كف القدم: يجب غسل كفتي القدمين وتجفيفهما جيداً، خاصة بين الأصابع. قبل دهن الكريم.
- يجب أن تقوم بدهن طبقة رقيقة ومتجانسة على المناطق المصابة مرتين حتى 3 مرات في اليوم والسماح بتغلغل الكريم إلى داخل الجلد بواسطة التليك.
- عدم ما تكون كمية صغيرة من 1/2 سم كريم تكون كافية لعلاج منطقة بحجم راحة اليد.
- عادة ما يظل ثلثات الجلد الفطرية يعتمد على نوع العدوى. غالباً، ما تكون مدة العلاج على الأقل أسبوعين. على الرغم من أنه قد يتطلب ما يصل إلى 4 أسابيع من العلاج.
- إذا كنت تعاني من فطر كف القدم، فيوصى أيضاً باستخدام مسحوق مضاد للفطريات، استشر الطبيب أو الصيدلي.
- من المتوقع أن تتحسن أعراض العدوى الجلدية، مثل الحكة والالتهاب، في غضون عدة أيام من بدء العلاج. لكن قد تتفاقم الأعراض مثل الاحمرار وتقشير الجلد بعد فترة أطول.
- إذا لم يطرأ تحسن على حالتك في غضون 4 أسابيع، فيجب التوجه إلى الطبيب.

لا يجوز تجاوز الجرعة الموصى بها.

لاستعمال الخارجي فقط.

- لا يجوز إدخال الكريم إلى الفم أو بلمه.
- إذا بلعت عن طريق الخطأ من المستحضر، عليك التوجه فوراً إلى الطبيب أو التوجه إلى غرفة طوارئ أو أقرب مستشفى.

- يجب تجنب ملامسة المستحضر مع العينين أو الفم. في حالة ملامسة العينين يجب الشطف جيداً بالماء والتوجه إلى الطبيب.
- إذا كنت قد تناولت عن طريق الخطأ جرعة مفرطة أو ابتلع طفل أو شخص آخر عن طريق الخطأ من الدواء، فتوجه فوراً إلى طبيب أو إلى غرفة طوارئ أو مستشفى وأحضر معك عبوة الدواء.
- إذا بلغ طفل أو أي شخص آخر عن طريق الخطأ من الدواء، توجه فوراً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر عبوة الدواء معك.
- إذا نسيت دهن المستحضر في الوقت المخطط
- إذا دهن فور تذكرك واستمر بيقية العلاج كالمتعاد.
- كيف يمكنك المساهمة لنجاح العلاج؟
 - على الرغم من أن المنطقة المصابة مثيرة للحكة، يجب الامتناع عن حكها. سوف يسبب الحك ضرراً لسطح الجلد وبالتالي سوف يسبب انتشار العدوى.
 - حافظ على المناطق المصابة نظيفة.
 - يجب القيام بتجفيف المنطقة جيداً، ولكن تجنب الإفراط في الفرك.
 - لا تشارك المناشف مع أشخاص آخرين، حضانة الاستحمام وما إلى ذلك حيث قد ينتقل التلوث إليهم.
 - يجب المتابعة على العلاج بموجب ما أوصى به من قبل الطبيب.
 - احرص على غسل يديك بعد كل علاج بالمدى وذلك لمنع انتشارها.
- إذا كنت تعاني من فطر كف القدم:
 - احرص على تجفيف الجلد بين الأصابع بشكل جدي.
 - يجب غسل الجوارب والجوارب الطويلة بشكل جدي بالماء الساخن لإزالة جلد متقشر أو أبواغ الفطريات.
 - استبدل حذاءك كل يوم بقدر الإمكان.
- لا يجوز تناول أدوية في الظلام! تحقق من الملمص والجرعة في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظرات الطبية إذا كنت بحاجة إليها.
- إذا كانت لديك أسئلة إضافية حول استعمال الدواء، استشر الطبيب أو الصيدلي.

4. الأعراض الجانبية

- كما في أي دواء، قد يسبب استعمال أجيسين كريم أعراضاً جانبية لدى قسم من المستخدمين. لا تفرح من قراء قائمة الأعراض الجانبية. قد لا تعاني من أي واحد منها. كما في أي دواء، قد يكون هنالك بعض المعالجون ذوي فرط تحسس لهذا الكريم. في حالة وكنت حساساً، فسيطور رد الفعل بعد استعمالك للمستحضر بوقت قصير. يجب التوقف عن العلاج والتوجه فوراً إلى الطبيب أو التوجه إلى غرفة طوارئ في المستشفى الأقرب إليك إذا تطور رد فعل تحسسي. علامات رد الفعل التحسسي يمكن أن تشمل:
 - طفح
 - مشاكل في البلع أو التنفس
 - تورم الشفتين، الوجه، الحلق أو اللسان
 - وهن، دوام أو إغماء
 - غثيان

بعد استعمال الدواء من المحتمل أن تشعر بأحد الأعراض التالية: حكة، طفح، بثور، لبيب، عدم راحة، تورم، تهيج، احمرار أو تقشر الجلد.

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقم أحد الأعراض الجانبية، أو إذا كنت تعاني من عرض جانبي لم يذكر في النشرة، عليك استشارة الطبيب.

يمكن الإبلاغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة النقر على الرابط "الإبلاغ عن أعراض جانبية عذب علاج دوائي" الموجود في الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يوجه لإستمارة الكتر ونية للإبلاغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق دخول الرابط: <https://sideeffects.health.gov.il> بالإضافة، يمكن الإبلاغ لشركة باداجيس بواسطة العنوان التالي: Padagis.co.il

5. كيفية تخزين الدواء؟

- تحبب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي الأطفال و/أو الرضع ونطاق رويتهم وبذلك تمنع التسمم. لا تسبب التقوى دون تعليمات صريحة من الطبيب.
- لا يجوز استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على العبوة. تاريخ انتهاء الصلاحية يرجع إلى اليوم الأخير من ذلك الشهر.
- شروط التخزين:
 - يجب التخزين في مكان بارد ما دون الـ 25°C.
 - بعد الفتح لأول مرة، يمكن استعمال الدواء لمدة 6 أشهر وفي موعد لا يتجاوز تاريخ انتهاء الصلاحية الذي يظهر على العبوة.

6. معلومات إضافية

إضافة إلى المادة الفعالة يحتوي أجيسين كريم أيضاً على:

- Octyldodecanol, Cetostearyl Alcohol, Cetyl Esters Wax, Sorbitan Monostearate, Polysorbate 60, Benzyl Alcohol, Purified Water
- كيف يبدو الدواء وما هو محتوي العبوة:
- أجيسين كريم هو كريم بلون أبيض المصمغ في أنبوبة ألومنيوم التي تحتوي على 30 غرام.
- اسم المصنع وصاحب التسجيل: باداجيس إمبر انريل مستحضرات دوائية م.م. شارع ركيفت 1، شوهام.
- تم التنقيح في تشرين الثاني 2022 وفقاً لتعليمات وزارة الصحة.
- رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة: 130-70-30920
- للتبسيط وتسهيل القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكور. بالرغم من ذلك، الدواء مخصص لكلا الجنسين.