

نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيدلة

(مستحضرات) - 1986

يسوق الدواء بموجب وصفة طبيب فقط

نوكتورنو 3.75

نوكتورنو فورته 7.5 أقراص مطلية

التركيب:

يحتوي كل قرص مطلي من **نوكتورنو 3.75** على:

زوبيكلون **3.75** ملغ

يحتوي كل قرص مطلي من **نوكتورنو فورته 7.5** على:

زوبيكلون **7.5** ملغ

لمعلومات عن المواد غير الفعالة ومولدات الحساسية في المستحضر: أنظر الفقرة 2 "معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء" و"الفقرة 6 "معلومات إضافية".

اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل إستعمالك للدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية راجع الطبيب أو الصيدلي.

وُصف هذا الدواء للعلاج من ألك. لا تعطيه للأطفال الآخرين. فهو قد يضرهم حتى ولو بدا لك أن حالتهم الطبية مشابهة لحالتك.

هذا الدواء غير مخصص للأطفال ولمراهقين ما دون عمر **18** سنة.

1) لأي غرض مخصص الدواء؟

نوكتورنو مخصص لمعالجة الحالات التالية من اضطرابات النوم الشديدة:

أ. الأرق المؤقت. ب. الأرق قصير الأمد.

الفصلية العلاجية: منوم ومخدر من مجموعة سيكلوبيروولونات.

2) قبل إستعمال الدواء

لا يجوز إستعمال الدواء إذا:

- كنت حساساً (ألرجي) للمادة الفعالة أو لكل واحد من مركبات الدواء الأخرى التي يحتويها الدواء (أنظر الفقرة 6). علامات رد الفعل التحسسي تشمل: طفح، مشاكل في البلع أو التنفس، إنفتحاح في الوجه، الشفتين، الكحل، والحنجرة أو اللسان.
- كنت تعاني من مرض يسبب ضعف عضلي شديد (وهن عضلي وبيبل).
- كنت تعاني من مشكلة في الأداء الوظيفي للارتئين (قصور تنفسي).
- كنت تعاني من مشكلة تتوقف في أعقابها عن التنفس لفترات زمنية قصيرة أثناء الليل (إنقطاع التنفس أثناء النوم).
- كنت تعاني من مشاكل خطيرة في الكبد.
- كنت ما دون عمر **18** سنة، لأنه لم تُحدد بعد نجاعة وسلامة **نوكتورنو** لدى الأطفال والمرهقين ما دون عمر **18** سنة.
- قاسيت في الماضي من السير خلال النوم أو من أي سلوك شاذ آخر (مثل السباققة، تناول الطعام، إجراء مكالمات هاتفية أو ممارسة علاقات جنسية وإلى آخره) حينما لا تكون يقظاً بشكل تام بعد تناول **نوكتورنو**.

لا تتناول هذا الدواء إذا كانت إحدى الحالات التي ذكرت سابقاً تنطبق عليك. إذا لم تكن واثقاً، تحدث مع طبيبك أو مع الصيدلي قبل تناول **نوكتورنو**.

تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء

قبل العلاج بـ نوكتورنو، إحك للطبيب إذا:

- كنت تعاني من أية مشاكل في الكبد (أنظر أيضاً الفقرة "لا يجوز إستعمال الدواء إذا"). من الجائز أن يضطر الطبيب إلى إعطاء مقدار دوائي مُخفض من **نوكتورنو**.
- كنت تعاني من أية مشاكل في الكلى. من الجائز أن يضطر الطبيب إلى إعطاء مقدار دوائي مُخفض من **نوكتورنو**.
- كنت تعاني من مشاكل بسيطة في التنفس. يقرر الطبيب فيما إذا توجب عليك تلقي **نوكتورنو** (أنظر أيضاً الفقرة "لا يجوز إستعمال الدواء إذا").
- وُجد لديك في الماضي اضطراب نفسي (بما في ذلك إكتئاب وإضطراب في الشخصية) أو أسأت إستعمال أو تعلقت بالكحول أو بالمخدرات.

- إستعملت مؤخراً **نوكتورنو** أو أدوية أخرى مشابهة لفترة أكثر من **4** أسابيع.

إن إستعمال **نوكتورنو** قد يؤدي إلى تطور إساءة الإستعمال و/أو التعلق الجسدي والنفسي. تزداد خطورة التعلق مع المقدار الدوائي ومع مدة العلاج وتكون أكبر عندما تكون مدة العلاج بـ **نوكتورنو** أكثر من **4** أسابيع، ولدى متعالجين لديهم سابقة لإضطرابات نفسية و/أو إساءة إستعمال الكحول، المواد غير القانونية أو المخدرات.

نعاس، صعوبات في التفكير، سيات والوفاة قد تظهر إذا تم تناول **نوكتورنو** سوية مع مستحضرات أفيونية النفسوس. إن إستعمال **نوكتورنو** ومستحضرات أفيونية المفعول بالتزامن يتم فقط إذا كانت إمكانيات العلاج الأخرى غير كافية. الرجاء بلّغ طبيبك عن كافة الأدوية الأفيونية المفعول التي تتناولها وإحرص على التقيد بتوصيات الطبيب فيما يتعلق بالمقدار الدوائي.

الدواء غير مخصص لمعالجة الإكتئاب.

لقد أظهرت عدة أبحاث وجود خطورة زائدة لحدوث أفكار إنتحارية، محاولة الإنتحار، والإنتحار لدى متعالجين يتناولون أدوية معينة للهذئدة وأدوية لمعالجة مشاكل النوم، بما في ذلك هذا الدواء. لكن، لم يُحدد فيما إذا نجم ذلك من الدواء أو من الجائز أن هناك أسباب أخرى. إذا وُجدت لديك أفكار إنتحارية، راجع طبيبك بأسرع ما يمكن لتلقي إستشارة طبية إضافية.

قبل تناول **نوكتورنو**، من المهم التأكد من أن باستطاعتك النوم على الأقل **7** حتى **8** ساعات من النوم المتواصل، وذلك لمساعدتك على تقليل خطورة حدوث أعراض جانبية معينة (أنظر الفقرة 4 "الأعراض الجانبية").

قد يؤدي **نوكتورنو** إلى السير خلال النوم أو إلى سلوك شاذ آخر (مثل السباققة، تناول الطعام، إجراء مكالمات هاتفية أو ممارسة العلاقات الجنسية وإلى آخره) حينما لا تكون يقظا بشكل تام. في صباح اليوم التالي من الجائز ألا تتذكر أنك فعلت شيئاً خلال الليل. هذه النشاطات من شأنها أن تحدث سواء كنت أو لم تكن تشرب الكحول أو تتناول أدوية أخرى تسبب لك النعاس سوية مع **نوكتورنو**. إذا كنت تقاسي من إحدى الأعراض المفصلة أعلاه، تتوقف عن تناول **نوكتورنو** فوراً واتصل بالطبيب و بفر من الطاقم الطبي الخاص بك.

إذا لم تكن واثقاً فيما إذا كانت إحدى الحالات أعلاه تنطبق عليك، تحدث مع طبيبك أو مع الصيدلي قبل تناول **نوكتورنو**.

الأطفال والمرهقون

هذا الدواء غير مخصص للأطفال ولمرهقين ما دون عمر **18** سنة.

الفحوص والمتابعة

- نوكتورنو** قد يُعَدُّ من نسب إنزيمات الكبد التي تظهر في فحوص الدم. هذا الأمر قد يدل على خلل في الأداء الوظيفي للكبد لديك.
- إذا كنت مقيلاً على إجراء فحوص الدم، من المهم إبلاغ طبيبك بأنك تتناول **نوكتورنو**.

التداخلات/التفاعلات بين الأدوية

إذا كنت تستعمل، أو إذا إستعملت مؤخراً، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، إحك للطبيب أو الصيدلي عن ذلك. وذلك لأن **نوكتورنو** قد يؤثر على عمل أدوية معينة أخرى. كما أن، بعض الأدوية قد تؤثر على عمل **نوكتورنو**. بالأخص إذا كنت تستعمل:

نوكتورنو قد يزيد من تأثير الأدوية التالية:

- أدوية لمعالجة الأمراض النفسية (الأدوية المضادة للذهان).
- أدوية لمعالجة الإكتئاب.
- أدوية لمعالجة داء الصرع (مضادات الإختلاج).
- الأدوية المضادة للتشنج في العمليات الجراحية (أدوية التخدير).
- أدوية للهذئدة، للتقليل من القلق أو أدوية لمشاكل النوم (أدوية ذات تأثير منوم)
- أدوية لمعالجة حمى العلف، الطفح، أو الحساسيات الأخرى، التي قد تسبب لك النعاس (مضادات الهيستامين المنومة) مثل كلورفينيرامين أو بروميتازين.
- أدوية معينة لتسكين الألم المتوسط حتى الشديد (مسكنات الألم المخدرة)، مثل كودئين، ميتادون، مورفين، أو كسيكودون، بتيدين أو ترامادول.

الأدوية التالية قد تزيد من إحتمال حدوث أعراض جانبية إذا تم تناولها سوية مع **نوكتورنو**. لتقليل إحتمال حصول ذلك، من الجائز أن يقرر الطبيب على تخفيض المقدار الدوائي من الـ **نوكتورنو** الذي تتناوله:

- مضادات حيوية معينة، مثل كلاريثروميسين أو إريثروميسين.
- أدوية معينة لمعالجة التلوثات الفطرية، مثل كيتوكونازول أو إيتراكونازول.
- ريفونافير (من فصيلة مثبثات الـ بروتياز) لمعالجة تلوث HIV.
- إن الإستعمال المتزامن لـ **نوكتورنو** ومستحضرات أفيونية المفعول يزيد من خطورة حدوث نعاس، صعوبات في التنفس، سيات والوفاة. إحرص على التقيد بإرشادات طبيبك فيما يتعلق بالمقدار الدوائي.

الأدوية التالية قد تقلل من تأثير **نوكتورنو**:

- أدوية معينة لمعالجة الصرع، مثل كاربامازيبين، فينوباربيتال أو فينيوتوين.
- ديفمابيسين (مضاد حيوي) لمعالجة التلوثات.
- St. John's wort (دواء نباتي) لمعالجة تغيرات الحالة النفسية والإكتئاب.

إستعمال الدواء وإستهلاك الكحول

لا يجوز شرب الكحول خلال فترة إستعمال نوكتورنو. قد يزيد الكحول من تأثير الدواء وأن يسبب لك نوماً عميقاً جداً، بحيث تتنفس بشكل غير سليم أو أن تعاني من صعوبة في الإستيقاظ.

الإرضاع والخصوبة

الحمل

لا يوصى بإستعمال **نوكتورنو** خلال فترة الحمل. إستشيري طبيبك قبل تناول الدواء إذا كنت في فترة الحمل، تعتقدين بأنه من الجائز أنك حامل أو تخططين للحمل.

إذا تم إستعماله خلال فترة الحمل فهناك خطورة أن يتأثر الرضيع من ذلك. لقد أظهرت عدة أبحاث على أنه من الجائز أن تحصل زيادة في خطورة حدوث شق في الشفة والحنك (يسمى أحياناً "شفة الأرنب") لدى المولود.

قد يحدث تناقص في حركة الجنين وتغيرات في نظم قلب الجنين وذلك بعد تناول **نوكتورنو** خلال الثلث الثاني و/أو الثالث من الحمل.

إذا تم تناول **نوكتورنو** في نهاية الحمل أو خلال الولادة، فقد يبدي رضيعك ضعفاً في العضلات، تناقص في حرارة الجسم، صعوبة في الإطعام ومشاكل في التنفس (تنبيب تنفسي). إذا تم تناول هذا الدواء بشكل دائم في مراحل الحمل المتأخرة، فقد يتطور لدى رضيعك تعلق جسدي وقد يكون معرضاً لخطورة تطوير أعراض الطغام، مثل عصبية أو رجفان. في مثل هذه الحالة يجب مراقبة المولود بشكل حثيث خلال الفترة التي تلي الولادة.

الإرضاع

لا يجوز تناول **نوكتورنو** إذا كنت في فترة الإرضاع أو تخططين للإرضاع. وذلك لأن كميات ضئيلة قد تنتقل إلى حليب الأم.

إذا كنت مرضعة أو تخططين للإرضاع، يجب إستشارة الطبيب أو الصيدلي قبل إستعمال أي دواء. يجب إستشارة الطبيب أو الصيدلي قبل إستعمال أي دواء، وذلك إذا كنت في فترة الحمل أو الإرضاع.

السباققة وإستعمال الماكنات

بالشابه للأدوية الأخرى لمشاكل النوم، فمن شأن **نوكتورنو** أن يؤدي لتباطؤ الأداء الوظيفي السليم للمخ (تنبيب الجهاز العصبي المركزي).

إن خطورة حدوث تضرر نفسي حركي بما في ذلك تضرر القدرة على السباققة، تزداد إذا:

- كنت تقوم بنشاطات تتطلب منك اليقظة خلال **12** ساعة من تناول **نوكتورنو**.
- كنت تتناول مقداراً دوائياً أكبر من المقدار الدوائي الموصى به من **نوكتورنو**.
- كنت تتناول **نوكتورنو** سوية مع دواء آخر مثبث للجهاز العصبي المركزي، دواء آخر الذي يرفع من مستوى **نوكتورنو** بدملك، أو خلال شرب الكحول.

لا يجوز القيام بنشاطات خطيرة التي تتطلب اليقظة التامة، مثل السباققة أو تشغيل الماكنات، بعد تناول **نوكتورنو**، وخاصة، خلال الـ **12** ساعة التي تلي تناول **نوكتورنو**.

للحصول على معلومات إضافية حول الأعراض الجانبية المحتملة التي قد تؤثر على القدرة على السباققة، أنظر الفقرة 4 من هذه النشرة.

معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء

يحتوي **نوكتورنو** على لكتوز (نوع سكر). إذا قيل لك من قبل طبيبك بأنك غير قادر على تحمل أنواع معينة من السكر (عدم تحمل لسكريات معينة)، فيجب إستشارة الطبيب قبل بدء إستعمال هذا الدواء.

يحتوي كل قرص من **نوكتورنو 3.75** على **21** ملغ لكتوز.

يحتوي كل قرص من **نوكتورنو** فورته **7.5** على **42** ملغ لكتوز.

يحتوي **نوكتورنو** على الصوديوم

يحتوي **نوكتورنو** على أقل من **1** ميليولم (**23** ملغ) صوديوم في القرص، أي أن القرص فعلياً "خال من الصوديوم."

3) كيفية إستعمال الدواء؟

يجب أن يكون العلاج قصيراً ما أمكن، وألا يزيد عن 4 أسابيع (بما في ذلك مرحلة التوقف عن العلاج).

يجب إستعمال المستحضر دائماً بحسب تعليمات الطبيب.

عليك الإستيضاح مع الطبيب أو من الصيدلي إذا لم تكن واثقاً فيما يتعلق بالمقدار الدوائي وطريقة العلاج بالمستحضر.

المقدار الدوائي وطريقة العلاج يحددان من قبل الطبيب فقط.





الكبان:

المقدار الدوائي الإعتيادي هو قرص واحد من **نوكتورنو فورته 7.5** (ملغ) حالاً قبل النوم.

المسنون:

المقدار الدوائي الإبتدائي الإعتيادي هو قرص واحد من **نوكتورنو 3.75** (ملغ) حالاً قبل النوم. من الجائز أن يتم رفع المقدار الدوائي في السياق، بحسب الحاجة. يجب الحذر والإستناد أثناء النهوض من الفراش!

الأطفال والمراهقون:

هذا الدواء غير مخصص لأطفال والمراهقين دون عمر 18 سنة. لم تُحدد بعد نجاعة وسلامة **نوكتورنو** لدى الأطفال والمراهقين دون عمر 18 سنة.

متعاالجون لديهم مشاكل في الكبد، في التنفس أو في الكلى:

المقدار الدوائي الإبتدائي الإعتيادي هو قرص واحد من **نوكتورنو 3.75** (ملغ) حالاً قبل النوم.

لا يجوز تجاوز المقدار الدوائي الموصى به!

فترة العلاج:

فترة العلاج الموصى بها هي يومين حتى 3 أسابيع.

تناول الدواء:

- يجب بلع الدواء مع الماء.
- لا يجوز شطر القرص. لا تتوفر معلومات حول سحق أو مضغ القرص.
- يجب تناول المقدار الدوائي المطلوب من **نوكتورنو** دفعة واحدة ولا يجوز تناول جرعة إضافية بنفس الليلة.
- يجب تناول المسحضر عندما تكون في الفراش، حالاً قبل النوم، والتأكد من أنه يمكنك النوم 7-8 ساعات من دون إنزعاج.

إذا تناولت مقداراً **دوائياً أكبر** أو إذا بلع طفل بالخطأ من الدواء، توجه حالاً إلى الطبيب أو لفرقة الطوارئ في المستشفى وأحضر معك علبة الدواء.

إن تناول جرعة مفرطة من **نوكتورنو** هو خطير جداً. فأنت قد تعاني من الأعراض التالية:

- الشعور بنعاس، إرتباك، نوم عميق لا بل إمكانية حدوث سبات.
- إرتخاء العضلات (قلة التوتر).
- الشعور بدوار، بضبابية أو إغماء. هذه الأعراض هي جراء إنخفاض ضغط الدم.
- سقوطات أو فقدان التوازن (ترنح).
- تنفس سطحي أو صعوبات في التنفس (تثبيط تنفسي).

إذا نسيت تناول الدواء:

يجب تناول **نوكتورنو** فقط قبل النوم.

إذا نسيت تناول الدواء حالاً قبل النوم، فلا يجوز تناول الدواء في أي وقت آخر. وإلا، فأنت قد تشعر بعيل للنوم، دوار وإرتباك خلال اليوم.

لا يجوز بأي حال من الأحوال تناول جرعتين سوية عوضاً عن المقدار الدوائي المنسي!

في حال تتوقف عن تناول الدواء:

يجب مواصلة تناول **نوكتورنو** إلى أن يبلغك طبيبك بالتوقف عنه.

لا تتوقف عن تناول الدواء بشكل مفاجئ، بلغ طبيبك إذا كنت تنوي التوقف عن العلاج. يرشدك طبيبك كيف يتوجب عليك التوقف عن العلاج.

في حال تتوقف عن العلاج بـ **نوكتورنو** بشكل مفاجئ، فإن إضطرابات النوم قد تعود لديك، وأنت قد تعاني من "أعراض الفطام".

إذا حدثت هذه الحالة، فأنت قد تعاني من بعض الأعراض المُفصلة لاحقاً.

يجب التوجه حالاً إلى الطبيب إذا كنت تعاني من أي عرض من الأعراض التالية:

- الشعور بقلق، قلة ثبات، عصبية، هياج، إرتباك أو لديك نوبات من القلق.
- تعرق.
- صداع.
- ضربات قلب أسرع أو غير منتظمة (خفقان).
- تدني مستوى اليقظة ومشاكل في التركيز أو التركيز.
- كوابيس ليلية، رؤية أو سماع أشياء غير حقيقية (هذيان).
- حساسية مفرطة للضوء، للضجيج واللمس.
- خلل في إدراك الواقع.
- خدر والشعور بوخز في اليدين وفي القدمين.

- آلام عضلية.

- مشاكل في البطن.

في حالات نادرة قد تظهر أيضاً تشنجات (إختلاجات).

لا يجوز تناول الأدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتأكد من المقدار الدوائي في كل مرة تتناول فيها دواء. ضِع النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول إستعمال هذا الدواء، إستشر الطبيب أو الصيدلي.

4 الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، إن إستعمال **نوكتورنو** قد يسبب أعراضاً جانبية عند بعض المستعملين. لا تندمَش من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز ألا تعاني أياً منها.

توقف عن العلاج بالدواء وتوجه حالاً إلى الطبيب أو إلى المستشفى إذا:

كنت تعاني من رد فعل تحسسي لـ **نوكتورنو**. العلامات يمكن أن تشمل: طفح، صعوبات في البلع أو التنفس، إنتفاخ في الشفتين، الوجه، الحنجرة أو اللسان.

توجه إلى الطبيب حالاً إذا كنت تلاحظ الأعراض الجانبية التالية:

أعراض جانبية نادرة (rare)، أعراض تظهر لدى 1-10 مستعملين من بين 10,000:

- ضعف في الذاكرة منذ تناول **نوكتورنو** (نسيان). يمكنك تقليل احتمال حدوث هذا العرض، في حال تأكدت من أنه يمكنك النوم 7-8 ساعات بشكل متواصل من دون إزعاج بعد تناول **نوكتورنو**.
- رؤية أو سماع أشياء غير حقيقية (هذيان).
- سقوطات، بالأخص لدى المسنين.

أعراض جانبية ذات شيوع غير معروف (أعراض لم يُحدد شيوعها بعد):

- أفكار عن أشياء غير حقيقية (أوهام).
- الشعور بجزأ أو كآبة (تدني الحالة النفسية).

راجع الطبيب أو الصيدلي إذا تفاقمت أو استمرت إحدى الأعراض التالية لأكثر من عدة أيام:

أعراض جانبية شائعة (common)، أعراض تظهر لدى 1-10 مستعملين من بين 100:

- طعم قليل المرارة أو معدني في الفم أو جفاف الفم.
- الشعور بنعاس أو الميل للنوم.

أعراض جانبية غير شائعة (uncommon)، أعراض تظهر لدى 1-10 مستعملين من بين 1,000:

- غثيان أو تقيؤ.
- الشعور بدوخة أو نعاس.
- صداع.
- كوابيس.
- الشعور بإرهاق جسدي أو نفسي.
- عصبية.

أعراض جانبية نادرة (rare)، أعراض تظهر لدى 1-10 مستعملين من بين 10,000:

- الشعور بإرتباك.
- طفح حاك، درنات (شرى).
- الشعور بعصبية أو عدوانية.
- تناقص الرغبة الجنسية.
- صعوبة في التنفس أو ضيق تنفس.

أعراض جانبية ذات شيوع غير معروف (أعراض لم يُحدد شيوعها بعد):

- الشعور بقلة راحة أو غضب.
- الشعور بدوار أو مشاكل في التنسيق.
- إزدواج الرؤية.
- تنفس بشكل أبطأ (تثبيط تنفسي).
- حركة غير ثابتة أو متأرجحة.
- ضعف العضلات.
- إضطراب في الهضم.
- تشكك تعلق بـ **نوكتورنو**.
- شعور غير عادي في الجلد، مثل خدر، وخز، نخز، إكتواء أو تنمل (paresthesia).
- إضطرابات ذهنية، مثل تضرر الذاكرة.
- صعوبة التركيز.
- إضطراب في النطق.

قد يؤدي **نوكتورنو** إلى السير خلال النوم أو إلى سلوك شاذ آخر (مثل السياقة، تناول الطعام، إجراء مكالمات هاتفية أو ممارسة العلاقات الجنسية وإلى آخره) حينما لا تكون يقظاً بشكل تام.

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقمت إحدى الأعراض الجانبية أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة، عليك إستشارة الطبيب.

التبليغ عن أعراض جانبية

بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط «تبليغ عن أعراض جانبية عقب علاج دوائي» الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يوجهك إلى النموذج المباشر للتبليغ عن أعراض جانبية أو عن طريق تصفح الرابط: <https://sideeffects.health.gov.il> بالإضافة لذلك، بالإمكان تبليغ شركة "يونيفارم.م.ض."

5 كيفية تخزين الدواء؟

تجنب التسهم!

يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي ومجال رؤية الأطفال و/أو الرضع، وذلك لتفادي إصابتهم بالتسمم. لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب. لا يجوز إستعمال الدواء بعد إنقضاء تاريخ الصلاحية (exp.date) الذي يظهر على ظهر العلبة. يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

التخزين: يُحفظ بدرجة حرارة حتى 25 درجة مئوية وفي مكان محمي من الضوء.

6 معلومات إضافية

يحتوي الدواء بالإضافة للمادة الفعالة أيضاً على:

Dibasic Calcium Phosphate; Lactose; Maize Starch; Sodium Starch Glycolate; Magnesium Stearate; Opadry.

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العلبة:

الدواء معبأ ضمن لوحات (بليستر) بإدخال علبة كرتون. بكل علبة من **نوكتورنو 3.75** يوجد 7، 10، 14، 15، 20، أو 30 قرصاً. من الجائز ألا تسوّق كافة أحجام العلب.

بكل علبة من **نوكتورنو فورته 7.5** يوجد 7، 10، 14، 20، 21، أو 28 قرصاً. من الجائز ألا تسوّق كافة أحجام العلب.

أقراص **نوكتورنو 3.75** هي مطلية، مستديرة، محدية الجانبين، ذات لون برتقالي. أقراص **نوكتورنو فورته 7.5** هي مطلية، مستديرة، محدية الجانبين، ذات لون أصفر.

إسم صاحب الإمتياز وعنوانه: يونيفارم.م.ض، ص.ب. 21429، تل - أبيب، 6121301.

إسم المنتج وعنوانه: يونيفارم.م.ض،. يارك الصناعة "مافو كرمل".

رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة:

نوكتورنو 3.75: 121 81 30138 01

نوكتورنو فورته 7.5: 111 24 29356 01

تم إعدادها في كانون الثاني 2023 بموجب تعليمات وزارة الصحة.

من أجل سهولة وتوحيين القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكور. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.