רופא/ה נכבד/ה רוקח/ת נכבד/ה,

אימווקס פוליו \ Imovax Polio : הנדון : Suspension for injection

חברת מדיצ'י מדיקל בע"מ מבקשת להודיע על עדכון העלון לרופא של החיסון Imovax Polio אימווקס פוליו. עדכוני העלון מפורטים מטה

<u>Indication:</u> Prophylaxis of poliomyelitis.

<u>מקרא לסימון העדכונים:</u> טקסט חדש – <u>נראה כך,</u> מחיקה *–- נראית כך.* החמרה <mark>נראית כך</mark>

IMOVAX POLIO, suspension for injection in a prefilled syringe or multidose Poliomyelitis vaccine (inactivated)

[...]

PRECAUTIONS

GENERAL

Prior to an injection of any vaccine, all known precautions should be taken to prevent adverse reactions. This includes a review of the patient's history with respect to possible sensitivity to the vaccine or similar vaccines.

Healthcare providers should question the patient, parent or guardian about reactions to a previous dose of this product, or similar product.

Epinephrine injection (1:1000) and other appropriate agents should be available to control immediate allergic reactions.

Healthcare providers should obtain the previous immunization history of the vaccinee, and inquire about the current health status of the vaccinee.

Immunodeficient patients or patients under immunosuppressive therapy may not develop a protective immune response against paralytic poliomyelitis after administration of IPV.

Administration of IMOVAX POLIO vaccine is not contraindicated in individuals infected with HIV.

Special care should be taken to ensure that the injection does not enter a blood vessel.

Syncope (fainting) has been reported following vaccination with IMOVAX POLIO. Procedures should be in place to avoid injury from fainting.

[...]

יש עדכונים נוספים, למידע נוסף יש לעיין בעלון לרופא המעודכן.

העלון לרופא נשלח לפרסום במאגר התרופות שבאתר משרד הבריאות:

https://data.health.gov.il/drugs/index.html#!/medDetails/160%2019%2035153%2000

וניתן לקבלו מודפס על ידי פניה לחברת מדיצ'י מדיקל בע"מ, רח' המחשב 3 נתניה, בטלפון 09-7446170