

نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيدالة (مستحضرات) - 1986

يُسَوَّق الدواء وفق وصفة طبيب فقط

بوبروبيون 150 ملغ أقراص بإطلاق ممتد بوبروبيون 300 ملغ أقراص بإطلاق ممتد

يحتوي كل قرص من بوبروبيون 150 ملغ بإطلاق ممتد على:
بوبروبيون هيدروكلوريد (bupropion hydrochloride) 150 ملغ

يحتوي كل قرص من بوبروبيون 300 ملغ بإطلاق ممتد على:
بوبروبيون هيدروكلوريد (bupropion hydrochloride) 300 ملغ

لقائمة المواد غير الفعالة في المستحضر انظر الفصل 6 – "معلومات إضافية".

اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها وذلك قبل البدء باستخدام الدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا كانت لديك أسئلة إضافية، فتوجه إلى الطبيب أو إلى الصيدلي. وصف هذا الدواء من أجلك. لا تعطه للآخرين. لأنه قد يضرّ بهم، حتى لو بدا لك تشابه بين حالتك وحالتهم الصحية. بوبروبيون أقراص بإطلاق ممتد غير معدّ للعلاج لدى أطفال دون عمر 18 سنة.

تزيد الأدوية المضادة للاكتئاب والقلق من خطر حدوث تصرفات وأفكار انتحارية لدى الأطفال، المراهقين والبالغين اليافعين حتى عمر 25 سنة. مع بداية العلاج بالدواء، يتوجب على المتعالجين من كافة الأعمار وأقربائهم، متابعة التغيرات السلوكية مثل تفاهم الاكتئاب، أفكار انتحارية، عدوانية وما شابه. يجب مراجعة الطبيب حالاً، إذا طرأت مثل هذه التغيرات.

1. لم أعد هذا الدواء؟

بوبروبيون أقراص بإطلاق ممتد معدة لعلاج الاكتئاب. بعد تحقيق استجابة كافية، استمرار العلاج بـ بوبروبيون أقراص بإطلاق ممتد يكون ناجحاً في منع اندلاعات الاكتئاب.

المجموعة العلاجية:

مثبط إنتقائي لإعادة إستيعاب نورأدرينالين ودوبامين.

2. قبل استعمال الدواء

يُمنع استعمال الدواء إذا:

- وجدت لديك حساسية (أرجي) لبوبروبيون أو لأحد المركبات الأخرى التي يحتويها الدواء (انظر الفصل 6).
 - كنت تتناول أدوية أخرى أيًا كانت تحتوي على بوبروبيون.
 - تم تشخيصك على أنك تعاني من الصرع أو لديك سابقة لاختلاجات.
 - يوجد لديك أو كان لديك اضطراب في الأكل (مثلاً، النهام (bulimia) أو القهم العصبي (nervosa anorexia)).
 - كان لديك ورم في الدماغ.
 - كنت تشرب عادة المشروبات الروحية بشكل مفرط وقد توقفت للتو أو أنك على وشك التوقف عن شربها.
 - كانت لديك مشاكل كبدية خطيرة.
 - كنت قد توقفت مؤخرًا عن تناول أدوية مهدنة، أو إذا كنت على وشك التوقف عن تناولها في الوقت الذي تتناول بوبروبيون أقراص بإطلاق ممتد.
 - كنت تتناول أو قد تناولت أدوية أخرى للاكتئاب أو لداء الباركنسون تسمى مثبطات مونوأمين أو أكسيداز (MAOIs) خلال الـ 14 يومًا الأخيرة.
- إذا إنطبقت عليك إحدى هذه الحالات، تحدث فورًا مع الطبيب، بدون تناول بوبروبيون أقراص بإطلاق ممتد.

تحذيرات خاصة متعلقة باستعمال الدواء
تحدث مع الطبيب أو الصيدلي قبل استعمال بوپروبيون أقراص بإطلاق ممتد.

متلازمة بروغادا
إذا كانت لديك حالة تسمى متلازمة بروغادا (متلازمة وراثية نادرة تؤثر على نظم القلب) أو إذا حدثت سكتة قلبية أو موت مفاجئ في عائلتك.

يجب أن يعرف الطبيب قبل أن تتناول بوپروبيون أقراص بإطلاق ممتد إذا:

- كنت تشرب كميات كبيرة من الكحول بشكل دائم.
 - كان لديك سكري الذي لأجله تستعمل إنسولين أو أقراص.
 - كان لديك إصابة خطيرة في الرأس أو سابقة لرضة في الرأس.
- تبين أن بوپروبيون أقراص بإطلاق ممتد تسبب نوبات (اختلاجات) لدى ما يقارب 1 من بين 1,000 مستعمل. يرجى أكثر أن يحدث هذا العرض الجانبي لدى أشخاص من المجموعات المذكورة أعلاه. إذا كان لديك نوبة خلال العلاج فعليك التوقف عن تناول بوپروبيون أقراص بإطلاق ممتد. لا تتناول المزيد وتوجه إلى الطبيب.
- كنت تعاني من اضطراب ثنائي القطب (تغيرات قصوى في المزاج)، لأن بوپروبيون أقراص بإطلاق ممتد قد تؤدي إلى عوارض لهذا المرض.
 - إذا كنت تتناول أدوية أخرى للاكتئاب، فإن استعمال هذه الأدوية سوية مع بوپروبيون أقراص بإطلاق ممتد يمكن أن تؤدي لمتلازمة السيروتونين، حالة بإمكانها أن تشكل خطرًا على الحياة (انظر "تفاعلات/ردود فعل بين الأدوية" في هذا الفصل)
 - كانت لديك مشاكل في الكبد أو في الكلى، قد يكون لديك إجمال أكبر للمعاناة من أعراض جانبية.
- إذا انطبقت عليك إحدى الحالات المذكورة أعلاه، تحدث ثانية مع الطبيب قبل تناول بوپروبيون أقراص بإطلاق ممتد. قد يرغب بأن يكرس اهتماماً خاصاً لعلاجك، أو أن يوصي بعلاج آخر.

أفكار انتحارية وتفاقم الاكتئاب

إذا كنت مكتئبًا، قد تراودك أحيانًا أفكار لإلحاق الأذى بنفسك أو الانتحار. قد تزداد الأفكار مع تناول مضادات الاكتئاب لأول مرة، حيث إن كافة هذه الأدوية تستغرق وقتًا كي تبدأ بالتأثير، على الأغلب نحو أسبوعين، بل أكثر من ذلك في بعض الأحيان.

من الجائز وأن يكون الإجمال أكبر بأن تفكر على هذا النحو إذا:

- كانت لديك في الماضي أفكار إنتحارية أو لإلحاق الأذى بنفسك.
- كنت شابًا يافعًا. أظهرت المعلومات من التجارب السريرية وجود خطر زائد لسلوك إنتحاري لدى البالغين دون عمر 25 سنة الذين لديهم حالات نفسية والذين عولجوا بمضاد للاكتئاب.

إذا كانت لديك أفكار لإلحاق الأذى بنفسك أو الانتحار في أي وقت كان، إتصل بالطبيب أو توجه إلى المستشفى فورًا. قد تجد أنه من المفيد أن تحكي لأحد أقربائك أو لصديق قريب بأنك مكتئبًا، وأن تطلب منهم قراءة هذه النشرة. يمكنك أن تطلب منهم أن يبلغوك إذا كانوا يعتقدون أن الاكتئاب لديك يتفاقم، أو إذا كانوا قلقين بخصوص تغيرات في سلوكك.

الأطفال والمراهقون

بوپروبيون أقراص بإطلاق ممتد غير معدّ للعلاج لدى أطفال ومراهقين دون عمر 18 سنة. هناك خطورة زائدة لسلوكيات وأفكار انتحارية عندما يُعالج الأطفال والمراهقون دون عمر 18 سنة بمضادات الاكتئاب.

تفاعلات/ردود فعل بين الأدوية

إذا كنت تتناول أو تناولت أدوية أخرى للاكتئاب أو لمرض پاركينسون التي تسمى مثبطات مونوأمين أوكسيداز (MAOIs) خلال الـ 14 يومًا الأخيرة، أخبر الطبيب بدون تناول بوپروبيون أقراص بإطلاق ممتد (انظر أيضًا "يُمنع استعمال الدواء إذا" في هذا الفصل).

إذا كنت تتناول، إذا تناولت مؤخرًا أو من الجائز أن تتناول أدوية أخرى، بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، أخبر الطبيب أو الصيدلي عن ذلك. من الجائز أن يغير الطبيب جرعة بوپروبيون أقراص بإطلاق ممتد أو يقترح تغييرًا بأدوية الأخرى.

لا تندمج أدوية معينة مع بوبروبيون أقرص بإطلاق ممتد. قد يزيد بعضها من احتمال حدوث نوبات أو إختلاجات. قد تزيد أدوية أخرى من خطورة حدوث أعراض جانبية أخرى. فيما يلي تفصيل لبعض الأمثلة، لكن هذه ليست قائمة كاملة.

قد يكون هناك احتمال أكبر من المعتاد لحدوث إختلاجات إذا:

- كنت تتناول أدوية أخرى للإكتئاب أو لأمراض نفسية أخرى
- كنت تتناول ثيوفيلين للربو أو لمرض رئوي
- كنت تتناول ترامادول، مسكن قوي للألام
- تناولت أدوية مهدئة، أو إذا كنت على وشك التوقف عن تناولها بينما ما زلت تتناول بوبروبيون أقرص بإطلاق ممتد (انظر أيضًا "يمنع استعمال الدواء إذا" في هذا الفصل)
- كنت تتناول أدوية ضد الملاريا (مثل ميفلوكوين أو كلوروكوين)
- كنت تتناول منشطات أو أدوية أخرى للسيطرة على الوزن أو الشهية للطعام
- كنت تتناول ستيروئيدات (عن طريق الفم أو بالحقن)
- كنت تتناول مضادات حيوية تسمى كوينولونات
- كنت تتناول أنواع معينة من مضادات الهيستامين التي قد تسبب الميل إلى النوم
- كنت تتناول أدوية للسكري.

إذا انطبقت عليك إحدى هذه الحالات، تحدث مع الطبيب فورًا، قبل تناول بوبروبيون أقرص بإطلاق ممتد. يدرس الطبيب الفوائد والمخاطر من أجلك عند تناول بوبروبيون أقرص بإطلاق ممتد.

قد يكون هناك احتمال أكبر من المعتاد لحدوث أعراض جانبية أخرى إذا:

- كنت تتناول أدوية أخرى للإكتئاب (مثل أميتريبتيلين، فلوأوكسيتين، پاروكسيتين، سيتالوبرام، إسيتالوبرام، فينلافكسين، دوسوليبين، ديسيبرامين أو إيميبرامين) أو لأمراض نفسية أخرى (مثل كلوزابين، ريسبيريدون، تيوريدازين أو أولانزابين)
- من شأن بوبروبيون أقرص بإطلاق ممتد أن يتفاعل مع أدوية معينة تُستعمل لعلاج الإكتئاب وقد تقاسي من تغييرات في الحالة النفسية (مثلًا عدم هدوء، هلوسات، غيبوبة)، وتأثيرات أخرى مثل حرارة الجسم فوق 38 درجة مئوية، إرتفاع نظم القلب، عدم إستقرار ضغط الدم ومنعكسات مفرطة، تصلب العضلات، قلة التنسيق و/أو أعراض الجهاز الهضمي (مثلًا غثيان، تقيؤ، إسهال)
- كنت تتناول أدوية لداء الباركنسون (ليفودوبا، أمانتادين أو أورفينادرين)
- كنت تتناول أدوية تؤثر على قدرة الجسم على تفكيك بوبروبيون (كاربامازيبين، فينيتوئين، كالبروات)
- كنت تتناول أدوية معينة تستعمل لعلاج السرطان (مثل سيكلوفوسفاميد، إيفوسفاميد)
- كنت تتناول كلويدوجريل الذي يستعمل بشكل خاص لمنع حدوث سكتة
- كنت تتناول حاجبات بيتا معينة (مثل ميتوبرولول)
- كنت تتناول أدوية معينة لعدم إنتظام نظم القلب (بروباقينون أو فليكاينيد)
- كنت تستعمل لصقات نيكوتين لمساعدتك على الإقلاع عن التدخين.

إذا انطبقت عليك إحدى هذه الحالات، تحدث مع الطبيب فورًا، قبل تناول بوبروبيون أقرص بإطلاق ممتد.

قد يكون بوبروبيون أقرص بإطلاق ممتد أقل نجاعة

- إذا كنت تتناول ريتونافير أو إيفافيرينز، أدوية لعلاج عدوى HIV.

إذا إنطبق هذا عليك، أخبر الطبيب. سوف يفحص الطبيب مدى نجاعة بوبروبيون أقرص بإطلاق ممتد بالنسبة لك. قد يكون من الضروري رفع جرعتك أو تغيير علاج الاكتئاب إلى علاج آخر. لا ترفع جرعة بوبروبيون أقرص بإطلاق ممتد بدون استشارة الطبيب، حيث إن هذا الأمر قد يزيد من خطر حصول أعراض جانبية لديك، يشمل إختلاجات.

قد يقلل بوبروبيون أقرص بإطلاق ممتد من نجاعة أدوية أخرى

- إذا كنت تتناول تاموكسيفن الذي يستعمل لعلاج سرطان الثدي.

إذا إنطبق هذا عليك، تحدث مع الطبيب. قد تكون هناك حاجة لتغيير العلاج بعلاج آخر للاكتئاب.

- إذا كنت تتناول ديجوكسين للقلب.

إذا إنطبق هذا عليك، تحدث مع الطبيب. قد يدرس الطبيب ملاءمة جرعة ديجوكسين.

استخدام الدواء والغذاء
يمكن تناول الدواء مع أو بدون طعام.

استخدام الدواء واستهلاك الكحول
يمكن للكحول أن يؤثر على طريقة عمل بوبروبيون أقراص بإطلاق ممتد وعندما يؤخذان سوياً، يمكنهما في حالات نادرة، أن يؤثرتا على الأعصاب أو على الحالة النفسية. بعض الأشخاص يجدون أنهم أكثر حساسية للكحول عندما يتناولون بوبروبيون. قد يوصيك الطبيب بعدم شرب الكحول (بيرة، نبيذ أو مشروبات روحية) عندما تتناول بوبروبيون أقراص بإطلاق ممتد، أو أن تحاول أن تشرب قليلاً جداً. لكن إذا كنت تشرب الكثير حالياً، فلا تتوقف بشكل مفاجئ، فقد يزيد من خطر حدوث اختلاجات.
تحدث مع الطبيب بخصوص شرب الكحول قبل أن تبدأ بتناول بوبروبيون أقراص بإطلاق ممتد.

التأثير على فحوص البول
قد يشوش بوبروبيون أقراص بإطلاق ممتد على فحوص بول معينة لتشخيص أدوية أخرى. إذا توجب عليك الخضوع لفحص بول، أخبر الطبيب أو المستشفى بأنك تتناول بوبروبيون أقراص بإطلاق ممتد.

الحمل والإرضاع
الحمل
لا تتناولي بوبروبيون أقراص بإطلاق ممتد إذا كنت حاملاً، تعتقدين بأنه من الجائز أنك حامل أو تخططين للحمل، إلا إذا أوصى الطبيب بذلك. استشيرى الصيدلي أو الطبيب قبل تناول هذا الدواء. بعض الأبحاث، لكن ليس جميعها، أبلغت على ارتفاع خطر حدوث تشوهات خلقية، خاصة تشوهات قلبية، لدى رُضع تناولت أمهاتهم بوبروبيون من غير المعروف فيما إذا كان ذلك في أعقاب استعمال بوبروبيون.

الإرضاع
يمكن لمركبات بوبروبيون أقراص بإطلاق ممتد أن تنتقل إلى حليب الأم. استشيرى الطبيب أو الصيدلي قبل تناول بوبروبيون أقراص بإطلاق ممتد.

السياقة وإستعمال الماكينات
إذا كانت بوبروبيون أقراص بإطلاق ممتد تسبب لك الدوار أو الشعور بأنك توشك على الإغماء، لا تقد أو تشغل أية أدوات أو ماكينات.

3. كيفية إستعمال الدواء؟

يجب استعمال المستحضر دائماً حسب تعليمات الطبيب. يجب عليك الفحص مع الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكدًا فيما يتعلق بالجرعة وبطريقة العلاج بالمستحضر.
قد يستغرق فترة من الزمن حتى تبدأ الشعور بتحسن. يستغرق فترة من الزمن حتى يتم الحصول على تأثير كامل للدواء، في بعض الأحيان أسابيع أو أشهر. عندما يبدأ شعورك بالتحسن، قد يوصيك الطبيب بالاستمرار بتناول بوبروبيون أقراص بإطلاق ممتد لمنع عودة الاكتئاب.

الجرعة وطريقة العلاج سيحددهما الطبيب، فقط.
الجرعة المُتَّبعة للبالغين هي قرص واحد من عيار 150 ملغ مرة في اليوم.
قد يزيد الطبيب جرعتك إلى 300 ملغ مرة في اليوم إذا لم يتحسن الاكتئاب بعد عدة أسابيع.
تناول جرعة أقراص بوبروبيون أقراص بإطلاق ممتد في الصباح. لا يجوز تناول بوبروبيون أكثر من مرة واحدة في اليوم.

يُمنع تجاوز الجرعة الموصى بها.

القرص مطلي بقشرة التي تحرر الدواء ببطء داخل الجسم. قد تلاحظ شيئاً في البراز يبدو مثل قرص. إنها القشرة الفارغة التي تخرج من جسمك.
إبلع الأقراص بشكلها الكامل. يُمنع مضغها، سحقها أو شطرها – إذا قمت بذلك، هناك خطر بأن تأخذ جرعة مفرطة، حيث إن الدواء سيتحرر إلى داخل جسمك بشكل أسرع. سوف يزيد ذلك من إمكانية حدوث أعراض جانبية لديك، يشمل نوبات (اختلاجات).

قد يكون للأقراص رائحة. هذا أمر سليم.
بعض الأشخاص يستمرون بتناول قرص واحد من عيار 150 ملغ في كل يوم خلال كامل فترة العلاج. قد يصف لك الطبيب ذلك إذا كانت لديك مشاكل كبدية أو كلوية.

كم من الوقت عليك أن تتناول الدواء
فقط أنت والطبيب يمكنكما أن تقررا كم من الوقت عليك تناول بوبروبيون أقراص بإطلاق ممتد. قد يستغرق أسابيع أو أشهر من العلاج حتى تلاحظ تحسن أيًا كان. تحدث عن الأعراض مع الطبيب بشكل دائم ليتم تحديد كم من الوقت عليك تناوله. عندما تبدأ بالشعور بتحسن، قد يوصيك الطبيب بالاستمرار بتناول بوبروبيون أقراص بإطلاق ممتد لمنع عودة الاكتئاب.

القنينة مغلقة بغطاء صعب للفتح من قبل الأطفال
تعليمات الفتح: لإزالة الغطاء، يجب الضغط للأسفل وفي نفس الوقت التدوير لليسار (عكس إتجاه عقارب الساعة).
تعليمات الإغلاق: يجب وضع الغطاء على الطرف المفتوح للقنينة والتدوير بإتجاه اليمين (في إتجاه عقارب الساعة) حتى يُغلق تمامًا.

إذا تناولت عن طريق الخطأ جرعة أعلى
إذا كنت تتناول أقراصاً أكثر من اللازم، قد تزيد من خطر حدوث نوبات أو إختلاجات.
إذا تناولت جرعة مفرطة أو إذا قام طفل بابتلاع كمية من الدواء عن طريق الخطأ، توجه فوراً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى، وأحضر علبة الدواء معك.

إذا نسيت تناول هذا الدواء
إذا نسيت تناول هذا الدواء في الوقت المطلوب، يُمنع تناول جرعة مضاعفة.
تناول الجرعة التالية في الوقت المعتاد واستشر الطبيب.
يجب الاستمرار في العلاج حسب توصية الطبيب.

إذا توقفت عن تناول الدواء
يُمنع التوقف عن تناول بوبروبيون أقراص بإطلاق ممتد أو تقليل الجرعة بدون استشارة الطبيب قبل التوقف، حتى ولو طرأ تحسن على صحتك.

يُمنع تناول الأدوية في الظلام! تحقق من الملصق على عبوة الدواء ومن الجرعة الدوائية في كل مرة تتناول فيها دواء.
ضع النظرات الطبية إذا كنت بحاجة إليها.
إذا كانت لديك أسئلة إضافية بالنسبة إلى استعمال الدواء فاستشر الطبيب أو الصيدلي.

4. الأعراض الجانبية

كجميع الأدوية، إن استعمال بوبروبيون أقراص بإطلاق ممتد قد يسبب أعراضاً جانبية عند بعض المستعملين. لا تندش عند قراءة قائمة الأعراض الجانبية. من المحتمل ألا تعاني من أيٍّ منها.

أعراض جانبية خطيرة نوبات أو إختلاجات

نحو 1 من كل 1,000 شخص الذين يتناولون بوبروبيون أقراص بإطلاق ممتد معرض لخطر حدوث نوبة (اختلاج أو تشنج). يزيد احتمال حدوث ذلك إذا كنت تتناول بوبروبيون أقراص بإطلاق ممتد أكثر من اللازم، إذا كنت تتناول أدوية معينة، أو إذا كنت معرضاً لخطر أعلى من المعتاد لحدوث نوبات. إذا كنت قلقاً، تحدث مع الطبيب.
إذا كانت لديك نوبة، أخبر الطبيب بعد أن تتعافى. لا تتناول أقراصاً إضافية.

ردود فعل تحسسية

قد يعايش بعض الأشخاص ردود فعل تحسسية تجاه بوبروبيون أقراص بإطلاق ممتد. تشمل هذه:

- جلد أحمر أو طفح (يشبه الشرى)، حويصلات أو درنات حاكة (شرى) على الجلد. إن بعض أنواع الطفح الجلدي قد توجب علاجاً في المستشفى، خاصة إذا كنت تعاني أيضاً من الآم في الفم أو في العينين.
- حالات صفير غير اعتيادي أو صعوبات في التنفس
- انتفاخ في الجفنين، الشفتين أو اللسان

- آلام في العضلات أو المفاصل
- انهيار أو فقدان الوعي.

إذا كانت لديك أية علامات لرد فعل تحسسي إتصل بالطبيب حالاً. لا تتناول أقراسا إضافية. قد تستمر ردود الفعل التحسسية لفترة طويلة. إذا وصف لك الطبيب شيئاً ليساعدك بخصوص أعراض الحساسية، تأكد من إنهائك للعلاج.

طفح جلدي لذئبة (Lupus Erythematosus) أو تفاقم أعراض الذئبة
شبيوع غير معروف - لا يمكن تقييم الشبيوع من المعطيات المتوفرة لدى أشخاص يتناولون بوبروبيون أقراس بإطلاق ممتد.

تعتبر الذئبة اضطراب في الجهاز المناعي الذي يؤثر على الجلد وأعضاء أخرى. ← إذا عايشت نوبات احتدام للذئبة، طفح جلدي أو آفات (خاصة في المناطق المعرضة للشمس) خلال تناول بوبروبيون أقراس بإطلاق ممتد، اتصل بالطبيب فوراً، لأنه من الجائز أن تحتاج إلى التوقف عن العلاج.

بثار طفحي معمم حاد (Acute Generalised Exanthematous Pustulosis - AGEP)
شبيوع غير معروف - لا يمكن تقدير الشبيوع من المعلومات المتوفرة لدى الأشخاص الذين يتناولون بوبروبيون أقراس بإطلاق ممتد.

تشمل أعراض AGEP طفح مع بثور مليئة بالقبح/حويصلات. ← إذا كان لديك طفح مع بثور مليئة بالقبح/حويصلات، اتصل بالطبيب على الفور، لأنه قد تكون هناك حاجة للتوقف عن العلاج.

أعراض جانبية إضافية

أعراض جانبية شائعة جداً - قد تظهر لدى أكثر من 1 من كل 10 مستعملين:

- صعوبات في النوم. تأكد من تناولك بوبروبيون أقراس بإطلاق ممتد في الصباح
- صداع
- جفاف في الفم
- شعور بعثيان، تقيؤ.

أعراض جانبية شائعة - قد تظهر لدى حتى 1 من كل 10 مستعملين:

- سخونة، دوار، حكة، تعرق وطفح جلدي (في بعض الأحيان بسبب رد فعل تحسسي)
- رجفان، ضعف، إرهاق، آلام في الصدر
- شعور بالقلق أو العصبية
- ألم أو اضطرابات أخرى في البطن (إمساك)، تغيرات في مذاق الطعام، فقدان الشهية للطعام (anorexia)
- ارتفاع ضغط الدم - يكون خطيراً أحياناً، تورد
- طنين في الأذنين، اضطرابات في الرؤية.

أعراض جانبية غير شائعة - قد تظهر هذه لدى حتى 1 من كل 100 مستعمل:

- شعور بالاكتئاب (انظر أيضاً الفصل 2 "تحذيرات خاصة متعلقة بإستعمال الدواء"، تحت "أفكار انتحارية وتفاقم الاكتئاب")
- شعور بإرتباك
- صعوبة في التركيز
- نظم قلب منسارع
- إنخفاض في الوزن.

أعراض جانبية نادرة - قد تظهر لدى حتى 1 من كل 1,000 مستعمل:

- اختلاجات.

أعراض جانبية نادرة جداً - قد تظهر لدى حتى 1 من كل 10,000 مستعمل:

- خفقان القلب، إغماء
- تشنجات، تصلب العضلات، حركات خارجة عن السيطرة، مشاكل في المشي أو في التناسق

- شعور بقلّة الراحة، عدم الهدوء، عدائية، عدوانية، أحلام غريبة، شعور بالوخز أو قلة الإحساس، فقدان الذاكرة
- اصفرار الجلد أو بياض العينين (يرقان) الذي قد يحدث بسبب ارتفاع إنزيمات الكبد، التهاب الكبد (hepatitis)
- ردود فعل تحسسية شديدة؛ طفح سوية مع آلام في المفاصل والعضلات
- تغيرات في مستويات السكر في الدم
- تبول زائد أو أقل من المعتاد
- عدم السيطرة على التبول (تبول لا إرادي، تسرّب بول)
- طفح شديد في الجلد قد يظهر في الفم وفي أجزاء أخرى من الجسم وقد يشكل خطرًا على الحياة
- تفاقم الصدفية (بقع سميكة من جلد أحمر)
- شعور بالإنفصال عن الواقع أو شعور غريب (تبدد الشخصية)؛ رؤية أو سماع أشياء غير موجودة (هلوسات)؛ الشعور أو الاعتقاد بأشياء غير صحيحة (أوهام)؛ الشك بشكل شديد (ذهان خيالي).

- أعراض جانبية نسبة شيوعها غير معروفة (أعراض جانبية لم يتمّ تحديد تواترها بعد)**
- ظهرت أعراض جانبية أخرى لدى عدد قليل من الأشخاص لكن شيوعها الدقيق غير معروف:
- أفكار عن إلحاق الأذى بالنفس أو أفكار انتحارية خلال تناول بوبروبيون أقراص بإطلاق ممتد أو مباشرة بعد التوقف عن العلاج (انظر الفصل 2 "قبل استعمال الدواء"). إذا كان لديك مثل هذه الأفكار، اتصل بالطبيب أو توجه إلى المستشفى بشكل فوري.
 - فقدان العلاقة بالواقع وعدم القدرة على التفكير أو الحكم على الأمور بذهن صافي (ذهان)، أعراض أخرى يمكن أن تشمل هلوسات و/أو أو هام.
 - تأتأة
 - انخفاض عدد خلايا الدم الحمراء (فقر الدم)، انخفاض في عدد خلايا الدم البيضاء (leucopenia) وانخفاض في عدد الصفيحات الدموية (thrombocytopenia).
 - انخفاض بمستوى الصوديوم في الدم (hyponatremia)
 - تغيير في الحالة النفسية (مثلًا، عدم هدوء، هلوسات، غيبوبة)، وتأثيرات أخرى مثل حرارة الجسم فوق 38 درجة مئوية، ارتفاع نظم القلب، عدم استقرار ضغط الدم ومنعكسات مفرطة، تصلب العضلات، قلة التنسيق و/أو أعراض الجهاز الهضمي (مثلًا غثيان، تقيؤ، اسهال)، أثناء تناول بوبروبيون أقراص بإطلاق ممتد سوية مع أدوية لعلاج الإكتئاب (مثل پاروكسيتين، سيتالوبرام، إسيتالوبرام، فلوأوكسيتين وثنيلافاكسين).
- إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقم أحد الأعراض الجانبية أو إذا عانيت من أعراض جانبية غير مذكورة في النشرة، عليك استشارة الطبيب.

التبليغ عن أعراض جانبية

من الممكن تبليغ وزارة الصحة عن أعراض جانبية من خلال الضغط على الرابط "التبليغ عن أعراض جانبية نتيجة لعلاج دوائي" الموجود على الصفحة الرئيسية في موقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يحوّلك إلى استمارة عبر الإنترنت للتبليغ عن الأعراض الجانبية، أو عبر دخول الرابط: <https://sideeffects.health.gov.il>

5. كيف يخزن الدواء؟

- تجنّب التسمّم! يجب حفظ هذا الدواء وكلّ دواء آخر في مكان مغلق بعيدًا عن متناول أيدي ومجال رؤية الأولاد و/أو الأطفال، وهكذا تتجنّب التسمّم. لا تسبّب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.
- يُمنع استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (exp. date) الظاهر على العبوة. تاريخ انتهاء الصلاحية ينسب إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.
- شروط التخزين: يجب التخزين في درجة مئوية 25°C.
- للاستعمال خلال 30 يومًا من الفتح.
- يُمنع إلقاء الأدوية في مياه الصرف الصحيّ أو في سلّة المهملات في البيت. قم باستشارة الصيدليّ بالنسبة إلى كيفية التخلص من أدوية التي لم تعد ضمن الاستعمال. هذه الخطوات ستساعد في الحفاظ على البيئة.

6. معلومات إضافية

يحتوي الدواء بالإضافة للمركب الفعال أيضاً:

Povidone K-90, ethyl cellulose, povidone K-30, L (+) – tartaric acid, glyceryl distearate, hydroxypropyl cellulose, methacrylic acid copolymer, colloidal silicone dioxide, magnesium stearate

حبر للطباعة:

Opacode black S-1-17823

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العبوة:

أقراص بوبروبيون 150 ملغ بإطلاق ممتد هي أقراص مدوّرة، مطلية، بلون أبيض حتى كريمي مع طباعة "ST 150" بحبر أسود على جانب واحد وملساء من الجانب الآخر. تتوفر بقناني بولي إيثيلين بيضاء التي تحتوي على 30 أو 1,000 قرصًا. القنينة مغلقة بغطاء صعب للفتح من قبل الأطفال.

أقراص بوبروبيون 300 ملغ بإطلاق ممتد هي أقراص مدوّرة، مطلية، بلون أبيض حتى كريمي مع طباعة "ST 300" بحبر أسود على جانب واحد وملساء من الجانب الآخر. تتوفر بقناني بولي إيثيلين بيضاء التي تحتوي على 30 أو 1,000 قرص. القنينة مغلقة بغطاء صعب للفتح من قبل الأطفال. قد لا يتم تسويق جميع أحجام العبوات.

صاحب التسجيل وعنوانه: أوفيك فارما م.ض.، شارع سنير 22 بني درور، 4581500

اسم المنتج وعنوانه:

Hangzhou Minsheng Binjiang Pharmaceuticals Co. Ltd.,
658 Bin'an Road Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang 310051, China

أرقام تسجيل الدواء في سجل الأدوية الرسمي في وزارة الصحة:

بوبروبيون 150 ملغ أقراص بإطلاق ممتد: 171-57-37133-99

بوبروبيون 300 ملغ أقراص بإطلاق ممتد: 171-58-37134-99

لتبسيط قراءة هذه النشرة وتسهيلها ورد النص بصيغة المذكّر. مع هذا فالدواء معدّ لكلا الجنسين.

تم تحريرها في نيسان 2023 وفق تعليمات وزارة الصحة.