פרוטין 20 מ"ג טבליות מצופות

כל טבלית מצופה מכילה:
פלוקסטין (כהידרוכלוריד) 20 מ"ג
Paroxetine (as Hydrochloride) 20 mg

לרשימת המרכיבים הלא פעילים – ראה סעיף 6 "מידע נוסף".

לילדים ובמבוגרים מתחת לגיל 18:
אין להשתמש בפרוטין בילדים ובמתבגרים מתחת לגיל 18.
הפרעה בתפקוד הכבד – ראה סעיף 4.2 "מינון ואופן השימוש" ו- "אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה".
אל תפסיק את הטיפול בפרוטין ללא הנחיה רפואית.
אל תגדיל את המינון ללא הנחיה רפואית.
אל תשתמש בפרוטין אם אתה סובל מרגישות יתר לפלוקסטין.
אל תשתמש בפרוטין אם אתה נוטל תרופות מעכבי מונואמין אוקסידאז (MAOIs).
אל תשתמש בפרוטין אם אתה נוטל תרופות מסוג תיאורידאזין.
אל תשתמש בפרוטין אם אתה נוטל תרופות מסוג פימוזיד.
אל תשתמש בפרוטין אם אתה נוטל תרופות מסוג מלוקסון.
אל תשתמש בפרוטין אם אתה נוטל תרופות מסוג תיאוגלוזין.
אל תשתמש בפרוטין אם אתה נוטל תרופות מסוג לינזולין.
אל תשתמש בפרוטין אם אתה נוטל תרופות מסוג טריפטופן.
אל תשתמש בפרוטין אם אתה נוטל תרופות מסוג טרמדול.
אל תשתמש בפרוטין אם אתה נוטל תרופות מסוג אלפנטניל.
אל תשתמש בפרוטין אם אתה נוטל תרופות מסוג לינזולין.
אל תשתמש בפרוטין אם אתה נוטל תרופות מסוג מתילן כחול.
אל תשתמש בפרוטין אם אתה נוטל תרופות מסוג מרפלוקסין.
אל תשתמש בפרוטין אם אתה נוטל תרופות מסוג פרלינדון.
**אל תשתמש בפרוטין אם אתה נוטל תרופות מסוג אלמוז