

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו-1986

התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד.

שם התרופה צורתה וחוזקה

אגיספור שמפו

כל בקבוק מכיל: ביפונזול 1% Bifonazole

חומרים בלתי פעילים ואלרגניים בתכשיר – ראה סעיף 6. "מידע נוסף".

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

תרופה זו נרשמה לטיפול עבורך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מצבם הרפואי דומה.

1. למה מיועדת התרופה?

לטיפול במחלות פטרייתיות בקרקפת, כגון פטריאזיס ורסיקולור (פטרת השמש) וסבוראה דרמטיטיס (דלקת עור חלבית).

קבוצה תרפויטית אנטי פטרייתית רחבת טווח ממשפחת האימידאזולים.

2. לפני שימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה:

• אם אתה רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה.

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה

• יש לבצע מעקב מוגבר במטופלים המשתמשים בוורפרין warfarin

לפני הטיפול באגיספור ספר לרופא אם

• סבלת מתגובה אלרגית מתכשיר אנטיפטרייתי כלשהו

תינוקות ילדים ומתבגרים

לא קיים מידע לגבי בטיחות ויעילות תכשיר זה בילדים ומתבגרים.

השימוש בתינוקות ופעוטות חייב להיעשות תחת השגחה רפואית.

אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח. במיוחד יש ליידע את הרופא או הרוקח אם אתה לוקח וראפרין המשמש ל למניעת קרישת דם ולטיפול נגד קרישת דם.

היריון והנקה ופוריות

אין להשתמש בתרופה בזמן הריון או הנקה ללא הנחייה מפורשת מרופא. אין עדויות פרה-קליניות לפגיעה בפוריות האישה או הגבר.

נהיגה ושימוש במכונות

אין מניעה לנהוג או להפעיל מכונות מסוכנות בזמן השימוש בתרופה.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה

תרופה זו מכילה 33.8 גרם חומר Sodium lauryl sulfate ב100 גרם בתרופה, אשר עלול לגרום לתופעות לוואי עוריות מקומיות כגון תחושת עקצוץ או צריבה. ייתכן שתופעות לוואי עוריות יחמירו במגע עם מוצר אחר המשמש לטיפול באותו איזור.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

יש להשתמש בתכשיר תמיד לפי הוראות הרופא.

עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר

המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד.

המינון המקובל בדרך כלל הוא : שלוש פעמים בשבוע.

בכל טיפול יש לחפוף את הקרקפת פעמיים. יש לנער את הבקבוק היטב, ליטול כמות קצובה של שמפו לשיער, לרחוץ ולסבן את העור הנגוע באגיספור שמפו ולהמתין במשך 5 דקות לפני השטיפה. ודא שאתה מסבן היטב את העור עצמו ולא את השיער.
אין לעבור על המנה המומלצת.

משך הטיפול

משך שימוש מקסימלי 4 שבועות. אם לא חל שיפור במצבך יש לפנות לרופא שנית.

לשימוש חיצוני בלבד.

אין לבלוע.

יש לנער לפני השימוש.

יש למנוע מגע של התכשיר עם העיניים

יש להמנע משימוש משותף במגבות עם אנשים אחרים היות ויש חשש להעברת הזיהום הפטיירתי

אם נטלת מינון גבוה יותר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא אריזת התרופה איתך.

אם שכחת ליטול את התרופה אין ליטול מנה כפולה. קח את המנה הבאה בזמן הרגיל והיוועץ ברופא.

יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא.

גם אם חל שיפור במצב בריאותך, אין להפסיק הטיפול בתרופה ללא התייעצות עם הרופא

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק את התווית והמנה בכל פעם שהנך נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הנך זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש באגיספור שמפו עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. ייתכן ולא תסבול מאף אחת מהן.

כמו בשימוש בתרופות אחרות ישנם אנשים אלרגים לתרופה במידה ואתה אלרגי התגובה האלרגית תופיע מעט לאחר השימוש בתכשיר. אם אתה סובל מתגובה אלרגית הפסק מיד את השימוש ופנה לרופא או לטיפול רפואי.

תופעות לוואי אלרגיות הכוללות:

- גרד
- נפיחות בשפתיים פנים גרון ולשון
- קושי בבליעה או בנשימה
- חולשה סחרחורת עילפון
- בחילה

לאחר שימוש בתרופה ייתכן ותחוה את תופעות הלוואי הבאות:

- גירוי קל או צריבה
- אדמומיות
- קילוף

תופעות לוואי נוספות אפשריות:

- כאב
- פריחה
- יובש
- מראה עור רך או לח
- נפיחות, שלפוחיות, אורטיקריה

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה, או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא הוזכרה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או ע"י כניסה לקישור: <https://sideeffects.health.gov.il> בנוסף, ניתן לדווח לחברת פאדאגיס באמצעות הכתובת הבאה: Padagis.co.il

5. איך לאחסן את התרופה?

- מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ לשדה ראייתם והישג ידם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.

תנאי איחסון

- יש לאחסן במקום קריר מתחת ל 25°C .
- לאחר הפתיחה הראשונה ניתן להשתמש במשך 6 חודשים אך לא יאוחר מתאריך התפוגה.
- אחסן באריזה המקורית.

6. מידע נוסף

- נוסף על החומר הפעיל התרופה מכילה גם:
Sodium lauryl sulphate, sodium lauryl ether sulphate, ethyl alcohol, cocamido propylamine oxide, cocamide diethanolamine lactic acid, Perfume 199-95, purified water.
- כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:
בקבוק פלסטיק המכיל 100 מיליליטר אגיספור שמפו.
- שם היצרן ובעל הרישום: פאדאגיס ישראל פרמצבטיקה בע"מ רח' רקפת 1 שוהם.
- עלון זה נערך ב 04/2023 בהתאם להנחיות משרד הבריאות .
- מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות: 126-23-26745-00
- לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.

04.2023

