

עלון לצריכן לפי תקנות הרוקחים (תק Shirim) התשמ"ז – 1986

התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד

אודפסיTM **טבליות מצופות**

חומרים פעילים וכמותם ביחידת מינון:

אמטריציטאבין 200 מ"ג,
רילפיבירין הידרוקלוריד השווה ל-25 מ"ג רילפיבירין,
טנוfovיר אלפנאמید פומראט השווה ל-25 מ"ג טנוfovיר אלפנאמید.

emtricitabine 200 mg,

rilpivirine hydrochloride equivalent to 25 mg of rilpivirine,

tenofovir alafenamide fumarate equivalent to 25 mg of tenofovir alafenamide.

חומרים בלתי פעילים ואלרגניים בתכשיר – ראה סעיף 2 תחת "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה" וסעיף 6 "מידע נוספים".

קרא בעיון את העיון עד סוף בטרכם תשמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח. תרופה זו נרשמה לטיפול במחלתו. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מחלתם דומה.

1. למה מיועדת התרופה?

אודפסי מיועדת למוגרים ומתבגרים (בני 12 שנים ומעלה, השוקלים לפחות 35 ק"ג) לטיפול בזיהום וירוס ה-HIV-1 (Human Immunodeficiency Virus-1), ללא מוטציות ידועות הקשורות לעמידות הווירוס למעכבי רברס טרנסקריפטاز שאינם אנלוג של נוקלאוזידים (reverse transcriptase inhibitor – NNRTI – transcriptase inhibitor), טנוfovיר או אמטריציטאבין עם עומס נגיפי קטן או שווה ל- 100,000 עותקים של RNA HIV-1/mL ($\leq 100,000 \text{ HIV-1 RNA copies/mL}$).

אודפסי מכילה שלושה חומרים פעילים – אמטריציטאבין, רילפיבירין וטנוfovיר אלפנאמید – בטבלייה אחת.

כל אחד מהחומרים הפעילים הללו פוגע בפעולות אנזים (חלבון הנקרא "רברס טרנסקריפטاز") החינוי להתרבות וירוס ה-HIV.

אודפסי מורידה את כמות וירוס ה-HIV בגוף ובכך משפרת את המערכת החיסונית ומורידה את הסיכון להתקפות מחלות הקשורות לווירוס ה-HIV.

קובצת תרפואיית

- אמטריציטאבין, מעכבי נוקלאוזיד רברס טרנסקריפטاز (NRTI)
- רילפיבירין, מעכבי רברס טרנסקריפטاز אשר אינם נוקלאוזידים (NNRTI)
- טנוfovיר אלפנאמید, מעכבי נוקלאוטיד רברס טרנסקריפטاز (NtRTI)

2. לפניה השימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה אם:

- אתה רגיש (אלרגי) לחומרים הפעילים (אמטריציטאבין, רילפיבירין, טנוfovיר אלפנאמید) או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה. לרשותה המרכיבים הנוספים ראה סעיף 6 "מידע נוספים".
- אתה נוטל את אחת מהתרופות הבאות:

<ul style="list-style-type: none"> - קארבאמאזפין, אוקסקארבאמאזפין, פנובארביטאל ופניטואין (תרופות לטיפול באפילפסיה ולמניעת פרכויסים) - ריפאבטין, ריפאמפיצין וריפאפטנטין (טיפול בזיהומים חידקיים מסוימים כגון שחפת) - אומפריזול, דקסלאנסופריזול, לנסופריזול, רבפרازול, פאנטופראזול ואזומפרראזול (טיפול ומונעה של כיבי קיבה, צרבות ומחלת ריפלוקס [הছזר קיבתי-ושטי]) - דקסמטידון (קורטיקוסטרואיד המשמש לטיפול בדלקות ומדכא את מערכת החיסון) הן כאשר נלקח דרך הפה והן כאשר ניתן בזריקה (למעט טיפול חד פעמי) - תכשירים המכילים את הרכיב St. John's wort (<i>Hypericum perforatum</i>) (תכשיר צמחי שבו משתמשים במצב דיכאון וחרדה) <p>אם אתה נוטל אחת מהתרופות המוזכרות, אין לייטול אודפסי ויש לדוח על כך מיד לרופא המטפל.</p>

ازהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה
במהלך הטיפול באודפסי עליך להתמיד בהמשך מעקב רפואי אצל הרופא.
תרופה זו אינה מרפא את הזיהום בוירוס ה-**HIV**. במהלך הטיפול באודפסי יתכן שעדין יתפתחו זיהומים או תחליאות נלוות אחרות הקשורות לזיהום ב-**HIV**.

לפני הטיפול באודפסי, ספר לרופא :

- אם אתה סובל מבעיות בתפקוד הכלבי או סבלת בעבר ממחלה כבד, כולל הפטיטיס. חולמים עם מחלות כבד, כולל הפטיטיס קרוני מסוג B או C, המטופלים בתרופות אנטי רטרו-ויראליות, הם בעלי סיכון מוגבר לביעיות כבד חמורות שלולות להיות אף מסכנות חיים. אם אתה סובל מזיהום הפטיטיס B, הרופא ישකול בהירות את משטר הטיפול הטוב ביותר עבורך.
- אם אתה סובל מזיהום הפטיטיס B. בעיות כבד עלולות להחמיר לאחר הפסקת נטילת אודפסי. חשוב מאוד לא להפסיק את הטיפול מבלי להיוועץ ברופא (ראה סעיף 3 "כיצד תשתמש בתרופה?").
- אם אתה נוטל תרופות אחרות הגורמות לדופק לא סדייר העולול להיות מס肯 חיים (de torsades de pointes).
- אם הייתה לך מחלת כלות או אם בדיקות הראו בעיות בכליות. הרופא יפנה אותך לבדיקות דם בתחילת הטיפול באודפסי ובמהלכו, כדי לעקוב אחר פעילות הכליות.

בעת נטילת אודפסי

אחרי שהתחילה ליטול את אודפסי,שים לב לסימנים הבאים:

- **סימנים של דלקת או זיהום**
 - **כאב במפרקים, נוקשות או בעיות עצומות**
- ספר מיד לרופאך אם אתה מבחין באחד מהסימנים הללו. למידע נוסף ראה סעיף 4 "תופעות לוואי".
ישנה אפשרות שהיינו בעיות בכליות כאשר אודפסי נלקחת במשך תקופה ארוכה (ראה סעיף "ازהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה").

ילדים ומתבגרים

התרופה אינה מיועדת **ילדים מתחת לגיל 12, או-Calha השוקלים פחות מ-35 ק"ג.** לא נחקר השימוש בילדים ובמתבגרים מתחת לגיל 12 או השוקלים פחות מ-35 ק"ג.

אינטראקטיות/תגובהות בין תרופתיות

אם אתה לוקח או אם לך תרופה אחרת, כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח. אודפסי יכולה להגיב עם תרופות אחרות. כתוצאה לכך, הכמות של

אודפסי" או של התרופות האחרות בدم יכולה להיות מושפעת. זה עלול להפוך את פעולתן הראיה של התרופות שאתה נוטל או לגרום להחמרה תופעות לוואי. במקרים מסוימים, הרופא המתפל' יctrיך להתאים את מינון התropaה או לבודק את הרמות בדם.

תרופות שאסור ליטול יחד עם אודפסי:

- **קארבאמאזפין, אוקסאקארבאזפין, פובארביטאל ופנטואין** (תרופות לטיפול באפילפסיה ולמניעת פרכוסים)
 - **ריפאבטין, ריפאמפיצין וריפאנטין** (טיפול בziehomים חידקיים מסוימים כגון שחפת)
 - **אומפריזול, דקסלאנסופרזול, לנסופרזול, רבפרازול, פאנטופראזול ואוזומפרازול** (טיפול ומוניעה של כיבי קיבה, צרבות ומחלת ריפלווקס [האזור קיבתי-ושטי])
 - **דקסמטזון** (קורטיקוסטרואיד המשמש לטיפול בדלקות ומדכא את מערכת החיסון) הן כאשר נלקח דרך הפה והן כאשר ניתן בזריקה (למעט טיפול חד פעמי)
 - **תכשירים המכילים את הרכיב St. John's wort (*Hypericum perforatum*)** (תכשיר צמחי בו משתמשים במצבים דיכאון וחרדה)
- אם אתה נוטל אחת מהתרופות הנזכרות לעיל, אין ליטול אודפסי" ויש לדוח על כך מיד לרופא.

ספר לרופא אם אתה נוטל:

- **תרופות המשמשות לטיפול בziehomם HIV**
- **תרופות אחרות המכילות:**
 - טנופובייר אלפנאמיד
 - טנופובייר דיספורוקסיל
 - לאմיבודין
 - אדפובייר דיפיבוקסיל
- **אנטיביוטיקות המשמשות לטיפול בziehomים חידקיים המכילות:**
 - קלריתרומיצין
 - אריתרומיצין

תרופות אלו עלולות להעלות את הרמות של רילפיבירין וטנופובייר אלפנאמיד (המרכיבים הפעילים של אודפסי") בדם. הרופא ירשום לך תרופה חלופית.

- **תרופות אנטי פטריטיות המשמשות לטיפול בziehomים פטריטיים:**
 - קטוקונאצול
 - פלוקונאצול
 - איטראקונאצול
 - פוסאקונאצול
 - וורייקונאצול

תרופות אלו עלולות להעלות את הרמה של רילפיבירין וטנופובייר אלפנאמיד (המרכיבים הפעילים של אודפסי") בדם. הרופא ירשום לך תרופה חלופית.

- **תרופות לכיב קיבה, צרבת או ריפלווקס (האזור קיבתי-ושטי) כגון:**
 - נוגדי חומצה (אלומיניום/ מגנזיום הידרוקסיד או קלציום קרובונט)
 - **תרופות חוסmot H₂** (פומtidין, סימtidין, נזtidין או ראנטידין)

תרופות אלו עלולות להויריד את רמת הרילפיבירין (אחד המרכיבים הפעילים באודפסי") בדם. אם אתה נוטל אחת מהתרופות הללו הרופא ירשום לך תרופה אחרת או לחלוין ימליץ לך איך ומתי ליטול תרופה זו:

- **אם אתה נוטל נוגד חומצה, יש ליטול תרופה זו לפחות שעתים לפני או ארבע שעות אחרי נטילת אודפסי".**

- אם אתה נוטל תרופות מקבוצת תרופות חוסמות H_2 , יש ליטול תרופות אלו לפחות 12 שעות לפני או ארבע שעות אחרי נטילת אודפסי. תרופות חוסמות H_2 יכולות להילך רק פעם ביום אם אתה נוטל אודפסי. אין ליטול תרופות חוסמות H_2 פעמיים ביום. התיעץ עם הרופא המטפל לגבי משטר טיפול חלופי (ראה סעיף 3 "כיצד תשתמש בתרופה?").
- **ציקלוספורין**, תרופה המשמשת להורדת תגוננות המערכת החיסונית: תרופה זו עלולה להעלות את הרמה של רילפיבירין וטנופוביר אלפנאמיד (המרכיבים הפעילים של אודפסי) בدم. הרופא ירשום לך תרופה חלופית.
- **מתאדון**, תרופה המשמשת לטיפול בהתמכרות לאופיאטים. יתכן שהרופא יצטרך לשנות את המינון של מתאדון.
- **דיביגטן אטקסילאט**, תרופה המשמשת לטיפול בעיות לב, יתכן שהרופא יצטרך לנטר את רמות התרופה בדם.

ספר לרופא אם אתה נוטל אחת מהתרופות הללו. אין להפסיק את הטיפול מבל' להיעז ברופא.

שימוש בתרופה ומצוין
יש ליטול את התרופה יחד עם ארוכה.

הירין והנקה

אם את בהירין או מניקה, חשוב שתאת בהירין או מתכנתת הירין, יש להיעז ברופא לפני השימוש בתרופה.

יש לשימוש באמצעות מנעהיעלים במהלך נטילת אודפסי.
יש להיעז ברופא או ברוקח לפני נטילת כל תרופה בהירין.

אם נטילת אודפסי במהלך ההירין, יתכן שהרופא יורה על ביצוע בדיקות דם ובדיקות אבחנות אחרות על מנת לנטר את התפתחות העובר. בילדים שאימים נטלה מעכבי נוקלאוזיד רברס טרנסקריפטАЗ (NRT) במהלך ההירין, התועלת מהגנה מ-HIV עולה על הסיכון לתופעות לוואי.

אין להניך במהלך השימוש באודפסי. הסיבה היא שחלק מהמרכיבים הפעילים של התרופה עוברים דרך חלב אם.

הנקה אינה מומלצת בנשים החיות עם וירוס ה-HIV, לאחר וזיהום ה-HIV יכול לעבר לתינוק דרך חלב האם.

אם הינך מניקה או חושבת לגבי הנקה, **היעז עם הרופא בהקדם האפשרי**.

היגיה ושימוש במכונות

אין לנוהג או להפעיל מכונות מסוכנות בזמן השימוש בתרופה אם אתה מרגיש עיף, ישנו או מסוחר לאחר נטילת התרופה.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה
לקטוז – אודפסי מכילה כ-190 מ"ג לקטוז מונוהידרט בטבלייה. אם אתה בעל אי-סבילות ללקטוז, או אם נאמר לך כי אתה בעל אי-סבילות לeosרינים מסוימים, **היעז ברופא לפני תחילת נטילת אודפסי**.
נטרן – תרופה זו מכילה פחות מ-1 מילימול (23 מ"ג) נתן בכל טבלייה, לעומת זאת למעשה נחשבת לנ"טולת נתן".

3. כיצד תשתמש בתרופה?

יש לשימוש בתכשיר תמייד בהתאם להוראות הרופא.
עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם איןך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר.
המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד. המינון המקובל בדרך כלל הוא:

מבוגרים ומתבגרים בני 12 ומעלה, השוקלים לפחות 35 ק"ג: טבליה אחת פעמיים ביום יחד עם ארוחה.

אין לעבר על המנה המומלצת.

חשיבות ליטול אודפסי עם הארוחה על מנת לקבל את הרמות הנכונות של חומר פעיל בגוף. משקה תזונתי בלבד (לדוגמה משקה עשיר בחלבונים) אינו מחליף ארוחה.

מומלץ לא לכתוש, לחצות או ללעוס את הטבליה בשל הטעם המר.

אם אתה נוטל נוגד חומצה, כגון אלומיניום/מגנזיום הידרוקסיד או קלציום קרובונט, יש ליטול את נוגד החומצה לפחות שעתיים לפני או ארבע שעות אחריו נטילת אודפסי.

אם אתה נוטל תרופות מקבוצת תרופות חוסmot₂H, כגון פמותידין, סימטידין, ניזטידין או ראנטידין, יש ליטול תרופות אלו לפחות 12 שעות לפני או לפחות ארבע שעות אחריו נטילת אודפסי. תרופות חוסmot₂H יכולות להילך רק פעם ביום אם אתה נוטל אודפסי. אין ליטול תרופות חוסmot₂H פעמיים ביום. התיעץ עם הרופא המתפלל לגבי משטר טיפול חלופי.

אם אתה נמצא בטיפול בדיאליזה, יש ליטול את המינון היומי של אודפסי לאחר השלמת הדיאליזה.

אם נטלת אודפסי בминון גבוה מהנדרש

אם נטلت בטיעות מינון גבוה יותר אתה עלול להיות בסיכון מוגבר לחוות תופעות לוואי של התרופה (ראה סעיף 4 "תופעות לוואי").

אם נטلت מנת יתר או אם בטיעות בלבד מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא אריזת התרופה איתך. יש לשמור או ללקח את אריזת הטబליות איתך על מנת לתאר במדויק מה נטلت.

אם שכחת ליטול אודפסי

חשוב מאוד שלא תשכח ליטול את מנת האודפסי.

אם מנה נשכח:

- אם נזכרת תוך 12 שעות ממועד הנטילה הרגיל של אודפסי,** יש ליטול אודפסי בהקדם האפשרי. תמיד יש ליטול אודפסי עם ארוחה. לאחר מכן יש ליטול את המנה הבאה כרגיל לפחות המועד המתוכן.

- אם נזכרת לאחר 12 שעות ויותר ממועד הנטילה הרגיל של אודפסי,** אל תיטול את המנה שנשכח. המtanן לממועד הנטילה הרגיל הבא, ואז קח אודפסי עם ארוחה.

אם הקאת פחות מ-4 שעות ממועד לكيית אודפסי, קח טבליה נוספת אחרית עם ארוחה. **אם הקאת יותר מ-4 שעות ממועד לキーית אודפסי,** אין צורך לנקח טבליה נוספת. יש לנקח את הטבליה הבאה במועד הרגיל המתוכן.

יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא.

אין להפסיק ליטול אודפסי

גם אם חל שיפור במצב בריאותך, אין להפסיק את הטיפול בתרופה ללא התיעיצות עם הרופא. הפסקת הטיפול באודפסי יכולה להשפיע באופן חמור על תגובתך לטיפול עתידי. אם הטיפול באודפסי הופסק מסיבה כלשהי, התיעץ עם הרופא לפני נטילה מחודשת של אודפסי.

כאשר מלאי האודפסי יש לך מתחילה להיגמר, דאג לרכוש מלאי נוסף של התרופה.

הדבר חשוב ביותר כי אם אתה מפסיק את הטיפול בתרופה, אפילו זמן קצר, כמות הוירוס בגוף עלולה לעלות, ויתכן שהיא קשה יותר לטפל במקרים.

אם אתה סובל הן מזיהום HIV והן מזיהום הפטיטיס מסוג B, חשוב ביותר כי לא תפסיק את הטיפול באודפסי' מבל' להתייעץ תחילת עם הרופא. יתכן שתידרש לבצע בדיקות דם למשך מספר חודשים מתום הטיפול. בחולים מסוימים עם מחלת כבד מתקדמת או שחמת (צירוזיס), הפסקת הטיפול אינה מומלצת שכן זה יכול להוביל להחמרה מצב הפטיטיס עד כדי סכנת חיים.

דוח לרופא המטפל באופן מיידי לגבי תסמים חדשים או חריגים עם סיום הטיפול באודפסי', במיוחד לגבי תסמים הקשורים למחלת הפטיטיס B.

אין ליתול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה **בכל פעע** שאתה נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם אתה **זקוק להם**.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, **היוועץ ברופא או ברוקח**.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש באודפסי' עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תibalל למקרא רשימת תופעות הלואוי. יתכן שלא תסבול אפילו אחת מהן.

תופעות לוואי אפשריות – יש לדוח מיידית לרופא:

- **סימנים כלשהם לדלקת או לziehom.** בחולים מסוימים עם זיהום HIV מתקדם (איידס) והיסטוריה של ziehomים אופורטוניסטיים (ziehomים המתרחשים בקרב אנשים עם מערכת החיסונית חלהה), סימנים ותסמינים של דלקת ziehomים קודמים יכולים להתרחש מיד לאחר תחילת הטיפול בziehom ה-HIV. מקובל לחסוב כי תסמים אלו הם בעקבות השיפור בתגובה החיסונית של הגוף, המאפשר לגורף להילחם בziehomים שאפשר שקיימים ללא תסמים נראים לעין.
- **הפרעות אוטואימוניות,** כאשר המערכת החיסונית תוקפת רקמות הגוף בראיות, עלולות להופיע לאחר תחילת נתילת תרופות לטיפול ב-HIV. הפרעות אוטואימוניות יכולות להופיע חודשים רבים לאחר תחילת הטיפול. שים לב לתסמים של ziehom או תסמים אחרים כגון:
 - חולשת שרירים
 - חולשה המתיחה בידיים וברגליים ומתקדמת מעלה לאזור מרכז הגוף
 - דפיקות לב, רעד או היפראקטיביות

אם אתה מבחין בתסמים אלו או תסמים כלשהם של דלקת או של ziehom, דוח לרופא המטפל באופן מיידי.

תופעות לוואי שכיחות מאוד (very common) – תופעות שימושיות ביותר ביותר משתמש אחד מעשרה:

- קשיים בשינה (איןסומניה)
- כאב ראש
- סחרחות
- ב침לה

בדיקות מעבדה ניתן להבחין גם ב:

- עליה בرمות הצלסטרול / או האנדזים פנקריאטיך עמילאץ (אנזים המסייע בפעולת העיכול) בدم
- עליה בرمות אנזימי הכלב בדם

תופעות לוואי שכיחות (common) – תופעות שימושיות ב-10-1 מ/users מ-100:

- ירידת בתיאבן
- דיכאון
- חולומות לא רגילים
- הפרעות בשינה
- מצב רוח דיכאוני

- ישונניות
- עייפות
- כאב בטן או חוסר נוחות בטן
- הקאות
- הריגשת נפיחות
- פה יבש
- גזים (בטן)
- שלשול
- פריחה

בדיקות מעבדה ניתנים להבחן גם ב:

- ספירה נמוכה של תא דם לבנים (ירידה בספירה של תא דם לבנים יכולה לגרום לנטייה גדולה יותר לחזירים)
- ספירה נמוכה של טסיות (תא דם המשתתפים בתהיליך קריישט הדם)
- ירידת בהמוגלובין בדם
- עלייה בחומצות השומן (טריגליקידים), בילירוביין או אנדמיים בשם ליפאצ'רים בדם

תופעות לוואי שאין שכיחות (uncommon) – תופעות שמצוינות ב-10-1 משמשים מתוך 1,000:

- סימנים או תסמינים של דלקת או זיהום
- ספירה נמוכה של תא דם אדומיים (אנמיה)
- תגובה עורית חמורה כולל פריחה המלווה בחום, נפיחות ובעיות כבד
- בעיות עיכול הגורמות לחוסר נוחות לאחר הארוחות
- התנפחות של הפנים, השפתיים, הלשון או הגרון
- גוד (פרוריטיס)
- חרלה (אורטיקריה)
- כאבי מפרקים

השפעות נוספות לצפות במהלך טיפול ב-VIH:

توفעות לוואי שכיחות אינה ידועה (توقفת שכיחותן טרם נקבעה):

- בעיות עצומות – חולמים מסוימים הנוטלים שלוב של תרופות אנטרטרו-יראליות כמו אודפסי' עלולים לפתח מחלת עצמתה הנקראת "نمק העצם – osteonecrosis" (מחלה שבה רקמת העצם מתה עקב אובדן של אספקת דם לעצם). נטילת תרופה מסווג זה במשך זמן ממושך, נטילת קורטיקואסטרואידים, צריכת אלכוהול, מערכת חיסונית חלה מאוד ועוד מושך עלולים להיות חלק מגורמי הסיכון הרבים להתפתחות מחלת זו.
- סימנים של נמק העצם:
 - נזקשות מפרקים
 - כאבים במפרקים (במיוחד במפרק הירך, בברך ובכתף)
 - קשיי תנועה

אם אתה מבחין באחד מארגוני אלה פנה לרופא המטופל.

במהלך טיפול ב-VIH תיתכן עלייה במשקל ועליה ברמת הליפידים והגלוקוז בדם. הדבר קשור בחלוקת לשיקום הבリアות ושגרת החים, ובמקרה של עלייה בליפידים לעתים קשור לתרופות עצמן הניטלות לשם טיפול ב-VIH. הרופא יבודק את השינויים הללו.

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צינה בעלון, עיר להתייעץ עם הרופא.

ניתן לדוח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לוחצת על הקישור "דיווח על תופעות לוואי"

עלקב טיפול רפואי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov) המפנה לטופס המukan לדיווח על תופעות לוואי או על ידי כניסה לקישור: <https://sideeffects.health.gov.il>

5. איך לאחסן את התרופה?

מנע הרעליה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטוחן ראייתם של ילדים /או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעליה. אל תגרום להקה לא הוראה מפורשת מהרופא. אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.

אין לאחסן בטמפרטורה העולה על 30°C.

לאחר הפתיחה הראשונה של הבקבוק, יש להשתמש תוך 90 ימים. יש לאחסן את הטבליות באריזה המקורי על מנת להגן מלחות. יש להקפיד לשמור על הבקבוק סגור היטב. אין להשליך את התרופות לפח האשפה הרגיל. התיעץ עם הרוקח על הדרך להשליך תרופות שאין בהן עוד צורך.

6. מידע נוסף

נוסף על המרכיבים הפעילים התרופה מכילה גם:
LIBET TABLET:

lactose as monohydrate, microcrystalline cellulose, croscarmellose sodium, magnesium stearate, povidone, polysorbate 20.

ציפוי הtablity:

polyvinyl alcohol, titanium dioxide, macrogol, talc, iron oxide black.

כיצד נראה התרופה ומה תוכן האריזה:

אודפסי הינה טבלייה מצופה בזכבב אפור בצורת כמוסה, ובה מוטבע הכיתוב "ISI GSI" בצד אחד ו-"255" בצד השני.

הטבליות מגיימות בבקבוק פלסטיק המכיל 30 טבליות.

כל בקבוק מכיל ג'ל סיליקה סופח לחות שיש לשאיר בבקבוק על מנת להגן על הטבליות. סופח הלחות מגיע בשקיק או מכל נפרד. אין לבלווע את השקיק/מכל.

היצמן: יאנסן סילג ס.פ.א., ויה ס. יאנסן 04100, בורגו ס. מישל, לטינה, איטליה.

בעל הרישום: ג'י-ס' הלת' קר בע"מ, קיבוץ שפים 6099000, ישראל.

נערך במאי 2023 בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות: 162-38-35353

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה עלון זה נכתב בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.