

## أجيسن في 0.2 غرام أقراص مهبلية

**أقراص مهبلية (للاستعمال المهبل)**

كلوتريمازول 200 مغ (Clotrimazole 200mg)

المواد الفعالة والمسارجية (المسببة للحساسية)

في المستحضر: أنظري للبند 6 "معلومات إضافية"

في النشرة.

اقرني الثترة تبتعن حتى نهايتها قبل استعمال

للدواء إذا توفرت لديك أسلطة إضافية، توجهي للطبيب أو الصيدلي.

عليك استعمال المستحضر بموجب التعليمات في بدء

الجرعة من هذه النشرة.

استشيري الصيدلي إذا كنت تحتاجين لمعلومات إضافية.

عليك توجه للطبيب في حال تفاقمت اعراض المرض أو أنها لم تتحسن بعد 7 أيام.

### 1. لأي غرض مخصص الدواء؟

اجيسن في 0.2 غرام أقراص مهبلية مخصوص لعلاج

التهابات فرجية في المهبل الناتجة بالأخص من قبل

سلالات البكتيريا (كينديا).

لعلاج التهابات في المهبل الناتجة عن المشعرات

وكائنات ضوضوة دقيقة متساءلة للكثيريزارول.

**الفصيلة العلاجية:** مضادات للفطريات من فصيلة

الأرومات.

الفطري المهبلي هو ثوابث شائع الذي تعانى منه

النساء في مرحلة معينة من الحياة ولا ينتفع من جراء

عدم الحفاظ على النظافة الشخصية، المسبب للفطري

المهبل هو فطر يسمى بكتيريات (كينديا) الذي يعيش

في المهبل وفي أعضاء مختلفة بدون أن يتسبّب أي

ضرر.

بالرغم من ذلك، التوازن الطبيعي الذي يعيشه

تحت السيطرة قد يتغير بعد عوامل مثل تغييرات

هرمونية (الدورة الشهرية)، أقراص ملعون، حمل،

نهائية الحيض، صحة متقدمة، تناول دواء موصى به،

صواب مطرقة، إضافات لحوض الاستحمام والملابس

ضيقة.

تغير في توازن الحمض الطيفي (pH) قد يؤدي

إلى تزايد نمو الفطري وعدها قد يتضرر لاتهاب، هذا

قد يتجلّ بالآعراض التالية: شعور بحرقان دائم / أو

حكة حول المهبل والفرج، احمرار، انتفاخ وآلم في

المهبل، قد تتأثرين من كل الأعراض التي ذكرت قبل

واحد منها فقط.

### 2. قبل استعمال الدواء

لا يجوز استعمال أجيسن في 0.2 غرام أقراص

مهبلية إذا: كنت مسابة (أليك أرجيم) المادة

الفعالة (كلوتريمازول) أو لأحد المركيبات الإضافية

التي يحتويها الدواء (أنظري للبند 6 "معلومات إضافية").

تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال أجيسن في 0.2

غرام أقراص مهبلية:

• استعمل المستحضر فقط إذا شخص لديك طبيبك في

الماضي بذلك تأمين من تلوث طفري في المهبل.

قبل العلاج باجيسن في 0.2 غرام أقراص مهبلية،

أخبر طبيبك إذا:

• لم تكنى متقدمة بذلك تأمين من فطر المهبل أو أنها

المراة الأولى التي تعانين من هذه الأعراض.

إذا نسيت استعمال هذا المستحضر في الوقت

المطلوب يجب استعمال الجرعة حال عدم تذكره واستمرار

بيبيلاج كالعتاد.

إذا نسيت تناول الأدوية بعد فحصه في كل مرة

والجرعة في كل مرة تناولين فيها دواء، ضعي

النظارات الطبية إذا كنت حادة لها.

إذا توفرت لديك أسلطة إضافية بخصوص استعمال

الدواء، استشيري الطبيب أو الصيدلي.

إذا نسيت استعمال هذا المستحضر في المكان

الداخلي بمقدار عيقاً قدر الإمكان داخل

المهبل طالما لا تشعررين بعد راحة (أسهل طريقة

للتليام بذلك هي من خلال الاستفادة على الظاهر مع

ثني الكرتين باتجاه الأعلى). ثني المهبل حتى

يتوقف على المكبس حتى يتوقف

3. أخذ الموصى برفق عيقاً قدر الإمكان داخل

المهبل طالما لا تشعرين بعد راحة (أسهل طريقة

(أليك ماغن) مع الصابون وفقيه يد.

بعد إنهاء العلاج اغسلي المهبل بمكان آمن، بعيداً

عن متناول يد الأطفال. لا يجوز رمي الموصى في المرحاض.

• بما أن الموصى يذوب في المهبل، من المفضل

استعمال فوطه فوجة لأنها من الشائعة زوجة إفرادات

بيضاء بوزيرة عالية بعد استعمال المستحضر. هذا

بدل على أن العلاج لم ينجح، لكن إذا كنت تلاحظ

وجود قطع من القرص التي لم تنت، توجهي إلى

الطبيب أو الصيدلي لأنها يحصل على العلاج لم يفعل

كميني.

• لمنع عودة الفطري في المستقبل: اليسي ملاس داخلية

مصنوعة من القطن وغير سميكة، وبدلي الملابس

بأوقات متقاربة، استحمي بالتزامن من الشائعة زوجة إفرادات

الفضلات في المرحاض، يجب أن تكون من الأتمام

باتجاه الخلف. تجنبي ارتداء ملاس ضيق وجوارب

مصنوعة من النيلون. تجنبي الاستحمام بسوابن

معطرة أو استعمال مزيجات العرق بمنطقة المهبل، لا

تقركي المنطقة بفقرة بواسطة ساقنة الاستحمام، يجب

الانتباع عن حوض الاستحمام الساخن مع الزبادي

المعطرة.

إذا استعملت عن طريق الخطأ جرعة أعلى، إذا بلغ

طفلي أو أي شخص بالخطأ من الدواء، توجهي فوراً

للطبيب أو لفترة الطوارئ في المستشفى وأحضر

معك عبوة الدواء.

### 3. كيف تستعملين الدواء؟

عليك التحقق من الطبيب او الصيدلي اذا لم تكوني واثقة بشأن الجرعة وطريقة العلاج بالمستحضر.

الجرعة المتباعدة عادة هي:

قرص واحد للداخل في المهبل في المساء قبل النوم لمدة 3 ليالى متتالية (أنظر إلى البند "طريقة الاستعمال").

لا ينبغي تجاوز الجرعة الموصى بها.

فترة العلاج:

• من المفترض أن تختفي أعراض الفطر خلال 3 أيام من بدء العلاج. إذا لم تطرأ تحسين خلال 7 أيام، يجب التوجه للطبيب.

إذا عانت العدوى بعد 7 أيام، يمكن استعمال علاج واحد إضافي، ولكن إذا كانت قد عانت من عدوى الطفيلي أكثر من مرتين خلال الاشهر الستة الأخيرة، عليك التوجه للطبيب.

كيفية التناول:

• لا يجوز إدخال اللقح أو بلعه!

• لا لاستعمال داخل المهبل فقط.

طريقة استعمال المستحضر- تعليمات عامه:

إذا وصف لك أجيستن في 0.2 غرام أقراص مهبلية من قبل الطبيب، اتبع تعليماته.

إذا صلحت على المستحضر بدون وصفة طبيب عليك استعمال المستحضر حسب ما هو موصى به في هذا البند، الموصى المترافق المستحضر أعدة المعاونة من عدوى بالداخل الفرج، حوصلات أو جروح في المهبل.

مفضل قبل النوم لمدة ثالث ليل متتالية، يجب عمل بولين بالصابون والادخال في الماء الدافئ قبل قليل.

إذا توقفت العدوى من العبوة، ومرة أخرى بعد استعمال الموصى هل يجب إدخال القرص في الماء الدافئ من العبوة؟

إذا كان العدوى متعددة، يجب إدخال القرص في الماء الدافئ من العبوة، ومرة أخرى بعد استعمال الموصى.

إذا توقفت العدوى من العبوة، ومرة أخرى بعد استعمال الموصى.

إذا توقفت العدوى من العبوة، ومرة أخرى بعد استعمال الموصى.

إذا توقفت العدوى من العبوة، ومرة أخرى بعد استعمال الموصى.

إذا توقفت العدوى من العبوة، ومرة أخرى بعد استعمال الموصى.

إذا توقفت العدوى من العبوة، ومرة أخرى بعد استعمال الموصى.

إذا توقفت العدوى من العبوة، ومرة أخرى بعد استعمال الموصى.

إذا توقفت العدوى من العبوة، ومرة أخرى بعد استعمال الموصى.

إذا توقفت العدوى من العبوة، ومرة أخرى بعد استعمال الموصى.

إذا توقفت العدوى من العبوة، ومرة أخرى بعد استعمال الموصى.

إذا توقفت العدوى من العبوة، ومرة أخرى بعد استعمال الموصى.

إذا توقفت العدوى من العبوة، ومرة أخرى بعد استعمال الموصى.

إذا توقفت العدوى من العبوة، ومرة أخرى بعد استعمال الموصى.

إذا توقفت العدوى من العبوة، ومرة أخرى بعد استعمال الموصى.

إذا توقفت العدوى من العبوة، ومرة أخرى بعد استعمال الموصى.

إذا توقفت العدوى من العبوة، ومرة أخرى بعد استعمال الموصى.

إذا توقفت العدوى من العبوة، ومرة أخرى بعد استعمال الموصى.

إذا توقفت العدوى من العبوة، ومرة أخرى بعد استعمال الموصى.

إذا توقفت العدوى من العبوة، ومرة أخرى بعد استعمال الموصى.

إذا توقفت العدوى من العبوة، ومرة أخرى بعد استعمال الموصى.

إذا توقفت العدوى من العبوة، ومرة أخرى بعد استعمال الموصى.

إذا توقفت العدوى من العبوة، ومرة أخرى بعد استعمال الموصى.

إذا توقفت العدوى من العبوة، ومرة أخرى بعد استعمال الموصى.

إذا توقفت العدوى من العبوة، ومرة أخرى بعد استعمال الموصى.

إذا توقفت العدوى من العبوة، ومرة أخرى بعد استعمال الموصى.

إذا توقفت العدوى من العبوة، ومرة أخرى بعد استعمال الموصى.

إذا توقفت العدوى من العبوة، ومرة أخرى بعد استعمال الموصى.

إذا توقفت العدوى من العبوة، ومرة أخرى بعد استعمال الموصى.

إذا توقفت العدوى من العبوة، ومرة أخرى بعد استعمال الموصى.

إذا توقفت العدوى من العبوة، ومرة أخرى بعد استعمال الموصى.

إذا توقفت العدوى من العبوة، ومرة أخرى بعد استعمال الموصى.

إذا توقفت العدوى من العبوة، ومرة أخرى بعد استعمال الموصى.

إذا توقفت العدوى من العبوة، ومرة أخرى بعد استعمال الموصى.

إذا توقفت العدوى من العبوة، ومرة أخرى بعد استعمال الموصى.

إذا توقفت العدوى من العبوة، ومرة أخرى بعد استعمال الموصى.

إذا توقفت العدوى من العبوة، ومرة أخرى بعد استعمال الموصى.

إذا توقفت العدوى من العبوة، ومرة أخرى بعد استعمال الموصى.

إذا توقفت العدوى من العبوة، ومرة أخرى بعد استعمال الموصى.

إذا توقفت العدوى من العبوة، ومرة أخرى بعد استعمال الموصى.

إذا توقفت العدوى من العبوة، ومرة أخرى بعد استعمال الموصى.

إذا توقفت العدوى من العبوة، ومرة أخرى بعد استعمال الموصى.

إذا توقفت العدوى من العبوة، ومرة أخرى بعد استعمال الموصى.

إذا توقفت العدوى من العبوة، ومرة أخرى بعد استعمال الموصى.

إذا توقفت العدوى من العبوة، ومرة أخرى بعد استعمال الموصى.

إذا توقفت العدوى من العبوة، ومرة أخرى بعد استعمال الموصى.

إذا توقفت العدوى من العبوة، ومرة أخرى بعد استعمال الموصى.

إذا توقفت العدوى من العبوة، ومرة أخرى بعد استعمال الموصى.

إذا توقفت العدوى من العبوة، ومرة أخرى بعد استعمال الموصى.

إذا توقفت العدوى من العبوة، ومرة أخرى بعد استعمال الموصى.

إذا توقفت العدوى من العبوة، ومرة أخرى بعد استعمال الموصى.

إذا توقفت العدوى من العبوة، ومرة أخرى بعد استعمال الموصى.

إذا توقفت العدوى من العبوة، ومرة أخرى بعد استعمال الموصى.

إذا توقفت العدوى من العبوة، ومرة أخرى بعد استعمال الموصى.

إذا توقفت العدوى من العبوة، ومرة أخرى بعد استعمال الموصى.

إذا توقفت العدوى من العبوة، ومرة أخرى بعد استعمال الموصى.

إذا توقفت العدوى من العبوة، ومرة أخرى بعد استعمال الموصى.

إذا توقفت العدوى من العبوة، ومرة أخرى بعد استعمال الموصى.

إذا توقفت العدوى من العبوة، ومرة أخرى بعد استعمال الموصى.

إذا توقفت العدوى من العبوة، ومرة أخرى بعد استعمال الموصى.

إذا توقفت العدوى من العبوة، ومرة أخرى بعد استعمال الموصى.

إذا توقفت العدوى من العبوة، ومرة أخرى بعد استعمال الموصى.

إذا توقفت العدوى من العبوة، ومرة أخرى بعد استعمال الموصى.

إذا توقفت العدوى من العبوة، ومرة أخرى بعد استعمال الموصى.

إذا توقفت العدوى من العبوة، ومرة أخرى بعد استعمال الموصى.

إذا توقفت العدوى من العبوة، ومرة أخرى بعد استعمال الموصى.

إذا توقفت العدوى من العبوة، ومرة أخرى بعد استعمال الموصى.

إذا توقفت العدوى من العبوة، ومرة أخرى بعد استعمال الموصى.

إذا توقفت العدوى من العبوة، ومرة أخرى بعد استعمال الموصى.

إذا توقفت العدوى من العبوة، ومرة أخرى بعد استعمال الموصى.

إذا توقفت العدوى من العبوة، ومرة أخرى بعد استعمال الموصى.

إذا توقفت العدوى من العبوة، ومرة أخرى بعد استعمال الموصى.

إذا توقفت العدوى من العبوة، ومرة أخرى بعد استعمال الموصى.

إذا توقفت العدوى من العبوة، ومرة أخرى بعد استعمال الموصى.

إذا توقفت العدوى من العبوة، ومرة أخرى بعد استعمال الموصى.

إذا توقفت العدوى من العبوة، ومرة أخرى بعد استعمال الموصى.

إذا توقفت العدوى من العبوة، ومرة أخرى بعد استعمال الموصى.

إذا توقفت العدوى من العبوة، ومرة أخرى بعد استعمال الموصى.

إذا توقفت العدوى من العبوة، ومرة أخرى بعد استعمال الموصى.

إذا توقفت العدوى من العبوة، ومرة أخرى بعد استعمال الموصى.

إذا توقفت العدوى من العبوة، ومرة أخرى بعد استعمال الموصى.

إذا توقفت العدوى من العبوة، ومرة أخرى بعد استعمال الموصى.

إذا توقفت العدوى من العبوة، ومرة أخرى بعد استعمال الموصى.

إذا توقفت العدوى من العبوة، ومرة أخرى بعد استعمال الموصى.

إذا توقفت العدوى من العبوة، ومرة أخرى بعد استعمال الموصى.

إذا توقفت العدوى من العبوة، ومرة أخرى بعد استعمال الموصى.

إذا توقفت العدوى من العبوة، ومرة أخرى بعد استعمال الموصى.

إذا توقفت العدوى من العبوة، ومرة أخرى بعد استعمال الموصى.

إذا توقفت العدوى من العبوة، ومرة أخرى بعد استعمال الموصى.

إذا توقفت العدوى من العبوة، ومرة أخرى بعد استعمال الموصى.

إذا توقفت العدوى من العبوة، ومرة أخرى بعد استعمال الموصى.

إذا توقفت العدوى من العبوة، ومرة أخرى بعد استعمال الموصى.

إذا توقفت العدوى من العبوة، ومرة أخرى بعد استعمال الموصى.

إذا توقفت العدوى من العبوة، ومرة أخرى بعد استعمال الموصى.

إذا توقفت العدوى من العبوة، ومرة أخرى بعد استعمال الموصى.

إذا توقفت العدوى من العبوة، ومرة أخرى بعد استعمال الموصى.

إذا توقفت العدوى من العبوة، ومرة أخرى بعد استعمال الموصى.

إذا توقفت العدوى من العبوة، ومرة أخرى بعد استعمال الموصى.

إذا توقفت العدوى من العبوة، ومرة أخرى بعد استعمال الموصى.

إذا توقفت العدوى من العبوة، ومرة أخرى بعد استعمال الموصى.

إذا توقفت العدوى من العبوة، ومرة أخرى بعد استعمال الموصى.

إذا توقفت العدوى من العبوة، ومرة أخرى بعد استعمال الموصى.

إذا توقفت العدوى من العبوة، ومرة أخرى بعد استعمال الموصى.

إذا توقفت العدوى من العبوة، ومرة أخرى بعد استعمال الموصى.

إذا توقفت العدوى من العبوة، ومرة أخرى بعد استعمال الموصى.

إذا توقفت العدوى من العبوة، ومرة أخرى بعد استعمال الموصى.

إذا توقفت العدوى من العبوة، ومرة أخرى بعد استعمال الموصى.

إذا توقفت العدوى من العبوة، ومرة أخرى بعد استعمال الموصى.

إذا توقفت العدوى من العبوة، ومرة أخرى بعد استعمال الموصى.

إذا توقفت العدوى من العبوة، ومرة أخرى بعد استعمال الموصى.

إذا توقفت العدوى من العبوة، ومرة أخرى بعد استعمال الموصى.

إذا توقفت العدوى من العبوة، ومرة أخرى بعد استعمال الموصى.

إذا توقفت العدوى من العبوة، ومرة أخرى بعد استعمال الموصى.

إذا توقفت العدوى من العبوة، ومرة أخرى بعد استعمال الموصى.

إذا توقفت العدوى من العبوة، ومرة أخرى بعد استعمال الموصى.

إذا توقفت العدوى من العبوة، ومرة أخرى بعد استعمال الموصى.

إذا توقفت العدوى من العبوة، ومرة أخرى بعد استعمال الموصى.

إذا توقفت العدوى من العبوة، ومرة أخرى بعد استعمال الموصى.

إذا توقفت العدوى من العبوة، ومرة أخرى بعد استعمال الموصى.