

سيتار پلوس 50 / 50

أقراص مطلية

يحتوي كل قرص على:

- 50 mg Sitagliptin (as hydrochloride)· سيتاجليبتين (ك-هيدروكلوريد)
- 50 ملغ
- 500 mg Metformin Hydrochloride· ميتفورمين هيدروكلوريد
- 500 ملغ

سيتار پلوس 850 / 50

أقراص مطلية

يحتوي كل قرص على:

- 50 mg Sitagliptin (as hydrochloride)· سيتاجليبتين (ك-هيدروكلوريد)
- 50 ملغ
- 850 mg Metformin Hydrochloride· ميتفورمين هيدروكلوريد
- 850 ملغ

سيتار پلوس 1000 / 50

أقراص مطلية

يحتوي كل قرص على:

- 50 mg Sitagliptin (as hydrochloride)· سيتاجليبتين (ك-هيدروكلوريد)
- 50 ملغ
- 1000 mg Metformin Hydrochloride· ميتفورمين هيدروكلوريد
- 1000 ملغ

لقائمة المواد غير الفعّالة ومولدات الحساسية في المستحضر يجب التوجه للفقرة 6 "معلومات إضافية". انظر أيضاً البند 2.7 "معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء".

اقرأ هذه النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل إستعمالك للدواء.

- تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن سيتار پلوس. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي.
- وُصف هذا الدواء للعلاج من أكلك. لا تعطيه للأخرين. فهو قد يضرهم حتى ولو بدا لك أن حالتهم الطبية مشابهة لحالتك.
- هذا الدواء غير مخصص للإعطاء لدى الأطفال دون عمر 18 سنة.

1) لأي غرض مُخصص سيتار پلوس؟

1.1 ما هو سيتار پلوس؟

الفصيلة العلاجية: سيتاجليبتين: مثبط الإنزيم DPP-4. ميتفورمين: بيغوانيد.

1.2 لأي غرض يُستعمل سيتار پلوس؟

سيتار پلوس هو قرص يحتوي على دوائين ملزمين بوصفة طبيب، سيتاجليبتين وميتفورمين، اللذين يخفضان السكر في الدم. سيتاجليبتين، المُتمم إلى فصيلة الأدوية المسماة مثبطات DPP-4 (dipeptidyl peptidase-4 inhibitors)، وميتفورمين، الذي ينتمي إلى فصيلة البيغوانيدات، حيث يعملان معاً من أجل السيطرة على نسب السكر في الدم لدى مرضى السكري من نوع 2، اللذين يناسبهم هذا الدمج. **سيتار پلوس** بمشاركة حمية موصى بها وبرنامج رياضة بدنية، مخصص لخفض نسب السكر في الدم لدى مرضى السكري من نوع 2.

2) قبل إستعمال سيتار پلوس

2.1 لا يجوز إستعمال سيتار پلوس إذا:

- وُجد لديك سكري من نوع 1.
- وُجد لديك إنخفاض في وظيفة الكلى بشكل خطير (سيحدد طبيبك ما هو مستوى الضرر في وظيفة الكلى لديك).
- وُجد لديك حمض كيتوني سكري (نسب متزايدة من الكيتونات في دمك أو في بولك: إختلاط للسكري الذي يشمل نسب مرتفعة من السكر في الدم، فقدان سريع للوزن، غثيان أو تقيؤات).
- كنت حساساً لكل واحد من المركبات في **سيتار پلوس** (انظر الفقرة 6 "معلومات إضافية" لقائمة المركبات الكاملة في **سيتار پلوس**). أعراض رد الفعل التحسسي الخطير لـ **سيتار پلوس** قد تشمل: طفح، بقع بارزة حمراء على جلدك (شرى) أو إنتفاخ الوجه، الشفتين، اللسان والحنجرة الذي قد يؤدي إلى صعوبة في التنفس أو في البلع.

2.2 تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال سيتار پلوس

قبل بدء العلاج بـ سيتار پلوس، إحكِ لطبيبك عن جميع مشاكلك الطبية، بما في ذلك إذا:

- يوجد لديك حالياً أو وُجد لديك في الماضي التهاب البنكرياس (pancreatitis). في حال كان لديك التهاب البنكرياس في الماضي، من غير المعروف أن يكون لديك إحتمال أكبر للإصابة بالتهاب البنكرياس أثناء تناول **سيتار پلوس** (انظر الفقرة 4 "الأعراض الجانبية").
- وُجدت لديك مشاكل في الكلية.
- وُجدت لديك مشاكل في الكبد.
- يوجد لديك حالياً أو كان لديك حصى في كيس المرارة.
- وُجدت لديك نسب مرتفعة من الشحوم الثلاثية في الدم.
- وُجدت لديك قصور في القلب.
- كنت تشرب الكحول في فترات متقاربة جداً، أو تشرب الكثير من الكحول خلال فترة زمنية قصيرة. إذا كنت حالياً أو كنت في السابق مدمناً على الكحول.
- كنت مقدماً على تلقي حقنة ملوثة أو مواد ظليلة من أجل التصوير بالأشعة السينية. من الجائز أن تكون هناك حاجة للتوقف عن تناول **سيتار پلوس** لفترة قصيرة. استشر طبيبك بخصوص متى عليك التوقف عن تناول **سيتار پلوس** ومتى عليك البدء بتناول **سيتار پلوس** مجدداً. (انظر الفقرة 4 "الأعراض الجانبية").
- وُجدت لديك نسب منخفضة من فيتامين B₁₂ في الدم.
- كنت حاملاً أو تخططين للحمل (انظري للبند 2.6 "الحمل، الإرضاع والخصوبة").
- كنت مرضعة أو تخططين للإرضاع (انظري للبند 2.6 "الحمل، الإرضاع والخصوبة").
- كنت امرأة لم تجتز سن اليأس (قبل فترة سن اليأس) وليس لديها طمث منتظم أو على الإطلاق (انظري للبند 2.6 "الحمل، الإرضاع والخصوبة"). توقف عن تناول **سيتار پلوس** واتصل بطبيبك على الفور إذا كان لديك ألم

شديد لا يزول في غضون البطن لديك. من الجائز أن تشعر بالألم ينتقل من بطنك حتى ظهرك. قد يظهر الألم مع أو دون تقيؤ. قد تكون هذه أعراض التهاب في البنكرياس.

2.3 الفحوص والمتابعة

إنفحص السكر لديك في الدم كما أمرك الطبيب.

سوف يقوم طبيبك بمراقبة السكري لديك من خلال فحوصات دم منتظمة، والتي تشمل فحص نسب السكر لديك في الدم والهيوموجلوبين A1C الخاص بك. قد يجري لك طبيبك فحوصات دم لفحص نسب فيتامين B₁₂.

2.4 التداخلات/التفاعلات بين الأدوية

إذا كنت تتناول، أو إذا تناولت مؤخراً أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، إحكِ للطبيب أو للصيدلي عن ذلك. بالأخص إذا كنت تتناول:

- توبرامات (لعلاج الإختلاجات والشقيقة).
- أسياتازولاميد (لعلاج الزوامة، جلوكوما ومرض دوار البحر).
- دولوتجرافير (لعلاج توت الـ HIV).
- سيميتيدين (لعلاج القرحة الهضمية).
- رانولازين.
- فاندبتانيب.

قد يؤثر **سيتار پلوس** على طريقة عمل أدوية أخرى، وقد تؤثر أدوية أخرى على طريقة عمل **سيتار پلوس**.

تعرف على الأدوية التي تتناولها. احتفظ بقائمة الأدوية الخاصة بك وأرها لطبيبك والصيدلي عند تلقيك دواءً جديداً.

2.5 إستعمال سيتار پلوس والطعام

يجب تناول **سيتار پلوس** مع وجبات الطعام للمساعدة في تقليل الإحتمال لديك للمعاناة من إضطرابات في الجهاز الهضمي.

2.6 الحمل، الإرضاع والخصوبة

● إذا كنت حاملاً أو تخططين للحمل: من غير المعروف إذا كان **سيتار پلوس** سيلحق الضرر بجنينك. إذا كنت حاملاً، تحدثي مع طبيبك بخصوص الطريقة الأفضل للتحكم بنسب سكر الدم لديك أثناء الحمل.

● إذا كنت مرضعة أو تخططين للإرضاع: ليس معروفاً إذا كان **سيتار پلوس** ينتقل إلى حليب الأم لديك. تحدثي مع طبيبك عن أفضل طريقة لإطعام رضيعك إذا كنت تتناولين **سيتار پلوس**.

● إذا كنت امرأة لم تجتز سن اليأس (قبل فترة سن اليأس) وليس لديها طمث منتظم أو على الإطلاق: يمكن أن يؤدي **سيتار پلوس** لتحرير بويضة من المبيض (بإضافة) لدى المرأة. يمكن لهذا أن يزيد من الإحتمال لديك في حدوث حمل. أخبري طبيبك فوراً في حال حدوث حمل لديك أثناء تناول **سيتار پلوس**.

2.7 معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء

يحتوي **سيتار پلوس** على صوديوم. يحتوي هذا الدواء على أقل من 1 ميليمول صوديوم (23 ملغ) لكل قرص، مما يعني أنه عملياً "خالٍ من الصوديوم". يحتوي **سيتار پلوس** على لكتوز. إذا قبل لك من قبل الطبيب أنّ لديك عدم تحمّل لأنواع معينة من السكر، يرجى التوجه إلى الطبيب قبل تناولك **سيتار پلوس**.

3) كيفية إستعمال سيتار پلوس؟

يجب إستعمال **سيتار پلوس** دائماً حسب تعليمات الطبيب. عليك الإستيضاح من الطبيب أو من الصيدلي إذا لم تكن واثقاً بخصوص المقدار الدوائي وطريقة العلاج بالمستحضر.

المقدار الدوائي وطريقة العلاج يحددان من قبل الطبيب فقط.

سيخبرك طبيبك بخصوص عدد أقراص **سيتار پلوس** التي عليك أن تتناول ومتى عليك تناولها.

لا يجوز تجاوز المقدار الدوائي الموصى به.

قد يغير طبيبك المقدار الدوائي من **سيتار پلوس** حسب الحاجة.

يجب تناول **سيتار پلوس** مع وجبات الطعام للمساعدة في تقليل الإحتمال لديك للمعاناة من إضطرابات في الجهاز الهضمي.

قد يقول لك طبيبك بأن تتناول **سيتار پلوس** سوية مع أدوية معينة أخرى للسكري. قد يحدث إنخفاض السكر في الدم (hypoglycemia) في أوقات قريبة أكثر عند تناول **سيتار پلوس** مع أدوية معينة أخرى للسكري (انظر الفقرة 4 "الأعراض الجانبية").

هذا الدواء غير مخصص للإعطاء لدى الأطفال دون عمر 18 سنة.

لا تتوفر معلومات حول سحر، سحر، أو مضرغ هذه الأعراض. أخبر طبيبك إن لم تكن قادراً على بلع أقراص **سيتار پلوس** كاملة. في حال وُجد لديك إنخفاض في وظائف الكلى، من الجائز أن يصف لك الطبيب مقداراً دوائياً أخفض.

● إذا تناولت **سيتار پلوس** أكثر مما ينبغي، تحدث مع طبيبك فوراً.

● إذا تناولت مقداراً دوائياً مفرطاً أو إذا بلع طفل بالخطأ من الدواء، توجه فوراً إلى غرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر معك علبة الدواء.

● إذا فاك تناول مقداراً دوائياً، تناوله فور تذكرك. إذا لم تتذكر إلى أن حان الوقت لتناول المقدار الدوائي التالي، فوّت المقدار الدوائي المنسي وعد إلى الجدول الزمني الاعتيادي للتناول. لا يجوز تناول مقدارين دوائيين من **سيتار پلوس** في نفس الوقت.

من الجائز أن تحتاج للتوقف عن تناول **سيتار پلوس** لوقت قصير. إتصل بطبيبك لتلقي تعليمات إذا كنت:

- تعاني من الجفاف (فقدت سوائل جسم أكثر من اللازم). قد يحدث التجفاف إذا كنت مريضاً وتعاني من تقيؤات شديدة، إسهال أو سخونة، أو إذا كنت تشرب سوائل أقل بكثير من المعتاد.
- تخطط للخضوع لعملية جراحية.
- مقدماً على تلقي حقنة ملوثة أو مادة ظليلة من أجل التصوير بالأشعة السينية. (انظر البند 2.2 " تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال **سيتار پلوس**" والفقرة 4 "الأعراض الجانبية").
- عندما يكون جسمك متواجداً تحت أنواع مختلفة من الضغط مثل: سخونة، صدمة (مثلاً حادث طرق)، ثلوث أو عملية جراحية، قد تتغير كمية دواء السكري التي تحتاج إليها. أخبر طبيبك فوراً إذا كانت لديك أية حالة من هذه الحالات وتصرّف حسب تعليمات طبيبك. إستمر بالحمية التي وُصفت لك وبرنامج الفعالية البدنية أثناء تناول **سيتار پلوس**.
- تحدث مع طبيبك عن كيفية تفادي، تشخيص وعلاج إنخفاض السكر في الدم (hypoglycemia). إرتفاع السكر في الدم (hyperglycemia)، ومشاكل موجودة لديك بسبب السكري.

واصل تناول **سيتار پلوس** طالما يقول لك الطبيب فعل ذلك.

يجب المواظبة على العلاج حسب توصية الطبيب.

لا يجوز التوقف عن العلاج بالدواء بدون إستشارة طبيبك حتى ولو طراً تحسن على حالتك الصحية.

لا يجوز تناول أدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتأكد

من المقدار الدوائي في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول إستعمال هذا الدواء، إستشر الطبيب أو الصيدلي.

4) الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، إن إستعمال سيتار بولس قد يسبب أعراضاً جانبية عند بعض المستعملين. لا تتدهش من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز ألا تعاني أياً منها.

قد يسبب سيتار بولس أعراضاً جانبية خطيرة، بما في ذلك:

4.1 حمض لبني، ميتفورمين، أحد الأدوية في سيتار بولس، قد يؤدي لحالة نادرة (يمكن أن تظهر لدى حتى 1 من بين 10,000 مستعمل) لكنها خطيرة تسمى حمض لبني (lactic acidosis) (تراكم الحمض في الدم)، والذي قد يؤدي إلى الوفاة. حمض لبني هو حالة طبية طارئة تستوجب علاجاً في المستشفى.

توقف عن تناول سيتار بولس وتحدث مع طبيبك فوراً، إذا كان لديك أحد الأعراض التالية، التي قد تكون علامات لحمض لبني (lactic acidosis):

- كنت تشعر ببرودة في يديك أو راحتي قدميك.
- كنت تشعر بدوار أو بدوخة.
- وُجد لديك نبض بطيء أو غير منتظم.
- كنت تشعر بأنك ضعيف جداً أو مرهق.
- وُجدت لديك آلام غير اعتيادية في العضلات (شاذة).
- وُجدت لديك صعوبات تنفس.
- كنت تشعر بالغثاس أو بالميل إلى النوم.
- وُجدت لديك آلام في البطن، غثيان أو تقيؤات.

غالبية الأشخاص الذين كان لديهم حمض لبني مع ميتفورمين يعانون من أمور أخرى، التي بمشاركة ميتفورمين أدت إلى حمض لبني. أخبر طبيبك إذا كان لديك أي أمر من الأمور التالية، لأن لديك احتمال أعلى لتطوير حمض لبني (lactic acidosis) مع سيتار بولس إذا كنت:

- تعاني من مشاكل شديدة في الكلية أو أن الكلى لديك متأثرة من فحوصات أشعة سينية معينة التي تم بها إستعمال مادة ملوثة عن طريق الحقن.
- تعاني من مشاكل في الكبد.
- تشرب الكحول في فترات متقاربة جداً أو تشرب كمية كبيرة من الكحول خلال فترة زمنية قصيرة.
- تعاني من التجفاف (فقدت الكثير من سوائل الجسم). قد يحصل ذلك إذا كنت مريضاً مع سخونة، تقيؤات أو إسهال. يمكن حصول التجفاف أيضاً إذا كنت تتعرق كثيراً خلال فعالية أو فعالية بدنية ولم تشرب سوائل كافية.

- تخضع لعملية جراحية.
- تعاني من نوبة قلبية، تلوث خطير أو سكتة.
- تبلغ من العمر 65 سنة أو أكثر.

الطريقة الأفضل لتجنب مشكلة الحمض اللبني مع ميتفورمين هو إخبار طبيبك إذا كان لديك أي واحدة من المشاكل في القائمة أعلاه. من الجائز أن يقرر طبيبك بأن يوقف لك سيتار بولس لفترة ما إذا كان لديك أي واحد من هذه الأمور.

4.2 التهاب البنكرياس (pancreatitis) الذي قد يكون خطيراً ويؤدي إلى الوفاة.

مشاكل طبية معينة تزيد من احتمال الإصابة بمرض التهاب البنكرياس. توقف عن تناول سيتار بولس وإتصل بطبيبك على الفور إذا كان لديك ألم شديد لا يزول في منطقة البطن. من الجائز أن تشعر بالألم ينتقل من بطنك حتى ظهرك. قد يظهر الألم مع أو بدون تقيؤ. قد تكون هذه أعراض لإلتهاب في البنكرياس.

4.3 قصور القلب. قصور القلب معناه أن قلبك لا يضخ دمًا بشكل جيد بما فيه الكفاية.

قبل أن تبدأ بتناول سيتار بولس، أخبر طبيبك إذا كان لديك ذات مرة قصور قلب أو يوجد لديك مشاكل في الكلى. إتصل بطبيبك بشكل فوري إذا كان لديك أحد الأعراض التالية:

- ضيق تنفس متزايد أو مشكلة في التنفس، خاصة عندما تكون مستلقياً.
- إنتفاخ أو إحتباس سوائل، خاصة في راحتي القدمين، الكاحلين أو الرجلين.
- إرتفاع سريع بشكل خاص في الوزن.
- إرهاق غير اعتيادي.

قد تكون هذه أعراض قصور القلب.

4.4 مشاكل في الكلى (شعور غير معروف)، التي تتطلب أحياناً الديزة.

4.5 فيتامين B₁₂ منخفض (نقص بفيتامين B₁₂). قد يسبب إستعمال ميتفورمين لفترات زمنية طويلة إنخفاضاً في كمية فيتامين B₁₂ في دمك، خاصة إذا كانت لديك في الماضي نسب منخفضة من فيتامين B₁₂.

4.6 سكر منخفض في الدم (hypoglycemia). شائع (يمكن أن يظهر لدى حتى 1 من بين 10 أشخاص). إذا كنت تتناول سيتار بولس مع دواء إضافي يمكنه أن يؤدي إلى إنخفاض السكر في الدم، مثل السولفونيل يوريا أو الإنسولين، إن الخطورة لديك للمعاناة من إنخفاض السكر في الدم يكون أعلى. من الجائز أن تكون هناك حاجة لخفض جرعة الدواء من نوع السولفونيل يوريا أو الإنسولين أثناء تناول سيتار بولس.

قد تشمل علامات وأعراض إنخفاض السكر في الدم: صداع، نعاس، ضعف، دوام، إرتباك، سخط، جوع، نبضات قلب سريعة، تعرق، الشعور بالعصبية.

4.7 ردود فعل تحسسية شديدة (شعور غير معروف) يمكنها أن تحدث مع سيتار بولس أو سيتاچلبيتين، أحد الأدوية الموجودة بـ سيتار بولس. أعراض رد فعل تحسسي شديد بـ سيتار بولس قد تشمل: طفح، بقع بارزة حمراء على جلدك (شرى) أو إنتفاخ الوجه، الشفتين، اللسان والحنجرة الذي قد يؤدي إلى صعوبة في التنفس أو في البلع. إذا كانت لديك أي أعراض لرد فعل تحسسي شديد، توقف عن تناول سيتار بولس وتحدث مع طبيبك فوراً أو توجه للحصول على مساعدة طبية عاجلة. من الجائز أن يصف لك الطبيب دواء لرد الفعل التحسسي لديك، ويصف دواءً آخرًا للسكري لديك.

4.8 ألم مفاصل (شعور غير معروف). أشخاص معينون الذين يتناولون أدوية المسماة مثبطات DPP-4، أحد الأدوية في سيتار بولس، قد يتطور لديهم ألم مفاصل الذي قد يكون شديداً. إتصل بطبيبك إذا كنت تعاني من ألم شديد في المفاصل.

4.9 ردود فعل جلدية (شعور غير معروف). جزء من الأشخاص الذين يتناولون أدوية المسماة مثبطات DPP-4، أحد الأدوية في سيتار بولس، قد يتطور لديهم رد فعل جلدي يُسمى bullous pemphigoid حيث من الجائز أن تكون هناك حاجة للعلاج في المستشفى. أخبر طبيبك فوراً إذا تطوّرت لديك حويصلات أو إصابة الطبقة الخارجية من جلدك (تآكل). من الجائز أن يقول لك طبيبك أن تتوقف عن تناول سيتار بولس.

الأعراض الجانبية الأكثر شيوعاً (يمكنها أن تظهر لدى أكثر من شخص واحد من بين 10) لـ سيتار بولس تشمل:

- إنسداد أو سيلان الأنف وآلام في الحنجرة.
- الإتهاب في الطرق التنفسية العلوية.
- إسهال.
- غثيان وتقيؤات.
- غازات، إنزعاج في البطن، مشاكل في الهضم.
- ضعف.
- صداع.

• إنخفاض السكر في الدم (hypoglycemia) عند الإستعمال بمشاركة أدوية معينة، مثل سولفونيل يوريا أو إنسولين.

إن تناول سيتار بولس مع وجبات الطعام يمكنه المساعدة بتقليل الأعراض الجانبية البطنية الشائعة لميتفورمين، التي تحدث عادة في بداية العلاج. إذا كنت تعاني من مشاكل شاذة أو مفاجئة في البطن، تحدث مع طبيبك. إن المشاكل في البطن التي تبدأ في مرحلة متأخرة من العلاج قد تكون إشارة إلى شيء أكثر خطورة.

قد تكون لـ سيتار بولس أعراض جانبية أخرى، تشمل:

- إنتفاخ الديدن أو الرجلين. قد يحدث إنتفاخ الديدن أو الرجلين إذا كنت تتناول سيتار بولس بمشاركة روزيجليتازون. روزيجليتازون هو دواء من نوع آخر للسكري.
- آلام مفصليّة.
- آلام عضليّة.
- ألم في الذراع أو في الرجل.
- ألم ظهري.
- حكة.
- حويصلات.

هذه ليست جميع الأعراض الجانبية الممكنة لـ سيتار بولس. لمعلومات إضافية، إسأل طبيبك.

أخبر طبيبك إذا كان لديك أي عرض جانبي الذي يزعجك، أو أنه لا يزول. إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقمتم إحدى الأعراض الجانبية أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة، عليك إستشارة الطبيب.

التبليغ عن أعراض جانبية:

بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية إلتهابية الصحة بواسطة الضغط على الرابط "تبليغ عن أعراض جانبية عقب علاج دوائي" الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يوجهك إلى النموذج المباشر للتبليغ عن أعراض جانبية.

بالإضافة إلى ذلك، بالإمكان تبليغ شركة "يونيفارم م.ض." على العنوان: <https://unipharm.co.il/>

5) كيفية تخزين سيتار بولس؟

- تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي ومجال رؤية الأطفال و/أو الرضع، وذلك لتفادي إصابتهم بالتسمم. لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب!
- لا يجوز إستعمال سيتار بولس بعد إنتقاص تاريخ الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على ظهر العبوة. يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.
- لا يجوز التخزين فوق 25 درجة مئوية.
- لا يجوز رمي الأدوية إلى المجاري أو للقمامة المنزلية. إسأل الصيدلي عن كيفية التخلص من أدوية لم تعد قيد الإستعمال. هذه الوسائل تساعد في الحفاظ على البيئة.

6) معلومات إضافية

6.1 ماذا يحتوي سيتار بولس؟

يحتوي الدواء بالإضافة إلى المركبات الفعالة أيضاً على:

Cellulose Microcrystalline, Povidone (K29/32), Sodium Stearyl Fumarate, Sodium Laurilsulfate, Purified Water.

يحتوي طلاء القرص (50 / 500) على المركبات غير الفعالة التالية:

Polyvinyl alcohol, Titanium Dioxide (E171), Macrogol / Polyethylene glycol, Talc, Iron Oxide yellow, Iron Oxide Red.

يحتوي طلاء القرص (50 / 850) على المركبات غير الفعالة التالية:

Lactose Monohydrate, Hypromellose, Titanium Dioxide, Triacetin, Iron Oxide Red.

يحتوي طلاء القرص (50 / 1000) على المركبات غير الفعالة التالية:

Polyvinyl alcohol, Macrogol/Polyethylene glycol, Talc, Titanium Dioxide, Iron Oxide Red, Iron Oxide Black.

6.2 كيف يبدو سيتار بولس وما هو محتوى العبوة

سيتار بولس هي أقراص مطلية متوفرة بثلاثة عبارات:

سيتار بولس 50 / 500 هي أقراص مطلية، بيضوية ومحدبة من كلا الجانبين، برتقالية اللون، مختمة بـ "S475" من جانب واحد وملساء من الجانب الآخر.

سيتار بولس 50 / 850 هي أقراص مطلية، بيضوية ومحدبة من كلا الجانبين، وردية اللون، مختمة بـ "S476" من جانب واحد وملساء من الجانب الآخر.

سيتار بولس 50 / 1000 هي أقراص مطلية، بيضوية ومحدبة من كلا الجانبين، بنية اللون، مختمة بـ "S477" من جانب واحد وملساء من الجانب الآخر.

أحجام العلب:

سيتار بولس 50 / 500: علب بحجم 28، 56، 198 قرصاً مطلياً.

سيتار بولس 50 / 850: علب بحجم 14، 28، 30، 56، 60 قرصاً مطلياً.

سيتار بولس 50 / 1000: علب بحجم 14، 28، 30، 56، 60 قرصاً مطلياً.

من الجائز ألا تسوّق كافة أحجام العلب.

صاحب الإمتياز والمسئور: يونيفارم للتجارة م.ض. ص.ب. 21429 تل أبيب، 6121301

تم إعدادها في كانون الثاني 2023 بموجب تعليمات وزارة الصحة.

رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة:

سيتار بولس 50 / 500: 171.55.36970.99

سيتار بولس 50 / 850: 168.97.36684.99

سيتار بولس 50 / 1000: 168.98.36685.99

من أجل سهولة وتسهيل القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكّر على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.