

نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيدلة
(مستحضرات) 1986
يسوّق الدواء بموجب وصفة طبيب فقط

إيكسفورج 5 ملغ/80 ملغ أقراص مطلية

التركيب:

يحتوي كل قرص مطلي على:
أملوديبين (على شكل ببسيلات) 5 ملغ
فالسارتان 80 ملغ

Amlodipine (as besylate) 5mg
Valsartan 80mg

إيكسفورج 5 ملغ/160 ملغ أقراص مطلية

التركيب:

يحتوي كل قرص مطلي على:
أملوديبين (على شكل ببسيلات) 5 ملغ
فالسارتان 160 ملغ

Amlodipine (as besylate) 5mg
Valsartan 160mg

إيكسفورج 10 ملغ/160 ملغ أقراص مطلية

التركيب:

يحتوي كل قرص مطلي على:
أملوديبين (على شكل ببسيلات) 10 ملغ
فالسارتان 160 ملغ

Amlodipine (as besylate) 10mg
Valsartan 160mg

المواد غير الفعالة: أنظر الفقرة 6 "معلومات إضافية".

اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل إستعمالك للدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي. وُصف هذا الدواء لعلاج مرضك. لا تعطيه للآخرين، فهو قد يضرهم حتى ولو بدا لك أن مرضهم مشابه لمرضك.

1) لأي غرض مخصص الدواء؟

لعلاج فرط ضغط الدم الأولي. إيكسفورج مخصص لمتعالمين ضغط الدم لديهم غير متوازن كما ينبغي بواسطة علاج منفرد.

الفصيلة العلاجية:

أملوديبين - من حاجيات قنوات الكالسيوم. فالسارتان - من مضادات المستقبل أنجيوتنسين II. تحتوي أقراص إيكسفورج على مُركّبين إنثنين بسميان أملوديبين و- فالسارتان. إن هاتين المادتين مخصصتان لعلاج فرط ضغط الدم لدى الكبار، حيث أن العلاج بكل مركب بشكل منفرد لا يؤدي إلى نتائج كافية. ينتمي أملوديبين إلى فصيلة المواد المسماة "حاجيات قنوات الكالسيوم". يوقف أملوديبين من دخول الكالسيوم إلى جدران الأوعية الدموية، الأمر الذي يمنع تضيق الأوعية الدموية. ينتمي فالسارتان إلى فصيلة المواد المسماة "مضادات المستقبل أنجيوتنسين II". أنجيوتنسين II هو عبارة عن مادة ينتجها الجسم وتسبب تضيق الأوعية الدموية وبذلك تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم. يعمل فالسارتان على حجب تأثير أنجيوتنسين II. تساعد كلتا المادتين على منع تضيق الأوعية الدموية. نتيجة لذلك، يحدث ارتخاء للأوعية الدموية وينخفض ضغط الدم.

2) قبل إستعمال الدواء

لا يجوز إستعمال الدواء إذا:

- كنت حساساً (البرجي) لـ أملوديبين أو لكل واحد من حاجيات قنوات الكالسيوم الأخرى. من شأن ذلك أن يتجلى بحكة، إحمرار الجلد أو صعوبات في التنفس.
 - كنت حساساً (البرجي) لـ فالسارتان أو لكل واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء (الفصيلة في الفقرة 6 "معلومات إضافية"). إذا كنت تعتقد بأنه من شأنك أن تكون حساساً، راجع الطبيب قبل تناول إيكسفورج.
 - لديك مشاكل خطيرة في الكبد أو مشاكل في الطرق الصفراوية مثل تشمع الصفراء أو إسداد في جريان الصفراء داخل الكبد.
 - كنت حاملاً ما بعد الشهر الثالث (يُفضل الإمتناع عن إيكسفورج في بداية الحمل أيضاً، أنظري بند "الحمل والإرضاع").
 - وجد لديك ضغط دم منخفض بشكل خطير (hypotension).
 - وجد لديك تضيق في صمام الشريان الأبهري (aortic stenosis) أو صدمة قلبية (cardiogenic shock) - حالة يكون فيها قلبك غير قادر على تزويد ما يكفي من الدم للجسم.
 - كنت تعاني من قصور في القلب بعد نوبة قلبية.
 - وُجد لديك سكري أو خلل في الأداء الوظيفي الكلوي وكنت تتعالج بدواء لخفض ضغط الدم الحاوي على أليسكيرين.
- إذا انطبق عليك واحداً من تلك البنود، بلِّغ طبيبك من دون أن تتناول إيكسفورج.

تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء:

قبل العلاج بـ إيكسفورج، إحك للطبيب إذا:

- كنت مريضاً (تقيؤات أو إسهال).
- وجدت لديك مشاكل في الكبد أو في الكلية.
- إجترت زراعة كلية أو شخص لديك أنك تعاني من تضيق في شرايين الكلية.
- وجدت لديك مشكلة تؤثر على وظيفة الغدة الكظرية المسماة فرط الألدوستيرونية الأولي (primary hyperaldosteronism).

- وُجد لديك قصور في القلب أو إجترت في السابق نوبة قلبية. يجب متابعة تعليمات الطبيب بحرص بما يتعلق بالمقدار الدوائي الإبتدائي. من شأن الطبيب أن يفحص أيضاً الأداء الوظيفي لكليتك.
- أبلغك طبيبك بأنك تعاني من تضيق في صمامات القلب (stenosis or mitral aortic)، أو من إعتلال عضلة القلب الضخامي الإنسدادي (obstructive hypertrophic cardiomyopathy).
- حصل لديك ذات مرة إنتفاخ، خاصة في الوجه والحنجرة أثناء تناول أدوية أخرى (بما في ذلك منبجطات ACE). إذا كنت تقاسي من تلك الأعراض، توقف عن تناول إيكسفورج وراجع طبيبك فوراً. في هذه الحالة، لا يجوز أبداً معاودة تناول إيكسفورج.
- كنت تتناول واحداً من الأدوية المستعملة لعلاج ارتفاع ضغط الدم:
 - مثبطات ACE (مثلاً: إنلأپريل، ليزينوپريل، رامبپريل)، خاصة إذا كنت تعاني من مشاكل في الكلى ذات الصلة بالسكري.
 - الأليسكيرين.

الأطفال والمراهقون:

- لا يوصى بإستعمال إيكسفورج لدى الأطفال والمراهقين ما دون عمر 18 سنة.
- الفحوص والمتابعية:**
- من الجائز أن يقوم طبيبك بفحص الأداء الوظيفي لكليتك، وضغط الدم وكمية الشوارد الكهربائية في دمك (على سبيل المثال البوتاسيوم) بشكل دائم. أنظر معلومات إضافية في فقرة "لا يجوز إستعمال الدواء إذا". إذا انطبق عليك واحداً من البنود، بلِّغ الطبيب قبل تناول إيكسفورج.

التداخلات/التفاعلات بين الأدوية:

- إذا كنت تتناول، أو إذا تناولت مؤخراً، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، إحك للطبيب أو للصيدلي عن ذلك. من الجائز أن يضطر طبيبك إلى تغيير المقدار الدوائي أو إتخاذ وسائل حذر أخرى، وفي حالات معينة من الجائز أن تضطر إلى التوقف عن تناول واحداً من الأدوية. يجب إبلاغ الطبيب أو الصيدلي بالأخص إذا كنت تتناول أدوية من المجموعات التالية:
- مثبطات ACE أو الأليسكيرين (أنظر المعلومات في فقرات "لا يجوز إستعمال الدواء إذا" و- "تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء");
 - المدرات البولية (نوع من دواء يزيد من التبول);
 - ليتيوم، دواء يستعمل لعلاج أنواع معينة من الإكتئاب;
 - المدرات البولية الحافظة للبوتاسيوم، إضافات البوتاسيوم، بدائل الملح التي تحتوي على بوتاسيوم أو مواد أخرى التي من شأنها أن ترفع نسب البوتاسيوم;
 - أنواع معينة من مسكنات الألم المسماة مضادات الإلتهاب اللا ستيرويديية (NSAIDs) أو مثبطات سيكلو أوكسيجيناز - 2 الإنتقائية (Cox-2 inhibitors).
 - من شأن الطبيب أيضاً أن يفحص الأداء الوظيفي لكليتك؛ أدوية لعلاج الإختلاجات (مثل كاربامازيبين، فينوباربيتال، فينيوتوين، فوسفينيتويتين، بريمدون);
 - الخصاصة النباتية للتهنئة - هيبيريكوم بيرفوراتوم (St. John's wort);
 - نيتروجليسيرين ومركبات النترات الأخرى، أو الأدوية الأخرى التي تنتمي إلى فصيلة موسعات الأوعية الدموية (vasodilators);
 - أدوية لعلاج الإيدز HIV/AIDS (مثل ريتونافير، إيندينافير، تيلفنافير);

- أدوية مستعملة لعلاج التلوثات الفطرية (مثل كيتوكونازول، إيتراكونازول);
- أدوية مستعملة لعلاج التلوثات الجرثومية (مثل ريفامپيسين، إريتر و ميسين، كلاربوتر و ميسين، تيلينوروميسين);
- فيرأپاميل، ديلتيازيم (أدوية للقلب);
- سيقماتاتين (دواء يستعمل لخفض نسب الكولسترول);
- دانتروالين (تسريب لدرجات حرارة الجسم الشادة);
- أدوية مستعملة للحماية من رفض نسيج مزروع (سيكلوسبورين);

إستعمال الدواء والطعام:

لا يجوز إستهلاك الجريب فروت وعصير الجريب فروت أثناء إستعمال إيكسفورج. سبب ذلك لأن الجريب فروت وعصير الجريب فروت قد يرفعان من نسب المُركب الفعال أملوديبين في الدم، الأمر الذي قد يزيد من التأثير الخافض لضغط الدم بشكل غير متوقع. بالإمكان تناول إيكسفورج مع أو بدون طعام.

الحمل والإرضاع:

الحمل

عليك إبلاغ طبيبك إذا كنت تعتقدين بأنك حامل أو من شأنك أن تصبحي حاملاً. يوصيك طبيبك عادة بالتوقف عن تناول إيكسفورج قبل أن تصبحي حاملاً أو مباشرة عند إكتشافك بأنك حامل ويوصيك بإستعمال دواءً آخرًا عوضاً عن إيكسفورج. لا يوصى بإستعمال إيكسفورج في بداية الحمل (في الأشهر الثلاثة الأولى للحمل) ولا يجوز إستعماله إذا كنت بعد الشهر الثالث من الحمل، وذلك لأنه قد يسبب ضرراً شديداً للجنين في حال إستعماله بعد الشهر الثالث من الحمل.

الإرضاع

يلغي طبيبك إذا كنت مرضعة أو تخططين البدء في الإرضاع. تنتقل كميات ضئيلة من أملوديبين إلى حليب الأم. لا يوصى بتناول إيكسفورج أثناء الإرضاع ومن الجائز أن يوصيك طبيبك على علاج آخر إذا كنت ترغبين في الإرضاع، خاصة إذا كان الرضيع حديث الولادة أو وُلد قبل الأوان. عليك إستشارة الطبيب أو الصيدلي قبل أي إستعمال لدواء.

السياقة وإستعمال الماكينات:

هذا الدواء قد يسبب الدوار. قد يؤثر هذا الأمر على قدرتك على التركيز. لذلك، إذا كنت لا تعرف كيف سيؤثر الدواء عليك، لا تقم بالسياقة، لا تستعمل الماكينات ولا تقم بإجراء النشاطات الأخرى التي تتطلب التركيز.

3) كيفية إستعمال الدواء؟

يجب إستعمال المستحضر دائماً بحسب تعليمات الطبيب. عليك الإبتساح من الطبيب أو من الصيدلي إذا لم تكن واثقاً فيما يتعلق بالمقدار الدوائي وطريقة العلاج بالمستحضر. هذا الأمر يساعد في الحصول على النتائج المثلى وتقليل خطورة حدوث أعراض جانبية.

- المقدار الدوائي وطريقة العلاج يحددان من قبل الطبيب فقط. المقدار الدوائي الإعتيادي عادة هو قرص واحد في اليوم.
- يُفضل تناول الدواء بنفس الساعة من كل يوم.
- يجب بلع الأقراص مع كأس من الماء.
- بالإمكان تناول إيكسفورج مع أو بدون طعام. لا يجوز تناول إيكسفورج مع الجريب فروت أو مع عصير الجريب فروت.
- لا توجد معلومات حول سحق/ضطر أو مضغ الأقراص. من شأن الطبيب أن يقترح مقداراً دوائياً أكبر أو أصغر، وذلك بحسب إستجابتك للعلاج.
- لا يجوز تجاوز المقدار الدوائي الموصى به.

إيكسفورج لدى المسنين (من عمر 65 سنة وما فوق)
يقوم طبيبك بالتصرف بحذر أثناء رفع المقدار الدوائي. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول إستعمال الدواء، إسأل طبيبك أو الصيدلي.

إذا تناولت بالخطأ مقداراً دوائياً أكبر

إذا تناولت مقداراً دوائياً مفرطاً أو إذا بلع طفل بالخطأ من الدواء، توجه فوراً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى وأضمر معك علبة الدواء. قد يتراكم فائض من السوائل في رتيك (وذمة رئوية) حيث يؤدي إلى ضيق في التنفس والذي قد يتطور حتى 24-48 ساعة بعد تناول.

إذا نسيت تناول الدواء

إذا نسيت تناول الدواء في الوقت المحدد، فيجب تناول مقدار دوائي حال تذكرك. بعد ذلك، يجب تناول المقدار الدوائي القادم في الوقت الإعتيادي. لكن، إذا حان تقريباً موعد تناول المقدار الدوائي القادم، فلا يجوز تناول المقدار الدوائي المنسي. لا يجوز تناول مقدار دوائي مضاعف للتعويض عن المقدار الدوائي المنسي. تناول المقدار الدوائي القادم في الوقت الإعتيادي واستشر الطبيب.

يجب المواظبة على العلاج بحسب توصيات الطبيب. لا يجوز التوقف عن العلاج بالوأيام بدون إشراف الطبيب، حتى ولو طرأ تحسن على حالتك الصحية.

في حال توقفت عن تناول الدواء

إن التوقف عن العلاج بإيكسفورج قد يؤدي لتفاقم مرضك. لا تتوقف عن تناول الدواء إلا بتعليمات الطبيب.

لا يجوز تناول أدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتأكد من المقدار الدوائي في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع التعليمات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول إستعمال الدواء، استشر الطبيب أو الصيدلي.

4) الأعراض الجانبية

كما بول دواء، إن إستعمال إيكسفورج قد يسبب أعراضاً جانبية لدى بعض المستعملين. لا تتدنهش من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز ألا تعاني أيأ منها.

هنالك أعراض جانبية خطيرة تتطلب علاجاً طبياً فورياً:

لقد قاسى قليل من المرضى من الأعراض الجانبية الخطيرة التالية (تظهر لدى حتى 1 من بين 1,000 مستعمل)

في حال حدوث أيأ من الأعراض التالية، يجب التوجه فوراً إلى الطبيب:

رد فعل تحسسي مع أعراض مثل طفح، حكة، إنتفاخ الوجه أو الشفتين أو اللسان، صعوبات في التنفس، ضغط دم منخفض (الشعور بإغماء، الشعور بدوخة).

أعراض جانبية أخرى التي من الجائز أن تحدث عند إستعمال إيكسفورج:

أعراض جانبية شائعة (تظهر لدى حتى 1 من بين 10 مستعملين): إنفلونزا؛ إسهال؛ إزداد الأنف، ألم في الحنجرة وانزعاج أثناء البلع؛ صداد؛ إنتفاخ الزدرايين، راحتي اليدين، الرجلين، الكاحلين أو راحتي القدمين؛ إرهاق؛ ضعف؛ إجمرار والشعور بسخونة في الوجه و/أو في العنق.

أعراض جانبية غير شائعة (تظهر لدى حتى 1 من بين 100 مستعمل): دوار؛ غثيان وآلم في البطن؛ جفاف في الفم؛ نعاس؛ وخز أو خدر في راحتي اليدين أو القدمين؛ قيرتيجو؛ تسرع نظم القلب بما في ذلك خفقان القلب؛ دوار عند الوقوف؛ سعال؛ إسهال؛ إمساك؛ طفح جلدي؛ إجمرار الجلد؛ إنتفاخ في المفاصل، آلم في الظهر؛ آلم في المفاصل.

أعراض جانبية نادرة (تظهر لدى حتى 1 من بين 1,000 مستعمل): قلق؛ طنين في الأذنين؛ إغماء؛ التبول أكثر من المعتاد أو الشعور بزيادة الإلحاح على التبول؛ عدم القدرة على تحقيق أو المحافظة على إنتصاب القضيب التناسلي؛ الشعور بثقل؛ إنخفاض ضغط الدم مع أعراض مثل دوار، الشعور بدوخة خفيفة؛ تعرق زائد؛ طفح جلدي بكامل الجسم؛ حكة؛ تقلصات عضلية.

إذا أذرت عليك الأعراض المذكورة أعلاه بصورة شديدة، راجع الطبيب.

الأعراض الجانبية التي بلِّغ عنها أثناء إستعمال أملوديبين أو فالسارتان المستعملين بشكل منفرد والتي لم تظهر عند إستعمال إيكسفورج أو تظهر بوتيرة أكبر مما هو عليه مع إيكسفورج:

أملوديبين

راجع الطبيب بشكل فوري إذا كنت تشعر بإحدى الأعراض الجانبية النادرة جداً والخطيرة التالية بعد تناول الدواء:

- صغير مفاجئ أثناء التنفس، آلم في الصدر، ضيق تنفس أو صعوبات في التنفس.
- إنتفاخ في الجفنين، الوجه أو الشفتين.
- إنتفاخ اللسان والحنجرة التي تسبب صعوبة كبيرة في التنفس.
- أعراض جلدية خطيرة تشمل طفح جلدي شديد، شرى، إجمرار الجلد بكامل الجسم، حكة شديدة، حوصصات، تقشر وإنتفاخ الجلد، التهاب في التسنج المخاطي (Steven-Johnson Syndrome)، نخر البشرة (السمي)، أو ردود فعل تحسسية أخرى.
- إحتشاء عضلة القلب، نظم قلب غير منظم.
- التهاب البنكرياس الذي قد يسبب آلم شديدة في البطن والظهر التي يتوافق بشعور عام غير جيد.

بلِّغ عن حدوث الأعراض الجانبية التالية. إذا سببت لك الأعراض التالية مشاكل أو إذا استمرت لأكثر من أسبوع، راجع طبيبك:

أعراض جانبية شائعة (تظهر لدى حتى 1 من بين 10 مستعملين): دوار، نعاس، خفقان القلب (الإحساس بضربات القلب)، تورد، إنتفاخ الكاحلين (وذمة)، آلم في البطن، غثيان.

أعراض جانبية غير شائعة (تظهر لدى حتى 1 من بين 100 مستعمل): تغيرات في الحالة النفسية، قلق، إكتئاب، أرق، رجفة، تغيرات في حساسة مذاق، إغماء، فقدان الإحساس بالألم، إضطرابات في الرؤية، خلل في الرؤية، طنين في الأذنين، إنخفاض ضغط الدم، عتاس/إرشح في الأنف التي تنجم عن التهاب في تسنج الأنف (التهاب الأنف)، مشاكل في الهضم، قيؤات، فقدان الشعر، تعرق زائد، حكة في الجلد، تغير لون الجلد، إضطراب في التبول، زيادة الحاجة للتبول في الليل، زيادة وتيرة التبول، عدم القدرة على تحقيق إنتصاب للقضيب التناسلي، إنزعاج أو تضخم الثديين لدى الرجال، آلم، الشعور بوعكة، آلم في العضلات، تقلصات عضلية، زيادة أو تناقص الوزن.

أعراض جانبية نادرة (تظهر لدى حتى 1 من بين 1,000 مستعمل): إرتباك.

أعراض جانبية نادرة جداً (تظهر لدى حتى 1 من بين 10,000 مستعمل): تناقص عدد خلايا الدم البيضاء، تناقص عدد الصفيحات الدموية، الأمر الذي قد يؤدي لحدوث كدمات شاذة أو النزف بسهولة (تضرر كريات الدم الحمراء)، فائض السكر في الدم (فرط سكر الدم)، إنتفاخ اللثة، إنتفاخ بطني (التهاب المعدة)، آداء وظلغي كبدي شاذ، إتهاب الكبد (hepatitis)، إضفرار الجلد (يرقان)، إرتفاع إنزيمات الكبد، الأمر الذي قد يؤثر على بعض الفحوص الطبية، زيادة توتر العضلات،

التهاب في الأوعية الدموية الذي يترافق أحياناً بطفح جلدي، حساسية للنسوء، إضطرابات تتضمن تصلب، رجفان و/أو صعوبات في الحركة.

فالسارتان

أعراض جانبية ناث معروف (لا يمكن تقدير البوتيرة من المعطيات المتوفرة): تناقص كريات الدم الحمراء، سخونة، آلم في الحنجرة أو تقراحت في الفم ناتجة عن التلوثات؛ نزف أو كدمات عفوية؛ إرتفاع نسب البوتاسيوم في الدم؛ عدم سلامة نتائج فحوص الكبد؛ تناقص في الأداء الوظيفي الكلوي أو تناقص شديد في الأداء الوظيفي الكلوي؛ إنتفاخ خاصة في الوجه والحنجرة؛ آلام عضلية؛ طفح، بقع بنفسجية - حمراء، سخونة، حكة؛ ردود فعل تحسسية؛ حوصصات في الجلد (أعراض لحالة تُسمى Dermatitis bullous).

إذا كنت تشعر بتلك الأعراض، توجه إلى طبيبك فوراً!

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقت إحدى الأعراض الجانبية أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة، عليك إستشارة الطبيب.

التبليغ عن أعراض جانبية

بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "تبليغ عن أعراض جانبية لعقب علاج دوائي" الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يوجهك إلى النموذج المباشر للتبليغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق تصفح الرابط: <https://sideeffects.health.gov.il>

5) كيفية تخزين الدواء؟

- تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي ومجال رؤية الأطفال و/أو الرضع، وذلك لتفادي إصابتهم بالتسمم. لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.
- لا يجوز إستعمال الدواء بعد إنتقضاء تاريخ الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على ظهر العلبة. يشير تاريخ إنتقضاء الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.
- لا يجوز التخزين فوق 30 درجة مئوية. يجب التخزين في العلبة الأصلية للحماية من الرطوبة.
- لا يجوز الإستعمال إذا كانت العلبة متضررة.

6) معلومات إضافية

يحتوي الدواء بالإضافة للمواد الفعالة أيضاً على: إيكسفورج أقراص مطلية: 5 ملغ/80 ملغ، 5 ملغ/160 ملغ/160 ملغ، 10 ملغ/160 ملغ

Microcrystalline cellulose
Crosopovidone, type A
Magnesium stearate
Silica, colloidal anhydrous / Colloidal silicon dioxide

إيكسفورج 5 ملغ/80 ملغ أقراص مطلية **تركيب الطلاء:**

Hypromellose
Titanium dioxide (E171)
Iron oxide, yellow (E172)
Macrogol 4000
Talc

إيكسفورج 5 ملغ/160 ملغ أقراص مطلية **تركيب الطلاء:**

Hypromellose
Titanium dioxide (E171)
Iron oxide, yellow (E172)
Macrogol 4000
Talc

إيكسفورج 10 ملغ/160 ملغ أقراص مطلية **تركيب الطلاء:**

Hypromellose
Titanium dioxide (E171)
Iron oxide, yellow (E172)
Iron oxide, red (E172)
Macrogol 4000
Talc

كيف يبدو الدواء وما هو محتوي العلبة:

إيكسفورج 5 ملغ/80 ملغ: قرص مطلي مستدير بلون أصفر غامق ذو أطراف مائلة، عليه الطباعة "NVR" من جانب واحد و- "NV" من الجانب الثاني. تحتوي العلبة على 28 قرصاً.

إيكسفورج 5 ملغ/160 ملغ: قرص مطلي بيضوي بلون أصفر غامق ذو أطراف مائلة، عليه الطباعة "NVR" من جانب واحد و- "ECE" من الجانب الثاني. تحتوي العلبة على 28 قرصاً.

إيكسفورج 10 ملغ/160 ملغ: قرص مطلي بيضوي بلون أصفر فاتح ذو أطراف مائلة، عليه الطباعة "NVR" من جانب واحد و- "UIC" من الجانب الثاني. تحتوي العلبة على 28 قرصاً.

صاحب الإمتياز والمستورد وعنوانه: نوفاارتيس إسرائيل م.ص.، ص.ب. 7126، تل أبيب.

تم إعداها في شباط 2023 بموجب تعليمات وزارة الصحة.

رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة:

إيكسفورج 5 ملغ/80 ملغ: 138 40 31566
إيكسفورج 5 ملغ/160 ملغ: 138 41 31567
إيكسفورج 10 ملغ/160 ملغ: 138 42 31568

من أجل سهولة وتوحيين القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكّر. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.