

**پرميكسون 160 ملغم**

كبسولات

التركيب:

المادة الفعالة وكميتها - تحتوي كل كبسولة

على:

**Lipidosterolic Extract of Serenoa Repens 160 mg**

خلاصة دهنية ستيرولية لنبتة البلميط المنشاري

(Serenoa Repens) 160 ملغم.

المواد غير الفعالة ومولادات الحساسية في

المستحضر: أنظر الفقرة 6.

اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل إستعمالك

للدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة

عن الدواء. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، راجع

الطبيب أو الصيدلي.

وُصف هذا الدواء للعلاج من أجلك. لا تعطيه

لآخرين. فهو قد يضرهم حتى ولو بدا لك أن

حالتهم الطبية مشابهة لحالتك.

**(1) لأي غرض مخصص الدواء؟**

لعلاج مشاكل معتمدة في التبول المتعلقة بتضخم

غدة البروستات الحميد لدى الرجال البالغين.

**الفصيلة العلاجية:** مستحضر طبي يُستخدم

لعلاج تضخم غدة البروستات الحميد.

**(2) قبل إستعمال الدواء**

لا يجوز إستعمال الدواء إذا:

- كنت حساساً (أليرجي) للمادة الفعالة

**Lipidosterolic Extract of Serenoa****Repens** أو لكل واحد من المركبات الإضافية

التي يحتويها الدواء (أنظر الفقرة 6).

تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء

- إن تناول الدواء على معدة خاوية قد يؤدي إلى غثيان.

• خلال فترة إستعمال الدواء، هناك حاجة

لحضورك لمتابعة منتظمة لغدة البروستات

لديك وذلك لدى طبيبك. لا يشكل پرميكسون

في أي حال من الأحوال بدلاً لعملية جراحية،

في حال كانت العملية الجراحية ضرورية.

**التدخلات/التفاعلات بين الأدوية**

إذا كنت تتناول، أو إذا تناولت مؤخراً، أدوية

أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طيبة

وإضافات غذائية، إحكام للطبيب أو للصيدلي

عن ذلك.

**إستعمال الدواء والطعام**

يجب تناول الدواء مع وجبة الطعام.

**الحمل، الإرضاع والخصوبة**

هذا المستحضر الطبي غير مخصص للعلاج لدى

النساء.

**(3) كيفية إستعمال الدواء؟**

يجب الإستعمال دائمًا حسب تعليمات الطبيب. عليك الإستيقاظ من الطبيب أو من الصيدلي إذا لم تكن واثقاً بخصوص المقدار الدوائي وطريقة العلاج بالمستحضر.

المقدار الدوائي وطريقة العلاج يحددان من قبل الطبيب فقط. المقدار الدوائي الإعتيادي هو عادة كبسولتين إثنين في اليوم، مع وجبات الطعام. لا يجوز تجاوز المقدار الدوائي الموصى به. يجب تناول الدواء مع وجبة الطعام. يجب بلع الدواء مع كأس من الماء. لا يجوز فتح وبعثرة محتوى الكبسولة.

إذا تناولت بالخطأً مقداراً دوائياً أكبر، فمن الجائز ظهور إضطرابات عابرة في الجهاز الهضمي (الآلام في البطن).

إذا تناولت مقداراً دوائياً مفرطاً أو إذا بلع طفل بالخطأً من الدواء، توجه فوراً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر معك علبة الدواء.

إذا نسيت تناول هذا الدواء في الموعد المطلوب، فلا يجوز تناول مقدار دوائي مضاعف. تناول المقدار الدوائي التالي في الموعد الإعتيادي وإستشر الطبيب.

يجب المواظبة على العلاج حسب توصية الطبيب. لا يجوز التوقف عن العلاج بالدواء بدون استشارة الطبيب أو الصيدلي، حتى ولو طرأ تحسن على حالتك الصحية.

لا يجوز تناول أدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتأكد من المقدار الدوائي في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول إستعمال هذا الدواء، إستشر الطبيب أو الصيدلي.

**(4) الأعراض الجانبية**

كما بكل دواء، إن إستعمال پرميكسون 160 ملغم قد يسبب أعراضًا جانبية لدى بعض المستعملين. لا تتدفق من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز ألا تتعانى أي منها.

أعراض جانبية شائعة (تظهر لدى 1-10% من المستعملين من بين 100)

- صداع (شقيقة)
- آلام في البطن
- غثيان

أعراض جانبية غير شائعة (تظهر لدى 1-10% من المستعملين من بين 1,000)

- إرتفاع في الإنزيم چاما - چلوتاميل - ترانسفيزارز، إرتفاع معتدل في الإنزيم ترانسأميناز (إنزيمات الكبد)

- شرى (طفح جلدي)

- تضخم الثديين لدى الرجال (gynecomastia) - عکوس بعد التوقف عن إستعمال الدواء

**أعراض جانبية شيوخها غير معروف (أعراض  
شيوخها لم يحدد بعد)**

● **وذمة (انتفاخ الجلد)**

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقمت إحدى الأعراض الجانبية، أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة، عليك استشارة الطبيب.

**التبليغ عن أعراض جانبية**

بإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "تبليغ عن أعراض جانبية عقب علاج دوائي" الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة ([www.health.gov.il](http://www.health.gov.il)) الذي يوجهك إلى النموذج المباشر للتبليغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق تصفح الرابط:

<https://sideeffects.health.gov.il>

بالإضافة لذلك، بإمكان تبليغ شركة پاداچيس بواسطة العنوان التالي:

[Padagis.co.il](http://Padagis.co.il)

**(5) كيفية تخزين الدواء؟**

● تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي و المجال رؤية الأطفال و/أو الرضع، وذلك لتفادي إصابتهم بالتسمم. لا تسبب التقى بدون تعليمات صريحة من الطبيب.

● لا يجوز إستعمال الدواء بعد إنقضاء تاريخ الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على ظهر العلبة. يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

**● خزن دون 25 درجة مئوية.**

لا يجوز إلقاء الأدوية في المجاري أو في القمامات المنزلية. إسأل الصيدلي حول كيفية التخلص من أدوية لم تعد قيد الإستعمال. تساعد هذه الوسائل في الحفاظ على البيئة.

**(6) معلومات إضافية**

● يحتوي الدواء بالإضافة للمادة الفعالة أيضاً:

Polyethylene glycol 10,000, Gelatin,

Titanium dioxide E171, Yellow iron

oxide E172, Indigotin E132

● كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العلبة:

كبسولة بلون أخضر فاتح.

علب ذات 30، 56، 60 و- 100 كبسولة،

معبأة ضمن لوبيات (بلبستر).

من الجائز لا تسوق كافة أحجام العلب.

● صاحب الإمتياز، المستورد وعنوانه:

وكالات پاداچيس إسرائيل م.ض.، شارع راكيفيت 1، شوهم.

● تم إعدادها في آذار 2023 بموجب تعليمات وزارة الصحة.

● رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي

في وزارة الصحة: 11318.28916