

פרומיקסון™ 160 מ"ג

כמוסות:

הרכב:

החומר הפעיל ומוטו – כל כמותה

מכילה:

Lipidosterolic Extract of Serenoa Repens 160 mg

תמצית ליפידוסטרולית של צמח הדקל

הגנסי (Serenoa Repens) מ"ג.

חומרם בלחתי פעילים ואלרגנים

בתചשיך: ראה סעיף 6.

קרא בעין את העלון עד סופו ברום

תשמש תרופה. עלון זה מכיל מיצע

תמצית על הרווחה. אם יש לך שאלות

ונספות, נזקן לשאלה לרופא או אל הרוקח.

הרופה זו רשמה לטיפול רפואי. אל עבורי

אתה לאחרם. היא עלולה להזיק לך.

אפיו אמן נזהה לך כי מבכם הרופאים דומה.

1. מה מיעדת תרופה?

טיפול בעוריות מתונות בהטלת שתן

הקשורה לדגדלה שפירה של בלוטה

העטמנית (פרוטסטטה) בגיןם מגברים.

קבוצה תרפואתית: תッシュיר רפואי

המשמש לטיפול בגודלה שפירה של

בלוטת העטמניות.

2. לפני השימוש בתרופה

אין לשימוש בתרופה אם:

•atica regis (אלרגיה) לחומר הפעיל

Lipidosterolic Extract of Serenoa Repens

מתרכזים הנוסף אשר מכילה

הרופה (ראה סעיף 6).

ازירות מיוחדות הנוגעות לשימוש

בתרופה, הרווחה ברופא או ברוקח.

3. כיצד השתמש בתרופה?

תפקידו של השם המשמש בטין ריקה עלולה

לגרום לחיכלה.

• בזמן השימוש בתרופה, יש צורך להיות

במגע קבוע עם הרופא ששלר. רופא ששלר

אינו מהוות בשום אופן חלה פליית,

במידה והויה כרוך.

אינטראקטז'ו/תגובהות בין תרופותיו

אתה תלהק, או אם לך תחת אחרונה,

תרופות אחרות ולכל תרופה לא

מרשם וטופס תזונה, ספר על כך

לרופא או לרוקח.

שימוש בתרופה ומazon

יש ליטול את הרווחה עם הארוחה.

הרין, הנקה ופוריות

הקשר רפואי זה יאפשר טיפול בנשים.

3. כיצד השתמש בתרופה?

הטן מידי לשימוש על פי ההוראות הרופא.

עליך לבדוק אם הרוקח אכן אינו

בטענה למיןיו ואופן הטיפול הכספי

הרופא בלבד. המינון המקובל בדרך

כל הוא 2 כמוסות ביום, עם הארוחות.

אין לעזר על מנת המומלצת. יש

ליטול את הרווחה עם כוס מים. אין

לבולו את הרווחה עם כוס מים.

לפתוח ולפרר את חיקת המכוסה.

אם נטלת מנתן יתר או אם בטשות בעל

ילד מן הרווחה, פנה מיד לרופא או

אריזת הרווחה איתך.

אם שכחת ליטול תרופה זו בזמן

הדרשת, אין ליטול מהנה כפסלה. לח

המנה הבאה במנון הגיל והוועץ לרופא.

יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ

על-ידי הרופא.

גם אם לה שיפור במצב בריאותך, אין

התיעיצות עם הרופא של בדך לא

ההפקוק את הטיפול בתרופה לא

התיעיצות עם הרופא או הרוקח.

אין ליטול תרופה בחושך! בדוק

את התוויות והמנה בכל פעם שהגין

נטול תרופה. הרוב משקפיים אם הין

זדקק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש

בתרופה, הרווחה ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בפרמייקסן

160 מ"ג עלול לגרום לתופעות לוואי

בחולק מהמשתמשים. אל תיחבל למקרה

רישימת תופעות לוואי. ייתכן שלא

הסבול מכך מהן.

תופעות לוואי שכיחות (מופיעות -

1-10 משתמשים מהמשך 100)

•ocab ראש (מיגרנה)

•ocab בען (מיגרנה)

תופעות לוואי שאין שכיחות (מופיעות

ב- 1-10 משתמשים מהמשך 1,000)

•בחילה

•עליה באנגיון גאמ-אלטומיט-

טרנספרואן, עלייה מהותנה באנגיון

טרנסאנטמיינאי (אויזומי הכבד)

•ספרפת (פריחה בעור)

•הגחלת שדיים בגבריהם (גינוקומסטיה) –

הפרק לאחד הסacons השימוש בתרופה

תופעות לוואי שכיחותן רום וקבהעה

(תופעות נפוצות של העור)

•בקתק (נפיכות של העור)

אם הרופעה תופעת לוואי, אם אתה

מתופעות הלואה חממיה, או כאשר

אתה סובל מתופעות לוואי שלא צוננה

בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

דיזוז על תופעות לוואי

ניתן לדוח על תופעות לוואי למשרד

הבריאות באמצעות הרפואות (www.health.gov.il)

המפניו לטופס המukan לדיזוזם על

טופעות לוואי, או י"כ כיסויו לקשרו:

<https://sideeffects.health.gov.il>

בנטשי, ניתן לדוח לחברת פאראיסטי

באמצעות הכתובת הבאה:

Padagis.co.il

5. איך לאחסן את תרופה?

• מגן הרעל! תרופה זו וכל תרופה

ארהית יש לשמור במקום סגור מחוץ

להישג ידים וטוחה רייאיטם של ילדים

/או תינוקות וולד-ידיים כרך מתגען

הרעה. אל תינוקו רקמת הקאה לא לאל

הראה מפושתת מרופאה.

• אין להשמש בתרופה אחרי תאריך

התופה (date of exp.) בטיפות על גביה

האריזה. ואירוע התופה מתיחס ליום

האריזה. ואירועו יתבצע מודש.

• אחסן מתחת ל-25°C.

אין להשאיר תרופה לביביו או לאשפפה

הבריתית. של אלי הרוקח כדי להשליך

תרופות שאין בשימוש עד. אמצעים

אלוי ייריבו בהרגה על הכליבה.

6. מידע נוסף

• נסוף על החומר הפעיל, התרופה

מכילה גם:

Polyethylene glycol 10,000,

Gelatin, Titanium dioxide E171,

Yellow iron oxide E172, Indigotin E132

• כיצד נראה תרופה ומה תוכן

האריזה:

כמושה בעקב יוק בביר.

כמוסה בעקב 30, 60, 56, 100-1

אירועות של הארוות בבליסטרים

כמוסות, הארוות בבליסטרים

(מגשירות).

ייתכן שלא כל גדי הארוות

משמעותם.

• בעל רשות, היובואן וכותבו:

פאראיסטים ישראל סוכנויות בע"מ.

רח' רקפת 1, שוהם.

• נערך במרץ 2023 בהתחם להנחיות

משרד הבריאות.

• מס' רשות הרשות הממלכתית במשרד

הבריאות: 11318.28916

21.03.2023