

نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيدلة (مستحضرات) - 1986

يسوّق هذا الدواء بموجب وصفة طبيب فقط

فاسينرا

محلول للحقن ضمن قلم جاهز للإستعمال

للحقن تحت الجلد

التركيب:

يحتوي كل قلم جاهز للإستعمال (1 ملل) على:

بينراليزوماب 30 ملغ benralizumab 30 mg

للمركبات غير الفعالة، أنظر الفقرة 6 - معلومات إضافية.

إقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل إستعمالك للدواء.

تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، الرجاء راجع الطبيب أو الصيدلي.

وُصف هذا الدواء لعلاج مرضك. لا تعطيه للآخرين. فهو قد يضرهم حتى ولو بدا لك أن مرضهم/حالتهم الطبية مشابه/مشابهة لحالتك.

1. ما هو فاسينرا ولأي غرض مخصص الدواء؟

فاسينرا مخصص للعلاج بمشاركة علاج داعم لدى الكبار الذين يعانون من الربو اليوزيني الخطير، غير المتوازنين، على الرغم من العلاج المشترك بمقادير دوائية مرتفعة من الكورتيكوستيرويدات بالإستنشاق ومقلدات بيتا طويلة المدى.

الفصيلة العلاجية:

ضد وحيد النسيلة ضد المستقبل إنترلوكين 5 (anti-interleukin-5 receptor α monoclonal antibody)

ما هو فاسينرا

فاسينرا عبارة عن دواء يحتوي على المادة الفعالة بينراليزوماب، التي تعتبر ضد وحيد النسيلة، نوع بروتين الذي تم تصميمه ليتعرف ويرتبط بموقع هدف معين في الجسم. إن موقع الهدف الخاص بـ بينراليزوماب هو بروتين الذي يسمى مستقبل إنترلوكين 5، الموجود بشكل خاص على نوع معين من خلايا الدم البيضاء، المسماة الحمضات.

كيف يعمل فاسينرا
إن الحمضات هي نوع من خلايا الدم البيضاء التي تساهم في المسيرة الإلتهابية في الربو.
يرتبط فاسينرا بالحمضات وبذلك يؤدي إلى إنخفاض في عدد الحمضات.
إن الربو اليوزيني عبارة عن نوع من الربو الذي يتميز بارتفاع نسب خلايا الدم البيضاء من نوع الحمضات في الدم أو في الرئتين.

مزايا إستعمال فاسينرا:
يمكن أن يقلل فاسينرا من عدد نويات الربو التي تقاسي منها، يمكنه أن يساعدك على التنفس بشكل أفضل وأن يقلل من أعراض الربو. إذا كنت تستعمل كورتيكوستيرويدات فموية، فإن إستعمال فاسينرا يمكن أن يتيح لك أيضاً تخفيض المقدار الدوائي اليومي أو التوقف عن إستعمال الكورتيكوستيرويدات الفموية اللازمة للسيطرة على المرض.

2. قبل إستعمال الدواء

لا يجوز إستعمال الدواء إذا:

- كنت حساساً لـ بينرايزوماب أو لأحد مركبات الدواء (المفصلة في الفقرة 6). إستوضح من الطبيب، الممرضة أو الصيدلي إذا كنت تعتقد بأن هذا لربما يتعلق بك.

تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال فاسينرا

قبل العلاج بالدواء إحك للطبيب إذا:

- وُجد لديك تلوث طفيلي (ناجم عن طفيل) أو إذا كنت تسكن في منطقة تنتشر فيها التلوثات الطفيلية أو إذا كنت تسافر إلى منطقة كهذه. قد يضعف هذا الدواء من قدرة جسمك على محاربة أنواع معينة من التلوثات الطفيلية.
- حدث لديك في الماضي رد فعل تحسسي لحقنة أو لدواء (أنظر الفقرة 4، للحصول على تفصيل عن أعراض رد الفعل التحسسي).

بالإضافة، يجب إبلاغ الطبيب خلال العلاج إذا:

- ما زال الربو لديك خارج عن السيطرة أو يتفاقم عند العلاج بالدواء.
 - وُجدت لديك أعراض لرد فعل تحسسي (أنظر الفقرة 4). حدثت أعراض تحسسية لدى المتعالجين الذين يتلقون الدواء.
- فاسينرا ليس دواء للتخفيف الفوري. لا يجوز إستعماله لعلاج نوبة ربو مفاجئة.

إنته لعلامات حدوث رد فعل تحسسي خطير

قد يسبب فاسينرا لحدوث رد فعل تحسسي خطير. عليك الإلتباه للعلامات التي تدل على رد فعل

كهذا (مثل شرى، طفح، مشاكل في التنفس، إغماء، دوار، شعور بالدوار و/أو إنتفاخ في الوجه، في اللسان أو في الفم) عندما تكون مُعالَجًا بـ فاسينرا. من المهم أن تتحدث مع طبيبك حول كيفية تشخيص أعراض مبكرة لرد فعل تحسسي خطير وكيفية التصرف في حال حدوث رد فعل تحسسي خطير.

الأطفال والمراهقون

لا يجوز إعطاء فاسينرا لأطفال دون عمر 18 سنة لأنه لا تتوفر معلومات حول سلامة وفعالية استعمال هذا المستحضر لدى هذه الفئة السكانية.

التداخلات/التفاعلات بين الأدوية

إذا كنت تستعمل، أو إذا إستعملت مؤخرًا، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، إحك للطبيب أو الصيدلي عن ذلك. لايجوز التوقف بشكل مفاجئ أو تغيير المقدار الدوائي للأدوية الواقية من الربو لحظة بدئك العلاج بـ فاسينرا. إذا كانت إستجابتك للعلاج بـ فاسينرا تتيح ذلك، فيإمكان طبيبك أن يحاول خفض المقدار الدوائي لبعض الأدوية، خاصة تلك المسماة "كورتيكوستيرويدات". إن التوقف عن استعمال هذه الأدوية (خاصة الكورتيكوستيرويدات)، يجب أن يتم بالتدرج وتحت إشراف مباشر من قبل طبيبك.

الحمل والإرضاع

إذا كنت حاملًا أو مرضعة، إذا كنت تعتقدين بأنك حامل أو إذا كنت تخططين للحمل فإستشيري طبيبك قبل استعمال الدواء.

لا يجوز استعمال فاسينرا خلال فترة الحمل إلا إذا أوصاك الطبيب خلاف ذلك. لا يعرف فيما إذا كان فاسينرا من شأنه أن يلحق الضرر بالجنين. لا يعرف فيما إذا كانت مركبات الدواء تنتقل إلى حليب الأم. إذا كنت مرضعة أو تخططين للإرضاع، فيجب إستشارة الطبيب.

السياقة واستعمال الماكينات

من غير المحتمل أن يؤثر فاسينرا على القدرة على السياقة أو تشغيل الماكينات.

3. كيفية استعمال الدواء؟

يجب دائماً استعمال فاسينرا حسب تعليمات الطبيب. عليك الإستيضاح من الطبيب، أو الصيدلي إذا لم تكن واثقًا بخصوص المقدار الدوائي وطريقة العلاج بالمستحضر.

المقدار الدوائي وطريقة العلاج يحددان من قبل الطبيب فقط.
المقدار الدوائي الموصى به هو حقنة واحدة ذات 30 ملغ. تعطى الحقن الثلاثة الأولى بفواصل ذات 4 أسابيع. بعد ذلك ستتلقى حقنة واحدة ذات 30 ملغ كل 8 أسابيع.
تُعطى فاسينرا بالحقن تحت الجلد فقط. أنت وطبيبك أو الممرضة، يجب عليكم أن تقررُوا ما إذا كان بإمكانك أن تحقن الدواء فاسينرا بنفسك.
لا تحقن فاسينرا لنفسك إذا لم تتلقى في الماضي حقنة فاسينرا، وإذا كان لديك مسبقاً رد فعل تحسسي تجاه فاسينرا.

يجب عليك أنت أو الطاقم الطبي الذي يعالجتك أن تتجاوزا إرشاداً للطريقة الصحيحة لحقن فاسينرا. يجب عليك قراءة "تعليمات الإستعمال للحقن الذاتي" بالكامل، قبل إستعمال فاسينرا.

لا يجوز تجاوز المقدار الدوائي الموصى به.

إذا نسيت إستعمال فاسينرا
إذا نسيت حقن مقدار دوائي من فاسينرا فإتصل بالطاقم الطبي بأسرع ما يمكن.

إذا إستعملت بالخطأ مقداراً دوائياً أكبر أو إذا بلع طفل بالخطأ من الدواء، توجه فوراً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر معك علبة الدواء.

يجب المواظبة على العلاج حسب توصية الطبيب.

التوقف عن إستعمال فاسينرا

لا يجوز التوقف عن العلاج بـ فاسينرا، إلا إذا تلقيت مثل هذه التعليمات من الطبيب. إن التوقف أو عرقلة العلاج بـ فاسينرا قد يؤدي إلى عودة أعراض ونوبات الربو. إتصل بالطبيب إذا تفاقت أعراض الربو لديك عند إستعمال فاسينرا.
إذا توفر لديك أي سؤال حول كيفية إستعمال فاسينرا فيجب التوجه للطبيب، للممرضة أو الصيدلي.

لا يجوز إستعمال أدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتأكد من المقدار الدوائي في كل مرة تستعمل فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.
إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول إستعمال الدواء، إستشر الطبيب أو الصيدلي.

4. الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، إن إستعمال فاسينرا قد يسبب أعراضاً جانبية لدى بعض المستعملين. لا تتدهش من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز ألا تعاني آياً منها.

ردود فعل تحسسية خطيرة

توجه فوراً لتلقي مساعدة طبية إذا كنت تعتقد بأن لديك رد فعل تحسسي.

ردود الفعل هذه يمكن أن تحدث خلال عدة ساعات أو أيام من الحقن.

شروع غير معروف (لا يمكن تحديد الشروع من المعطيات المتوفرة):

• تأق

الأعراض عادة تشمل:

- إنتفاخ في الوجه، في اللسان أو في الفم
- مشاكل في التنفس
- إغماء، دوار، الشعور بدوران (بسبب إنخفاض ضغط الدم)

أعراض جانبية شائعة (من شأنها أن تؤثر على حتى 1 من بين 10 متعالجين):

• ردود فعل تحسسية مفرطة (شرى، طفح)

أعراض جانبية أخرى:

شائعة (من شأنها أن تؤثر على حتى 1 من بين 10 متعالجين):

- صداع
- التهاب البلعوم (حرقة في الحنجرة)
- سخونة (ارتفاع درجة الحرارة)
- ردود فعل في مكان الحقن (مثلاً - ألم، إحمرار، حكة، إنتفاخ في المكان الذي تم فيه الحقن)

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقم إحدى الأعراض الجانبية أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة، عليك إستشارة الطبيب.

التبليغ عن أعراض جانبية

بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "تبليغ عن أعراض جانبية عقب علاج دوائي" الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يوجهك إلى النموذج المباشر للتبليغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق تصفح الرابط:

<https://sideeffects.health.gov.il>

5. كيفية تخزين الدواء؟

- تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي ومجال رؤية الأطفال و/أو الرضع، وذلك لتفادي إصابتهم بالتسمم. لا تسبب التقيؤ

- بدون تعليمات صريحة من الطبيب.
- فاسينرا هو للإستعمال لمرة واحدة فقط.
- يُحفظ ما بين 2-8 درجات مئوية (في البراد). إذا لزم الأمر يمكن حفظ فاسينرا في درجة حرارة الغرفة (حتى 25 درجة مئوية) لمدة أقصاها 14 يوماً. بمجرد إخراج البراد، يجب إستعمال فاسينرا في غضون 14 يوماً أو رميه. يجب تدوين تاريخ الإخراج من البراد على العلبة.
- يجب حفظ فاسينرا في العلبة الأصلية لحمايته من الضوء.
- لا يجوز الخض، التجميد أو تعريضه للحرارة.
- لا يجوز إستعمال الدواء بعد إنقضاء تاريخ الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على ظهر العلبة. يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر. في أية حالة للشك، عليك إستشارة الصيدلي الذي صرف لك الدواء.
- لا يجوز تخزين أدوية مختلفة في نفس العلبة.
- لا يجوز رمي أي دواء إلى المجاري، يجب إستشارة الصيدلي عن كيفية التخلص من أدوية لم تعد قيد الإستعمال.

6. معلومات إضافية

يحتوي الدواء بالإضافة للمادة الفعالة أيضاً على:

Water for injection, α,α -trehalose dihydrate, L-histidine hydrochloride monohydrate, L-histidine and polysorbate 20.

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العلبة؟

فاسينرا عبارة عن محلول عديم اللون حتى أصفر. قد يحتوي المحلول على جسيمات. فاسينرا متوفر ضمن علبة تحتوي على قلم واحد جاهز للإستعمال.

المنتج:

كتلنت إينديانا LLC، 1300 ساوث باتيرسون درايف، بلومينجتون، إينديانا 47403، الولايات المتحدة.

صاحب الإمتياز والمستورد:

أسترازينيكا (إسرائيل) م.ض.،

شارع عتيري يداع 1، كفار سابا 4464301.

رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة: 160-82-35371-00

تم إعدادها في كانون الثاني 2023 بموجب تعليمات وزارة الصحة.

من أجل سهولة وتهوين القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكر، إن الدواء مخصص لكلا الجنسين.

تعليمات الإستعمال للحقن الذاتي

فاسينرا

محلول للحقن ضمن قلم جاهز للإستعمال

يحتوي كل قلم جاهز للإستعمال (1 ملل) على:

بينراليزوماب 30 ملغ benralizumab 30 mg

للحقن تحت الجلد

قلم جاهز للإستعمال لمرة واحدة

قبل إستعمال قلم فاسينرا، سيوضح أحد أفراد الطاقم الطبي لك أو لشخص يساعدك كيفية إستعمال القلم بشكل صحيح.

يجب قراءة "تعليمات الإستعمال للحقن الذاتي" قبل البدء في إستعمال قلم فاسينرا لأول مرة وقبل كل إستعمال. قد تكون هناك معلومات جديدة. المعلومات التي تظهر هنا لا تحل محل الحاجة إلى التحدث مع الطبيب المُعالج بشأن حالتك الطبية أو علاجك. تحدث مع طبيبك المُعالج، إذا توفرت لديك أو للشخص الذي يساعدك أي أسئلة.

معلومات هامة

يجب تخزين فاسينرا في البراد في درجة حرارة تتراوح بين 2-8 درجات مئوية في العلبة الأصلية إلى أن تكون مستعداً لإستعمال الدواء. إذا لزم الأمر، يمكن حفظ فاسينرا في درجة حرارة الغرفة (حتى 25 درجة مئوية) لمدة أقصاها 14 يوماً. بعد إخراج فاسينرا من البراد، يجب الإستعمال في غضون 14 يوماً أو التخلص منه.

لا تستعمل قلم فاسينرا إذا:

- تم تجميد القلم أو تجمد السائل في القلم
- سقط القلم أو تضرر
- ختم العلبة تضرر
- إنقضى تاريخ إنتهاء صلاحية الدواء.

لا يجوز خض القلم الجاهز للإستعمال.

لا يجوز مشاركة أي شخص أو معاودة إستعمال القلم الجاهز للإستعمال.

إذا حدث إحدى الحالات الموصوفة أعلاه، فيجب رمي القلم في حاوية مقاومة للأغراض الحادة وإستعمال قلم جاهز للإستعمال جديد.

يحتوي كل قلم فاسينرا الجاهز للإستعمال على مقدار دوائي واحد من فاسينرا للإستعمال لمرة واحدة فقط.

يجب حفظ فاسينرا وكل دواء آخر بعيداً عن متناول أيدي ومجال رؤية الأطفال.


القلم الجاهز للإستعمال

لا تقم بإزالة الغطاء إلى أن تصل إلى الخطوة 6 من تعليمات الإستعمال هذه وتكون مستعداً لحقن فاسينرا.

قبل الإستعمال

بعد الإستعمال


نافذة العرض



غطاء

سائل
الدواء

ملصقة مع
تاريخ إنتهاء
الصلاحية



واقى
الإبرة

مكبس
أخضر

الخطوة 1 - نظم المعدات

- 1 • قلم جاهز للإستعمال من البراد
- 1 • ضماد كحولي
- 1 • قطن أو شاش
- 1 • حاوية مقاومة للأغراض الحادة (يرجى الإطلاع على الخطوة 10 - التخلص من القلم المستعمل بأمان)



قلم فاسينرا



ضماد كحولي



قطن أو شاش



حاوية مقاومة
للأغراض الحادة

الخطوة 2 - جهّز قلم فاسينرا للإستعمال

إفحص تاريخ إنتهاء صلاحية القلم (EXP). لا تستعمل القلم إذا انقضى تاريخ إنتهاء الصلاحية.




قبل الحقن، دع القلم يبلغ درجة حرارة الغرفة (بين 20 ل 25 درجة مئوية) من خلال ترك علبة الكرتون خارج البراد لمدة 30 دقيقة تقريباً.

لا تسخن القلم بأي طريقة أخرى. مثلاً، لا يجوز تسخينه في الميكروويف، بالماء الساخن، أو وضعه بالقرب من أي مصادر حرارة أخرى. يجب إستعمال قلم فاسينرا في غضون 14 يوماً من وقت إخراجها من البراد. لا تقم بإزالة الغطاء إلى أن تصل إلى الخطوة 6.

الخطوة 3 - إفحص السائل في القلم الجاهز للإستعمال


أنظر إلى السائل من خلال نافذة العرض في القلم. يجب أن يكون السائل في القلم رائقاً وعتيم اللون حتى أصفر. من الجائز أن يحتوي السائل في القلم على جزيئات بيضاء صغيرة. لا تستعمل قلم فاسينرا الجاهز للإستعمال إذا كان السائل في القلم عكراً، إذا كان لونه مختلفاً عما وُصف أعلاه أو إذا كان يحتوي على جزيئات كبيرة. قد تلاحظ وجود فقاعة هواء صغيرة في السائل الموجود في القلم. هذا سليم. ليست هناك حاجة للقيام بأي شيء حيال ذلك.



الخطوة 4 - اختر موقع الحقن


- مكان الحقن الموصى به هو الجزء الأمامي من فخذك.
- يمكنك أيضاً الحقن في الجزء السفلي من بطنك.
- لا تحقن في حدود حتى 5 سنتيمترات من سرتك.
- لا تحقن في منطقة يكون فيها الجلد حساساً، مصاباً، حرقشفي أو قاسي.
- لا تحقن في ندبة أو جلد تالف.
- لا تحقن من خلال الثياب.

يمكن الحقن في أعلى الذراع، في الفخذ أو في البطن في حال تم إجراء عملية الحقن من قبل شخص آخر. لا تحاول حقن نفسك في الذراع. لكل عملية حقن، اختر موقع حقن مختلفًا يتواجد على بعد لا يقل عن 3 سنتيمترات من موقع الحقن الأخير.



الخطوة 5 - نظّف موقع الحقن


اغسل يديك جيدًا بالماء والصابون.
نظّف منطقة الحقن بواسطة ضماد كحولي في حركة دائرية. دع المنطقة تجف.
لا تلمس المنطقة التي نظفتها قبل الحقن.
لا تجفف المنطقة بواسطة الزفر أو أي تهوية.



الخطوة 6 - قم بإزالة الغطاء


أمسك جسم القلم بيد واحدة، واسحب الغطاء بحذر وبشكل مستقيم بواسطة يدك الأخرى.
ضع الغطاء جانبًا للتخلص منه لاحقًا.
واقى الإبرة الأخضر مكشوف الآن. الغرض منه هو منعك من لمس الإبرة.
لا تحاول لمس الإبرة أو دفع واقى الإبرة الأخضر بأصبعك.

لا تحاول إعادة الغطاء لمكانه في قلم فاسينرا. فقد تقوم بتشغيل الحقن في القلم قبل الأوان أو تضر الإبرة.
أكمل الخطوات التالية حالاً بعد إزالة الغطاء.




الخطوة 7 - إحقن الدواء فاسينرا

إتبع التعليمات التي تلقيتها من أحد أفراد الطاقم الطبي حول كيفية الحقن. يمكنك قرص الجلد بلطف في منطقة الحقن أو الحقن دون قرص الجلد في منطقة الحقن.
إتبع التعليمات المفصلة في الصور التالية 1، 2، 3 و- 4 من أجل حقن الدواء فاسينرا.
أمسك القلم الجاهز للإستعمال في المكان طوال عملية الحقن.
لا تغير وضعية مسك القلم بعد بدء عملية الحقن.




وضعية القلم في منطقة الحقن


1. ضع واقي الإبرة لقلم فاسينرا بشكل مسطح على سطح الجلد (بزواوية 90 درجة). تأكد أنه بإمكانك رؤية نافذة العرض.



2. إضغط بقوة نحو الأسفل. ستسمع "طقة". تؤشر هذه "الطقة" بأن عملية الحقن قد بدأت. سيتحرك المكبس الأخضر نحو الأسفل في نافذة العرض خلال عملية الحقن.




3. إمسك بقوة نحو الأسفل لمدة 15 ثانية. ستسمع "طقة" ثانية. تؤشر الطقة الثانية بأن عملية الحقن قد إنتهت. سيملاً المكبس الأخضر كل نافذة العرض.



4. إرفع قلم فاسينرا بشكل مستقيم. سينزلق واقي الإبرة نحو الأسفل، سيغطي الإبرة ويثبت في مكانه.

الخطوة 8 - إفحص نافذة العرض



إفحص نافذة العرض للتأكد أنه تم حقن كل سائل الدواء. في حال أن المكبس الأخضر لا يمتلأ كل نافذة العرض، من الجائز أنك لم تقم بحقن كل المقدار الدوائي من الدواء. إذا حدث ذلك، أو إذا توفرت لديك أسئلة أخرى، إتصل بطبيبك.


قبل الحقن



بعد الحقن

الخطوة 9 - إفحص موقع الحقن

قد تلاحظ بقليل من الدم أو السائل في موقع الحقن. هذا سليم. إضغط بلطف على موقع الحقن بواسطة القطن أو الشاش حتى يتوقف النزيف. لا تفرك منطقة الحقن. إذا لزم الأمر، قم بتغطية موقع الحقن بواسطة لصقة (بلاستر)



الخطوة 10 - التخلص من القلم المستعمل بأمان

- يحتوي كل قلم فاسينرا الجاهز للإستعمال على مقدار دوائي واحد ولا يمكن إستعماله مرة أخرى.
- أدخل القلم المستعمل في حاوية مقاومة للأغراض الحادة مباشرة بعد الإستعمال. لا ترم القلم المستعمل في سلة النفايات المنزلية. إرم الغطاء والمعدات الإضافية في سلة النفايات المنزلية.



تخلص من الحاوية المقاومة للأغراض الحادة وفقاً للتعليمات التي قدمها لك الطبيب أو الصيدلي. لا تقم بإعادة تدوير الحاوية المقاومة للأغراض الحادة.

من أجل سهولة وتهوين القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكر، إن الدواء مخصص لكلا الجنسين.