

## עלון לצריכן לפי תקנות הרוקחים (תקשיירים) התשמ"ז-1986

התרופה משווקת על ידי מרשם רופא בלבד

**בימצלאס 160 מ"ג/מ"ל**

**תמיישה להזרקה תת-עורית**

החומר הפעיל:

כל עט מוקן להזרקה מכיל 160 מ"ג בימקיזומאב (bimekizumab) ב-1 מ"ל.  
לשימוש החומרים הבלתי פיעלים בתכשיר, אנא ראה פרק 6: "מידע נוספת".

קרא בעיון את העalon עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

תרופה זו גורשמה לטיפול בעורך. אל תעבור אותה לאחרים. הוא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מצבם הרפואית דומה.

### 1. למה מיועדת התרופה?

בימצלאס מיועד לטיפול בספחota (פסורייזיס) רובדיית בינוונית עד חמורה, במוגרים שימושדים לטיפול סיטמי.

**קבוצה רפואייתית:** מכך אינטראולוקן.

בימקיזומאב פועל על ידי הפחתת פעילות שני חלבונים הנקראים A17-IL1α ו-NF-1α, המעורבים ביצירת דלקת.

קימות רמות גבוהות יותר של חלבונים אלה במחלות דלקתיות כמו פסורייזיס.

### 2. לפני השימוש בתרופה:

אין להשתמש בתרופה אם:

- אתה רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל בימקיזומאב או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה.  
(ראה סעיף 6).
- יש לך זיהום, כולל שחפת (tuberculosis), שלדעת הרופא שלך הינו משמעותי.

**اذירות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה:**

**לפני הטיפול בבימצלאס, ספר לרופא אם:**

- יש לך זיהום או שאתה סובל מזמן ממוחזרים.
- קיבלת לאחרונה או שאתה מתכוון לקבל חיסון. עליך להימנע מקבלת חיסונים מסוימים (חיסונים חיים) במהלך השימוש בימצלאס.
- הייתה לך אי פעם שחפת.
- הייתה לך אי פעם מחלת מעיים דלקטיבית (קרוון או קוליטיס כיבית).

**מחלה מעיים דלקטיבית (קרוון או קוליטיס כיבית)**

הפסיק להשתמש בימצלאס וספר לרופא שלך או פנה לקבלת סיוע רפואי באופן מיידי אם אתה מבחין בדם בצוואה, התכווצויות בטנו, כאב, שלשול או ירידת במשקל. אלו עשויים להיות סימנים למחלת מעיים דלקטיבית (קרוון או קוליטיס כיבית) חדשה או החמורה שלו.

**שים לב לדלקת ותגובה אלרגיות**

בימצלאס יכול לעיתים נדירות לגרום לזרמי חמורים. שוחח עם הרופא שלך או פנה לקבלת סיוע רפואי **באופן מיידי** אם אתה מבחין בסימנים כלשהם של דלקת חמורה. סימנים אלה מפורטים תחת "תופעות לוואי חמורות" בסעיף 4.

בימצולקס עשוי לגרום לתגובה אלרגיות חריפות. שוחח עם הרופא שלך או פנה לקבלת סייע רפואי **באופן מיידי**. אם אתה מבחין בסימנים כלשהם של תגובה אלרגית חריפה. סימנים אלה עשויים לכלול:

- קושי בൺימה או בבליעה.
- לחץ דם נמוך, שיכל לגרום לך לסתורחות.
- נפיחות של הפנים, השפתיים, הלשון או הגרון.
- גרד חמוץ של העור, המלווה בפריחה אדומה או בנגע עור מורמיים.

#### **ילדים ומתבגרים**

אין לתת תרופה זו לילדים וצעירים מתחת לגיל 18. לא קיים מידע לגבי בטיחות ויעילות השימוש בתכשיר זה בילדים ומתבגרים.

#### **אינטראקציות/ תגובה בין תרופתיות:**

אם אתה לוקחת, או אם לוקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.

#### **הריון, הנקה ופוריות:**

אם את בהריון, חשבת שאת עשויה להיות בהריון או מתכוננת להרות, היועצי עם הרופא בטרם שימוש בתרופה. רצוי להימנע משימוש בביומצולקס בהריון. זאת כיוון שלא ידוע כיצד תרופה זו תשפיע על התינוק.

אם את אישה בגיל הפוריות, שעשויה להרות, עליך להשתמש באמצעות מנעה במהלך השימוש בתרופה זו ובמשך 17 שבועות לפחות לאחר המנה האחורה של ביומצולקס.

אם את מניקת או מתכוננת להניק, שוחח עם הרופא שלך בטרם שימוש בתרופה. את והרופא שלך צריכים להחליט האם את יכולה להניק או להשתמש בביומצולקס.

#### **ניגזה ושימוש במכונות:**

במיולקס אין או יש השפעה זניחה על יכולת נהוג ולהשתמש במכונות.

#### **מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה:**

תרופה זו מכילה פחות מ-1 מילימול (23 מ"ג) נתרן במנה, כלומר הינה למעשה "נטולת נתרן".

#### **3. כיצד תשתמש בתרופה?**

יש להשתמש בתכשיר תמיד בהתאם להוראות הרופא.

עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אין בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר.

המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד. המינון המקביל בדרך כלל, הניתן ציריקה מתחת לעור שלך (ציריקה תת עורית) הוא כדלהלן:

- 320 מ"ג (ניתן באמצעות שני עיטים מוכנים להזרקה, המכילים 160 מ"ג כל אחד) בשבועות 0, 4, 8, 12, 16.
- בשבוע 16, תשתמש ב-320 מ"ג (שני עיטים מוכנים להזרקה, המכילים 160 מ"ג כל אחד) כל 8 שבועות. אם אתה שוקל מעל ל-120 ק"ג, הרופא שלך עשוי להחליט להמשיך במשך 4 שבועות.

#### **אין לעורו על המנה המומלצת.**

אתה והרופא שלך או האחות תחלתו האם אתה-Amour להזריק תרופה זו בעצמך. אל תזריק תרופה זו אלא אם קיבלת הדריכה על ידי איש צוות רפואי. גם מטפל יכול להזריק לך לאחר קבלת הדריכה.  
קרא את 'הוראות השימוש' בסוף עליון זה לפני שתזריק ביומצולקס בעט מוקן להזרקה לעצמך.

#### **אם נטלה בטעות מינון גבוהה יותר**

ספר לרופא שלך אם השתמשת ביוטר בימיולקס מהנדרש או שהזרקת את המנה שלך מוקדם מהנדרש.

#### **אם שכחת ליטול את התרופה**

שוחח עם הרופא אם שכחת להזריק מנה של ביומצולקס.

יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא. גם אם חל שיפור במצב בריאותך, אין להפסיק את הטיפול בתרופתך ללא התיעצות עם הרופא.

#### אם אתה מפסיק את נטילת התרופה

שוחח עם הרופא לפני שתפסיק להשתמש בבימולקן. אם תפסיק את הטיפול, תסמייני הפסוריאזיס שלך עשויים לחזור.

**אין ליטול תרופות בחושך!** בדוק את התווית והמנה **בכל פעע שהן נוטל תרופה.** הרכיב משקפיים אם הנן זרוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופת זו, הייעוץ ברופא או ברוקח.

#### 4. תופעות לוואי:

כמו בכל תרופה, השימוש בבימולקן עלול לגרום לתופעות לוואי בחלוקת מה משתמשים. אל תיבהל למקרא רשותת תופעות הלואו. יתרן ולא מסבול מכך אחת מהן.

**אם הופעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלואו מחרמיה או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא ציינה בעלון, עלייך להתייעץ עם הרופא.**

#### תופעות לוואי חמורות

ספר לרופא שלך או פנה לקבלת סיוע רפואי באופן מיידי אם מופיעה אחת מתופעות הלואו הבאות:

**זהום חמור אפשרי** - התסמינים עשויים לכלול:

- חום, תסמים דמוני שפעת, הדעות לילה.
- תחושת עייפות או קוצר נשימה, שיעול שאינו חולף.
- עור חם, אדום וכואב למגע, או פריחת כואבת בעור עם שלפוחיות.

הרופא שלך יחליט האם תוכל להשתמש בבימולקן.

#### תופעות לוואי אחרות

ספר לרופא שלך, לרוקח או לאחות אם אתה חווה אחת מתופעות הלואו הבאות:

**תופעות לוואי שכיחות מאוד (common) –** – תופעות שימושיות ביותר המשמש אחד מעשרה

- זהום בדרכי הנשימה העליונות המלאה בתסמים כגון כאב גרון וגודש באף.

**תופעות לוואי שכיחות (common) –** – תופעות שימושיות ב-10-1 משתמשים מתוך 100

- פטריה בפה או בגרון המלאה בתסמים כמו כתמים לבנים או צהובים; אדמומיות או כאב בגרון וכאב בבליעה.

זהום פטרית בעור, למשל פטרת כף הרגל בין אצבעות הרגליים.

זהומיים באוזן.

פצעי קור (זהומי הרפס סימפלקס).

דלקת הקיבה והמעיים (gastroenteritis).

זקיקי שער דלקתיים שעשוים להויראות כמו פצעוניים.

כאב ראש.

עור יבש ומגרד או פריחה דמוית אקזמה המלאה לעיתים בעור נפוח ואדמוני (דרמטיטיס-דלקת בעור).

אקנאה.

אדמומיות, כאב או נפיחות באתר ההזרקה.

תחושת עייפות.

**תופעות לוואי שאין שכיחות (uncommon) –** – תופעות שימושיות ב-10-1 משתמשים מתוך 1000

רמות נמוכות של תא דם לבנים (נוירופניה).

זהומיים פטריתיים בעור ובקרקמות ריריות (כולל קנדידזה בוושט).

הפרשה מהעין המלאה בגדר, אדמומיות ונפיחות (דלקת החלמית).

דם בצוואה, התכווצויות בטניות וכאב, שלשול או ירידת במשקל (סימנים לביעות בעיים).

## **דיווח על תופעות לוואי**

ניתן לדוח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על ה קישור "דוח על תופעות לוואי" עקב טיפול רפואי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות ([www.health.gov.il](http://www.health.gov.il)) המפנה לטופס המくん לדוח על תופעות לוואי, או ע"י כניסה לקישור: <https://sideeffects.health.gov.il> ועל ידי שליחת דואר אלקטרוני ליחידה לבטיחות מטופלים של בעל הרישום ב: [drugsafety@neopharmgroup.com](mailto:drugsafety@neopharmgroup.com).

## **5. כיצד לאחסן את התרופה?**

מנע הרעללה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים /או תינוקות ועל ידי כך תמנع הרעללה. אל תגרום להקהה ללא הוראה מפורשת מרופא.

אין לשימוש בתרופה לאחר תאריך התוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התוגה מתיחס ליום האחרון של אותו החודש.

יש לאחסן במקror (C<sup>°</sup> – 8 – 2). אין להקפיא.

יש לשמר את העט המוקן להזרקה באירוע הקרטון החיצונית על מנת להגן מאור.

יש לאחסן את העט המוקן להזרקה בטמפרטורת החדר ( מתחת ל- C<sup>25</sup>) למשך עד 25 ימים לכל היוטר תוך הגנה מאור. לאחר הוצאה מהמקror ואחסן בתנאים אלה, יש להיפטר מהתקשר לאחר 25 ימים או עד לתאריך התוגה המוטבע על האריזה, המוקדם מבין השניים. יש מקום על האריזה בו תוכל לכתוב את התאריך שבו הוצאה מהמקror.

אין להשליך תרופות לביב או לפח אשפה ביתית. שאל את הרוקח שלך כיצד יש להשליך תרופות שאין עוד בשימוש. אמצעים אלו יסייעו להגן על הסביבה.

## **6. מידע נוספת**

### **נוסך על המרכיב הפעיל, התרופה מכילה גם:**

glycine, sodium acetate trihydrate, glacial acetic acid, polysorbate 80 and water for injections.

### **כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:**

בימזלקס היא נוזל צלול עד מעט עכור וצהוב-חום בהיר. מגיעה בתוך עט מוקן להזרקה לשימוש חד פעמי.

בימזלקס זמין בamarzhim המכילים 2 עיטים מוכנים להזרקה.

יצור: יוסיבי פארמה S.A, Braine l'Alleud, Belgia.

בעל רישום: ניאופרム בע"מ, רחוב השילוח 6, ת.ד. 7063, פתח-תקווה 4917001.

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות: 00-37409-46-172.

אישור במרץ 2023.


לשם הפשטות ולהקלת הקיריה, עלון זה נוסח בלשון ذכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.

Bimzelx sol for inj PIL vs 01A

## **הוראות שימוש**

קרא את כל ההוראות של להלן לפני השימוש בימצלאקס.

mbut כולל על בימצלאקס בעט מוקן להזרקה (ראה איור א):



### **מידע חשוב:**

- איש הוצאות הרפואי יראה לך כיצד להרכיב ולזרוק בימצלאקס תוך שימוש בעט מוקן להזרקה.
- אל תזריק לעצמך או למשחו אחר עד שיראו לך כיצד להזריק בימצלאקס בצוואר הנכונה.
- אתה ו/או המטפל שלך צריכים לזכור את ההוראות שימוש אלה לפני כל שימוש בימצלאקס.
- צור קשר עם איש צוות רפואי אם יש לך או למטפל שלך שאלות כלשון בנוגע לאופן הזרקת בימצלאקס בצוואר הנכונה.
- כדי לקבל את המנה המלאה שלך, תצטרכן להשתמש ב-2 עטי בימצלאקס מוכנים להזרקה, אחד אחריו השני.

**אל תשימוש בתרופה זו והחדר אותה לבית המרקחת אם:**

- תאריך התפוגה (EXP) עבר.
- סוג אריזת הקרטון שבור.
- העט המוקן להזרקה נפל או נראה שבור.
- הנזול או פעם הוקפא (אפילו אם אפשר).

**להזרקה נוחה יותר:** הוציא את העטים המוכנים להזרקה מהמקרר והנח אותם על משטח ישיר בטמפרטורת החדר למשך **30 עד 45 דקות לפני ההזרקה**.

- אין לחםם בכל דרך אחרת, למשל במיקרוגל או במים חמים.
- אין לנגר את העטים המוכנים לשימוש.
- אין להוריד את המכסה מהעטים המוכנים להזרקה עד אשר אתה מוקן להזריק.

**עקבות אחר השלבים המצוינים מטה בכל פעם שאתה משתמש בביומצלאקס.**

### **שלב 1: הכנה להזריקות שלך**

**הנח את הפריטים הבאים על משטח עבודה נקי, ישר ומואר היטב, למשל שולחן:**

- 2 עטי בימצלאקס מוכנים להזרקה
- תצטרכן גם (לא כולל באריזת הקרטון):
  - 2 פדי אלכוהול
  - 2 כדורי צמר גפן נקיים
- 1 מיליל לפסולת חדה. ראה "השלכת עט מוקן להזרקה בימצלאקס לאחר השימוש" בסוף ההוראות שימוש אלה.

התחל עם עט מוקן להזרקה אחד עברו הזריקה הראשונה. למנה מלאה, אתה זקוק ל-2 זריות, אחת אחרי השניה.


### **שלב 2: בחר את אתר ההזרקה והכן את הזריקה שלן**

#### **2א: בחר את אתר ההזרקה שלן**

- המקומות בהם תוכל לבחור עבור ההזרקה הם:

◦ בטן שלך או ירך (ראה איור ב).

◦ ניתן גם להשתמש בחלק האחורי של הזרוע שלך אם מטפל נותן לך את הזריקה (ראה איור ג).



אין להזrik לתוך אזורים בהם העור עדין, חבול, אדום, קשקי, קשה או אזורים עם צלקות או סימני מתיחה.

אין להזrik במרחק של עד 5 ס"מ ממרכז הבطن (טבור).

יש להשתמש במקומות שונים בכל זריקה. אין להשתמש באותו מקום להזרקה פעמיים ברצף.

#### **2ב: שטוף את ידייך עם סבון ומים ויבש באמצעות מגבת נקייה**

#### **2ג: הcn את העור שלן**

נקה את אזור ההזרקה באמצעות פד אלכוהול. הנה לאזרור להתייבש לחלווטי. אין לגעת שוב באזור הנקי לפני ההזרקה.


#### **2ד: בדוק את העט המוכן להזרקה (ראה איור ד)**

וודא שהשם בימצלאס ותאריך התפוגה מופיעים על התווית.

בחן את התרופה דרך חלונית התצוגה. בימצלאס היא נוזל צלול עד מעט עכור וצהוב-חום בהיר. אתה

עשוי לראות בועות אויר בโนזל. זה תקין.


אין להשתמש בימצלאס עט מוקן להזרקה אם התרופה עכורה, שינוי צבע או יש בה חלקיקים.




### **שלב 3: הזרק בימצלאות**

#### **3א: הסר את מכסה העט המוון להזרקה**


- אחוז בעט המוון להזרקה בחזקה סיבב ידית האחיזה עם יד אחת. משור את המכסה בצורה ישירה הרחק מהעט המוון להזרקה באמצעות היד השנייה (ראה איור ה). למרות שאתה לא יכול לראות קצת מהחט, היאicutת נחשפה.
- אין לגעת במגן המחט או להחזיר את המכסה. זאת כיון שהדבר עשוי להפעיל את העט המוון להזרקה ואתה עשוי לדקור את עצםך.



**3ב: אחוז את העט המוון להזרקה בזווית של 90 מעלות לאותו ההזרקה הנוכחי (ראה איור ו)**



- 3ג: מיקם את העט המוון להזרקה באורה ישרה כנגד העור, ואז לחץ בחזקה את העט המוון להזרקה כלפי מטה כנגד העור שלך.**
- תשמע צליל "קליק". ההזרקה תחל לאחר הישמעו ה"קליק" הראשון (ראה איור ז).
- אין להרים את העט המוון להזרקה הרחק מהעור.



- 3ד: המשך להחזיק את העט המוון להזרקה במקום ולחץ בחזקה כנגד העור שלך**
- תשמע "קליק" שני בטור כ-15 שניות לאחר הקлик הראשון.
  - הקлик השני אומר לך של התروفה הזרקה והזרקה הסטיימה. תוכל לראות את הסמן בעל הצבע הצהוב ממלא את חלונית התצוגה (ראה איור ח).




**3ה: הסר את העט המוכן להזרקה על-ידי משיכתו הזרירה ישירות מעלה הרחק מהעור שלך. מגן המחתicas אוטומטית את המחת**

- ליחז כדור צמר גוף יבש על פני אתר ההזרקה למשך מספר שניות. אין לשפשף את אתר ההזרקה. יתכן שתוראה דימום קל או טיפת נוזל. זה תקין. תוכל לססות את אתר ההזרקה באמצעות אגד מדבק קטן, אם יש צורך.

#### שלב 4: השלחת עט מוכן להזרקה בימדליך לאחר השימוש

הנח את העט המוכן להזרקה המשומש במיכל לפסולת חדה מיד לאחר השימוש (ראה איור ט).



עבור הזריקה השנייה של המנה שנרשמה לך, השתמש בעט **בימדליך** מוכן להזרקה חדש, וחזרו על **שלבים 2 עד 4**.

הקפיד לבחור אתר הזרקה חדש עבור הזריקה השנייה שלך.