

نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيدالوية (مستحضرات) - 1986
بُسوق الدواء وفق وصفة طبيب فقط

إبينفرين حقنة ميلان 0.3 ملغ

إبينفرين حقنة ميلان جي. آر 0.15 ملغ

محلول للحقن بمحقنة آلية

المادة الفعالة

يحتوي إبينفرين حقنة ميلان 0.3 ملغ على جرعة واحدة تعادل 0.3 ملغ إبينفرين (0.3 مل) في محلول معقم.

(epinephrine 0.3 mg/0.3 mL)

يحتوي إبينفرين حقنة ميلان جي. آر 0.15 ملغ على جرعة واحدة تعادل 0.15 ملغ إبينفرين (0.3 مل) في محلول معقم.

(epinephrine 0.15 mg/0.3 mL)

المواد غير الفعالة والمثيرة للحساسية: انظر الفصل 6 "معلومات إضافية".

اقرأ النشرة للمستهلك بتمعن حتى نهايتها وذلك قبل البدء باستخدام الدواء.

تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا كانت لديك أسئلة إضافية فتوجه إلى الطبيب أو إلى الصيدلي.
اقرأ النشرة بتمعن في كل مرة تقتني بها حقنة جديدة. قد تحتوي النشرة على معلومات جديدة. يجب عليك التأكد من أنك، الوالدين أو المعالج، تفهمون الاستطبايات وكيفية استعمال الحقنة بشكل صحيح قبل حدوث رد فعل تحسسي حاد - تأق.
وصف هذا الدواء من أجلك. لا تعطه للآخرين؛ لأنه قد يضر بهم، حتى لو بدا لك أن حالتهم الطبية مشابهة لك.

1. لم أعد الدواء؟

إبينفرين حقنة ميلان 0.3 ملغ / إبينفرين حقنة ميلان جي. آر 0.15 ملغ مخصصان للعلاج الطارئ بردود فعل تحسسية وخيمة (نوع 1)، بما في ذلك تأق للحشرات اللاذعة (على سبيل المثال، سلسلة غشائيات الأجنحة، والتي تشمل النحل، الدبابير، الدبور الشرقي، دبور السترة الصفراء-yellow jackets والنمل الناري) وللحشرات العاصة (على سبيل المثال، بق الفراش الماص للدم، البعوض)، للعلاج بالمداواة المناعية لمسببات الحساسية، للطعام، للأدوية، للمواد في الاختبارات التشخيصية (على سبيل المثال، عوامل التباين في اختبارات التصوير الشعاعي) ولمسببات حساسية أخرى، وكذلك لعلاج تأق لسبب غير معروف (مجهول السبب) أو تأق بسبب نشاط بدني.

إبينفرين حقنة ميلان 0.3 ملغ / إبينفرين حقنة ميلان جي. آر 0.15 ملغ مخصص للإعطاء الفوري لدى متعالجين تم تحديدهم على أنهم عرضة لخطر متزايد لتأق، بما في ذلك أشخاص لديهم تاريخ من ردود فعل تأقية.

إبينفرين حقنة ميلان 0.3 ملغ / إبينفرين حقنة ميلان جي. آر 0.15 ملغ مخصص للإعطاء الفوري كعلاج داعم طارئ فقط، ولا يشكل بديلاً عن علاج طبي فوري.

المجموعة العلاجية: ينتمي إبينفرين إلى المواد التي تعمل من خلال مستقبلات أدرينالية ودوپامينية الفعل.

قد تحدث صدمة تأقية في غضون دقائق وتكون مهددة للحياة. تشمل الأعراض التي قد تتطور أثناء رد فعل تأقي ما يلي:
صعوبات في التنفس

صفير

بحة في الصوت (الصوت يبدو مختلفاً)

شرى (طفح جلدي أحمر مرتفع قد يسبب حكة)

حكة شديدة

تورم الوجه، الشفتين، الفم أو الحلق

طفح جلدي، احمرار أو تورم

ضربات قلب قوية

نبض ضعيف

شعور حاد بالقلق

ارتباك

ألم في البطن

فقدان السيطرة على التبول أو حركات الأمعاء
إسهال، أو تشنجات في البطن
دوخة، إغماء.

2. قبل استعمال الدواء

خذ حقنة الإبينفرين معك لكل مكان، لأنك لا تعرف متى قد يحدث حدث تأقي.

تحدث إلى طبيبك إذا كنت بحاجة إلى عبوات إضافية لحفظها في مكان العمل، المدرسة أو أماكن أخرى.
أخبر عائلتك، وأولئك الذين يعالجونك وآخرين أين يتم تخزين المحقنة، وكيفية استعمالها. في حالة حصول حدث تأقي، قد تكون في موقف لن تكون قادرا فيه على الكلام.

لمنع تفاقم الوضع، إذا كنت قد تعرضت لأي من العوامل المذكورة في دواعي الاستعمال أو ظهرت لديك علامات و/أو أعراض:

- يجب استعمال إبينفرين حقنة ميلان 0.3 ملغ أو إبينفرين حقنة ميلان جي. آر 0.15 ملغ فوراً عندما يتطور رد فعل تحسسي وخيم.
- يجب التوجه فوراً إلى أقرب مستشفى أو عيادة لمواصلة العلاج. الحقن الفوري لا يشكل بديلاً عن العلاج الطبي، ولكنه يستعمل فقط كإسعاف أولي حتى تصل إلى أقرب طبيب أو مستشفى لمواصلة العلاج. قد يتوجب عليك استعمال إبينفرين حقنة ميلان 0.3 ملغ أو إبينفرين حقنة ميلان جي. آر 0.15 ملغ ثانياً إذا استمرت الأعراض لديك أو تكررت. يمكن للطبيب فقط إعطاء جرعات إضافية من الإبينفرين إذا كنت بحاجة إلى جرعات إضافية لنفس الحدث.
- إذا دعت الحاجة، فم بالحقن من خلال الألبسة.

في حالات الخطر على الحياة، ليست هنالك موانع لاستعمال إبينفرين حقنة ميلان 0.3 ملغ أو إبينفرين حقنة ميلان جي. آر 0.15 ملغ.

تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال الدواء

أخبر الطبيب قبل استعمال إبينفرين حقنة ميلان 0.3 ملغ / إبينفرين حقنة ميلان جي. آر 0.15 ملغ عن حالتك الصحية، خاصة إذا:

- كانت لديك مشاكل في القلب أو ضغط دم مرتفع
- كنت تعاني من السكري
- كنت تعاني من مشاكل في الغدة الدرقية
- كنت تعاني من الربو
- كان لديك تاريخاً من الاكتئاب
- كنت تعاني من مرض باركنسون
- كانت لديك حساسية أياً كانت
- كنت شخصاً مسناً

الأطفال والمراهقون

من غير المعروف ما إذا كانا إبينفرين حقنة ميلان 0.3 ملغ / إبينفرين حقنة ميلان جي. آر 0.15 ملغ أمنين وناجعين للأطفال الذين يقل وزنهم عن 15 كغم.

ردود فعل بين الأدوية

إذا كنت تتناول أو تناولت مؤخراً أدوية أخرى، بما في ذلك الأدوية بدون وصفة طبية والمكملات الغذائية، فأخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك. وبشكل خاص، إذا كنت تتناول:

- علاجا للربو
- قد يزداد تأثير إبينفرين بتناوله بالتزامن مع أدوية ثلاثية الحلقات ومثبطات أكسيداز أحادي الأمين المضادة للاكتئاب، وليفوثيروكسين.

- قد يزداد تأثير إيبينفرين بتناوله بالتزامن مع بعض مضادات الهيستامين (المضادة للحساسية)، وخاصة كلورفينيلامين، تريبييلامين، ديفينهيدرامين.
- يتم كبت تأثيرات إيبينفرين على القلب وتوسع الشعب الهوائية، بتناوله بالتزامن مع حاصرات بيتا الأدرينالية، مثل پروبرانولول.
- يتم كبت تأثيرات إيبينفرين على تقلص الأوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم، بتناوله بالتزامن مع حاصرات ألفا الأدرينالية.
- قد يُضعف تناول مشتقات إرغوت لعلاج الصداع النصفي، من تأثير إيبينفرين بتناولهما بالتزامن.
- قد يتسبب التناول المتزامن مع جليكوزيدات القلب مثل الديجيتال أو الكينيدين أو مدرات البول أو أدوية نظم ضربات القلب، لاضطرابات في نظم القلب. يجب مراقبة هؤلاء المرضى بعناية.

أثناء حدث تَأَقِيّ، استعمل إيبينفرين حقنة ميلان 0.3 ملغ / إيبينفرين حقنة ميلان جي. آر 0.15 ملغ للعلاج كما وصف لك من قبل الطبيب بغض النظر عن حالتك الصحية أو الأدوية التي تستعملها.

الحمل والإرضاع

يجب استعمال إيبينفرين حقنة ميلان 0.3 ملغ في الحمل والإرضاع وفقا لنفس الاعتبارات - العلاج المفضل في حالة صدمة تأقية. إذا كنت حاملا أو تخططين للحمل، استشيرى الطبيب حول كيفية التصرف إذا دعت الحاجة. من غير المعروف ما إذا كان إيبينفرين يضرّ بالجنين. إذا كنت ترضعين أو تخططين للإرضاع، استشيرى الطبيب قبل استعمال إيبينفرين. من غير المعروف ما إذا كان إيبينفرين ينتقل إلى حليب الأم.

3. كيف تستعمل الدواء؟

إيبينفرين حقنة ميلان 0.3 ملغ / إيبينفرين حقنة ميلان جي. آر 0.15 ملغ هما عبارة عن محقتين أَلِيَتِيْن، أحاديتي الاستعمال، جاهزتين للحقن الذاتي الفوري داخل العضل. إيبينفرين حقنة ميلان 0.3 ملغ / إيبينفرين حقنة ميلان جي. آر 0.15 ملغ مخصصان للاستعمال الفوري الذاتي من قبل العائلة/المعالج.

يجب الاستعمال دائما بحسب تعليمات الطبيب. يجب عليك الفحص مع الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكدًا فيما يتعلق بالجرعة وبطريقة العلاج بالمستحضر.

يجب عليك أن تفهم السبب الذي من أجله وصف لك المستحضر، وأن تكون متأكدًا من أنك تفهم كيف ومتى تستعمله. يوصى أيضا بتوجيه أحد أفراد العائلة/معالج/معلم حول طريقة استعمال المستحضر. إذا كنت قد تعرضت للسهل من قبل حشرة، فحاول إخراج الزبانة بأصابعك. يرجى الانتباه لعدم الضغط، قرص أو دفع الزبانة إلى داخل الجلد. إذا أمكن، ضع ثلجا على منطقة اللسعة. حافظ على حرارة الجسم وتجنب النشاط البدني. في حالة رد فعل تحسسي الناجم عن طعام، تأكد من إزالة جميع بقايا الطعام من الفم فوراً.

الجرعة وطريقة العلاج سيحددهما الطبيب فقط. الجرعة المقبولة في حال عدم وجود تعليمات أخرى من الطبيب:

توفر حقنة واحدة من إيبينفرين حقنة ميلان 0.3 ملغ جرعة تعادل 0.3 ملغ إيبينفرين (0.3 مل) والتي تناسب مرضى بوزن 30 كغم وما فوق.

توفر حقنة واحدة من إيبينفرين حقنة ميلان جي. آر 0.15 ملغ جرعة تعادل 0.15 ملغ إيبينفرين (0.3 مل) والتي تناسب أطفال بوزن 15-30 كغم.

يُمنَع تجاوز الجرعة الموصى بها ما لم تستمر أعراض الصدمة التَأَقِيّة أو تتكرر. في مثل هذه الحالة، قد تحتاج إلى استعمال محقنة إضافية.

في بعض الأحيان، لا تكفي حقنة واحدة لتحريك من أعراض الحدث التآقي. لهذا السبب، قد يصف لك الطبيب أكثر من حقنة واحدة. إذا لم تتحسن الأعراض أو كان هناك تفاقم في غضون 15-5 دقيقة بعد الحقن الأول، فُجب عليك، أو أيا كان موجودا معك، حقنك بحقنة ثانية. لهذا السبب، يجب أن تحمل معك أكثر من حقنة واحدة في جميع الأوقات. إذا كنت بحاجة إلى أكثر من حقنتين في حدث تآقي واحد، فإن الطبيب وحده هو فقط الذي سيقرر على ضرورة جرعات إضافية من الإبينفرين.

انتبه:

- إبينفرين حقنة ميلان 0.3 ملغ / إبينفرين حقنة ميلان جي. آر 0.15 ملغ مخصص للحقن في وسط الجانب الخارجي من الفخذ فقط.
- يُمنع الحقن في الوريد أو الوريد، الأصابع، أصابع القدم، راحتي اليدين أو القدمين.
- إذا قمت بالحقن عن طريق الخطأ في مكان آخر من الجسم، فتوجه إلى أقرب غرفة طوارئ. واطهر إلى الطبيب أين قمت بحقن الحقنة عن طريق الخطأ في الجسم.
- من غير المعروف ما إذا كان إبينفرين حقنة ميلان 0.3 ملغ / إبينفرين حقنة ميلان جي. آر 0.15 ملغ آمنين وناجعين لدى الأطفال الذين يقل وزنهم عن 15 كغم.
- تحتوي كل حقنة على جرعة واحدة من الإبينفرين.
- إبينفرين حقنة ميلان 0.3 ملغ / إبينفرين حقنة ميلان جي. آر 0.15 ملغ مخصصان للحقن الذاتي الفوري (بمفردك أو من قبل معالج/أحد أفراد العائلة).


في حالة حدث تآقي

- استعمل الحقنة فوراً. يمكن أيضاً استعمال الحقنة عبر الملابس.
- توجه فوراً لتلقي علاج طبي طارئ، من الجائز أن تحتاج إلى مواصلة المراقبة الطبية.

تعليمات حفظ الحقنة


- تعرف على أجزاء الحقنة (انظر الرسم المرفق).
- حافظ على الحقنة جاهزة للاستعمال وبمتناول اليد في أي وقت.
- يُمنع تفكيك أجزاء الحقنة.
- تجنب تعرضها للضوء والحرارة العالية (انظر الفصل 5 من "تعليمات التخزين").
- يُمنع إزالة غطاء الأمان الأزرق لإقبال الاستعمال.
- يجب عليك فحص لون المحلول بشكل دوري في النافذة. لا تستعمل حقنة تغير فيها لون المحلول أو تشكلت رواسب فيه.

إبينفرين حقنة ميلان 0.3 ملغ
(الملصق الأصفر) داخل المحفظة البلاستيكية



إبينفرين حقنة ميلان 0.3 ملغ
(الملصق الأصفر) خارج المحفظة البلاستيكية

إبينفرين حقنة ميلان جي. آر 0.15 ملغ
(الملصق الأخضر) داخل المحفظة البلاستيكية



إبينفرين حقنة ميلان جي. آر 0.15 ملغ
(الملصق الأخضر) خارج المحفظة البلاستيكية

تعليمات الحقن

يتطلب حقن المستحضر ثلاث خطوات: إعداد المحقنة، الحقن، تلقي مساعدة طبية.

الخطوة 1: إزالة المحقنة من المحفظة البلاستيكية

1. افتح الغطاء الأصفر لمحفظة إبينفرين حقنة ميلان 0.3 ملغ البلاستيكية، أو الغطاء الأخضر لمحفظة إبينفرين حقنة ميلان جي. آر 0.15

0.15 ملغ البلاستيكية

(الرسم رقم 1)

2. قم بإخراج المحقنة عن طريق إمالة المحقنة وتزليقها خارج المحفظة البلاستيكية (الرسم رقم 2)

3. امسك المحقنة في راحة يدك (حيث يتم لف راحة اليد حول المحقنة مثل قبضة اليد) مع توجيه الطرف البرتقالي لأسفل. وباليدي

الثانية، اسحب غطاء الأمان الأزرق بشكل مستقيم وللأعلى وحرره دون التسبب بثنيه أو التواءه (الرسم رقم 3)



انتبه:

- تخرج الإبرة من الطرف البرتقالي.
- يُمنع وضع الأصابع أو اليد فوق الطرف البرتقالي، وذلك لتجنب الحقن العرضي. إذا قمت بحقن نفسك عرضياً، فيجب التوجه إلى المستشفى على الفور لتلقي المساعدة.

الخطوة 2: الحقن

إذا كنت تحقن طفلاً صغيراً، فأمسك رجله بقوة بحيث لا تتحرك الرجل أثناء الحقن لتجنب الإصابات أثناء الحقن.

1. موضع الطرف البرتقالي للمحقنة مقابل منتصف الفخذ، على الجزء الخارجي من الفخذ بزواوية قائمة (عامودياً للفخذ)
2. ادفع المحقنة بعزم وقوة إلى الفخذ الخارجي حتى يتم سماع "كليك"، "الكليك" هو علامة إلى أنه بدأ الحقن. (الرسم رقم 4)
3. امسك المحقنة بشكل ثابت وبحيث تكون ملاصقة بالفخذ لمدة 3 ثوان (عد ببطء 3،2،1) انتهى الحقن. (الرسم رقم 5)
4. أبعد المحقنة من الفخذ. سوف يزيد طول غطاء المحقنة البرتقالي ويغطي الإبرة، إذا كانت الإبرة لا تزال مكشوفة، فلا تحاول استعمال المحقنة مرة ثانية. (الرسم رقم 6)
5. قم بتدليك مكان الحقن لمدة 10 ثوان. (الرسم رقم 7)



الخطوة 3: توجه فوراً إلى أقرب مستشفى

- قد تحتاج إلى علاج طبي إضافي. قد تحتاج إلى استعمال المحقنة الثانية إذا استمرت الأعراض أو تكررت.
- خذ المحقنة/المحاقن التي استعمالتها إلى المستشفى وأطلع الطبيب بأنك تلقيت حقنة إيبينفرين في الفخذ. أظهر له مكان الحقن.
- قم بتسليم المحقنة المستعملة إلى الطبيب للرقابة، ولإتلاف المحقنة بشكل لائق.

انتبه:

- المحقنة المستعملة مع الإبرة المغطاة تكون أطول بعد الاستعمال ولا تتناسب مع عبوة البلاستيك.
- المحقنة الآلية تحرر جرعة معايرة (بمعيار ثابت) من الإيبينفرين ولا يمكن استعمالها مرة أخرى. لا تحاول استعمال المحقنة المستعملة.
- يبقى معظم سائل الحقن داخل المحقنة ولا يمكن إعادة استعماله. ومع ذلك، يوفر لك الحقن الجرعة المطلوبة فيما إذا تطاول الغطاء البرتقالي وحجب الإبرة، وأصبحت النافذة مخفية.

يُمنع تناول الأدوية في الظلام! تحقق من الملصق على عبوة الدواء ومن الجرعة الدوائية في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا كنت بحاجة إليها.
إذا كانت لديك أسئلة إضافية بالنسبة إلى استعمال الدواء فاستشر الطبيب أو الصيدلي.

4. الأعراض الجانبية

كجميع الأدوية، قد يسبب استعمال الدواء أعراضاً جانبية لدى قسم من المستخدمين. لا تندش عند قراءة قائمة الأعراض الجانبية. من المحتمل ألا تعاني من أيٍّ منها.

أعراض جانبية قلبية وعانية

- اضطرابات في النظم (ضربات قلب سريعة، غير منتظمة، خفقان قلب)، يشمل ذلك رجفان أذيني الذي يسبب الوفاة، وخاصة لدى متعالجين يعانون من أمراض قلب أساسية أو أولئك الذين يتلقون أدوية معينة.
- ارتفاعات سريعة في ضغط الدم تسببت في نزيف بالدماغ، خاصة لدى متعالجين مسنين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية
- قد تحدث ذبحة صدرية لدى متعالجين يعانون من مرض الشرايين التاجية.
- مرض عضلة القلب بسبب وطأة نفسية شديدة ("متلازمة القلب المكسور") لدى متعالجين عولجوا بالإبينفرين (نادرا).

أعراض جانبية الناجمة عن حقن عرضي أو تقنية حقن غير سليمة

- قد يسبب الحقن العرضي في الأصابع، راحتي اليدين أو القدمين فقدان تدفق الدم إلى المنطقة المصابة.
- يمكن أن تشمل ردود الفعل السلبية التي تظهر نتيجة للحقن العرضي زيادة في معدل ضربات القلب، ردود فعل موضعية التي تشمل الشحوب، شعور بالبرد وانخفاض الحساسية في موقع الحقن، أو الإصابة في موقع الحقن مما يسبب كدمات، نزيف، تغير لون الجلد، احمرار أو ضرر بالهيكل.
- تسبب الحقن في الردف بحالات من النخر الغازي.
- لقد حدث لدى أطفال لم يتعاونوا، كانوا يركلون أو يتحركون أثناء الحقن، جروحات على الجلد، انحناء الإبر، بقاء إبر في الجلد بعد الحقن.

حالات عدوى في الجلد والأنسجة الرخوة

في أحيان نادرة، طور مرضى استعملوا إيبينفرين حقنة ميلان 0.3 ملغ / إيبينفرين حقنة ميلان جي. آر 0.15 ملغ عدوى في موقع الحقن في غضون أيام قليلة بعد الحقن. قد تكون بعض من حالات العدوى هذه وخيمة. توجه فوراً إلى الطبيب إذا ظهرت عليك أي من الأعراض التالية في موقع الحقن:

- احمرار لا يزول
- تورم
- حساسية
- شعور بدفء المكان عند اللمس

أعراض جانبية شائعة (أعراض تظهر لدى 10-1 مستعملين من بين 100)

- تعرق
- صداع
- ضعف
- رجفان
- شحوب
- انفعال مفرط، عصبية أو قلق، عدم هدوء
- دوخة
- غثيان أو تقيؤ
- مشاكل في التنفس
- من المرجح أن تختفي الأعراض الجانبية عند الراحة.

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقم أحد الأعراض الجانبية أو إذا عانيت من أعراض جانبية غير مذكورة في النشرة، عليك استشارة الطبيب.

من الممكن تبليغ وزارة الصحة عن أعراض جانبية من خلال الضغط على الرابط "التبليغ عن أعراض جانبية نتيجة لعلاج دوائي" الموجود على الصفحة الرئيسية في موقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يحولك إلى استمارة عبر الإنترنت للتبليغ عن الأعراض الجانبية، أو عبر دخول الرابط: <https://sideeffects.health.gov.il>.

5. كيف يخزن الدواء؟

- تجنّب التسمّم! يجب حفظ هذا الدواء، وكلّ دواء آخر، في مكان مغلق، بعيدًا عن متناول أيدي ومجال رؤية الأولاد و/أو الأطفال، وهكذا تتجنّب التسمّم.
- يُمنع استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (exp. date) الظاهر على العبوة والمُلصق. تاريخ انتهاء الصلاحية ينسب إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

شروط التخزين

- يجب دائما حفظ المحقنة في المحفظة البلاستيكية، وذلك لحماية المحقنة. يرجى الانتباه، أن المحفظة غير مقاومة للماء.
- يجب تخزين إبينفرين حقنة ميلان 0.3 ملغ / إبينفرين حقنة ميلان جي. آر 0.15 ملغ في درجة حرارة دون 25°C.
- يجب الحماية من الضوء.
- يُمنع التخزين في التلاجة.
- تحقق بشكل دوري من لون المحلول في النافذة الشفافة للمحقنة. يجب أن يكون المحلول شفافا. إذا تغير لون المحلول (وردي أو بني) أو يحتوي على رواسب، فلا تستعمل المحقنة. يجب استبدالها.
- يمنع غطاء الأمان للمحقنة الحقن العرضي، فلا يجوز إزالته إلا قبيل الاستعمال.

6. معلومات إضافية

بالإضافة إلى المركبات الفعالة، يحتوي الدواء أيضًا على:

Sodium chloride, sodium metabisulfite, hydrochloric acid to adjust pH, water for injection.

كيف يبدو الدواء وماذا تحوي العبوة:

إبينفرين حقنة ميلان 0.3 ملغ / إبينفرين حقنة ميلان جي. آر 0.15 ملغ هما عبارة عن محاقن آلية، ذاتية الحقن. كل محقنة موجودة في محفظة بلاستيكية.

إبينفرين حقنة ميلان 0.3 ملغ: هو عبارة عن محقنة ذات ملصق أصفر يتم تخزينها في محفظة بلاستيكية وفي عبوة منفردة. بالإضافة إلى ذلك، هناك أيضا عبوة مزدوجة تحتوي على محقنتين لكل منهما محفظة بلاستيكية، مع مشبك يربط المحفظتين، بالإضافة إلى ذلك تحتوي على محقنة رمادية للتدريب.

إبينفرين حقنة ميلان جي. آر 0.15 ملغ: هو عبارة عن محقنة ذات ملصق أخضر يتم تخزينه في محفظة بلاستيكية وفي عبوة منفردة. بالإضافة إلى ذلك، هناك أيضا عبوة مزدوجة تحتوي على محقنتين لكل منهما محفظة بلاستيكية، مع مشبك يربط المحفظتين، بالإضافة إلى ذلك تحتوي على محقنة رمادية للتدريب.

قد لا يتم تسويق جميع أحجام العبوات.

صاحب التسجيل وعنوانه: تاروفارم تسويق 1985 م.ض.، ص.ب. 8105، نتانيا

اسم المنتج وعنوانه:

Meridian Medical Technologies INC., 1945 Craig Road, St. Louis, MO 63146, USA

تمّ التحرير في نيسان 2023 وفق تعليمات وزارة الصحة.
رقم تسجيل الدواء في سجلّ الأدوية الرسمي في وزارة الصحة:

إبينفرين حقنة ميلان 0.3 ملغ: 161-59-35821-00
إبينفرين حقنة ميلان جي. آر 0.15 ملغ: 161-58-35820-00

لتبسيط قراءة هذه النشرة وتسهيلها ورد النصّ بصيغة المذكّر. مع هذا فالدواء معدّ لأبناء كلا الجنسين.

PL-1031 02-11.22