

## نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيدلية

(مستحضرات) 1986

يسوق الدواء بموجب وصفة طبيب فقط

## لوسارديكس، أقراص 50 ،12.5 ملغ

## لوسارديكس، حبوبلات 100 ملغ

كل قرص/حبسولة يحتوي على لوسارتان بوتاسيوم (Losartan potassium) بجرعة 12.5، 50 أو 100 ملغ على التوالي. مركبات غير فعالة ومثبتات الحساسية في الدواء – أظهرت البند 6 "معلومات إضافية" والبند 2 "معلومات عامة عن جزء من مركبات الدواء."

اقرأ النشرة **بإمعان حتى نهايتها قبل أن تستعمل** الدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات متوجهة إلى عن الدواء. إذا كانت لديك أسئلة إضافية، فاستشر الطبيب أو إلى الصيدلي. وصف هذا الدواء لمعالجتك، لا تعمله لأخرين، إنه قد يسبب الضرر لهم حتى إذا بدا كل أن حالتهم الطبية مماثلة.

### 1. لأي غرض مُخصص الدواء؟

لوسارديكس مُخصص لعلاج فشل القلب.
لوسارديكس 50 ولوسارديكس 100 مُخصصان أيضاً لعلاج ضغط الدم المرتفع والمساعدة في تخفيض الخطأطر (أدنى مضاعف للخطر) لحوادث قلبية وعائية كالسكتة، إحدى مرضى ضغط دم مرتفع ومشاكله الجينين الأيسر (الطين الرجسي) للقلب. يوفّر لوسارديكس 50 ولوسارديكس 100 أيضاً حماية كلوية عن طريق تأخير التآقق في مرض الكلية لدى مرضى السكري من نوع 2 الذين لديهم إفران زلال في البول (بيلة بروتينية).

**الفسيولة العلاجية:** ينتمى إلى فصيلة مُحصّرات مستقبلتي الأندجيوتنسين 1.

### 2. قُبيل استعمال الدواء

لا يجوز استعمال الدواء إذا:

- كنت حساساً (أرجح) للمادة الفعالة (لوسارتان) أو لأي واحد من المكونات الإضافية التي يحتوي عليها الدواء (انظر البند 6).
- كنت حاملاً لأنك من 3 أشهر (تفضل أيضاً الانتعاش مع لوسارديكس في بداية الحمل – انظري البند "الحمل والأرضاع").
- كنت تعاني من خلل وظيفي ووظيفة الكبد.
- كان لديك سكري أو خلل في الوظيفة الكلوية.
- تعالج بدواء لخفض ضغط الدم الذي يحتوي على الييسكريين.

تحذيرات خاصة بخصوص استعمال الدواء
• تحدث مع طبيبك أو مع الصيدلي قبل تناول الدواء.

من الواجب عليك إخبار طبيبك إذا كنت تتظبن أنك حامل (أو قد تنحلي في حمل).
لوسارديكس غير موصى به في بداية الحمل، ولا يجوز تناوله إذا كنت حاملاً لأنك من 3 أشهر، لأنه قد يؤدي إلى ضرر وريخ لرضعك إذا تم تناوله في هذه المرحلة (انظري إلى بند "الحمل والأرضاع").

**قبل العلاج بـلوسارديكس، أخبر الطبيب إذا:**

• كان لديك سكري أو دمنه وعائية (انتفاخ البطن).
• التفتيقين، الحلق أو الواسم. انظر أيضاً البند 4 "أعراض جانبية".
• كنت تعاني من كثرة التقيؤ أو الإسهال اللذان يوديان لفقدان شديد للسوائل وأو الأملاح من جسمك.

• كنت تتلقى مدرات للبول (أدوية التي تزيد كمية الماء التي تفرزها بواسطة كليتيك) أو كنت في حمام غذائية للملح والتي تؤدي لفقدان شديد للسوائل والأملاح من جسمك (انظر البند 3 "كيفية استعمال الدواء").

• معلوم بأن لديك تضيق أو انسداد في الأوعية الدموية المؤدية لكليتيك أو إذا خفضت أزرع كلية مؤخرًا.

• وظيفة الكبد لديك مختلفة (انظر البنود ١١ و١٢).
• استعمال الدواء إذا/ و3- ككيفية استعمال الدواء".
• كنت تعاني من فشل القلب مع أو بدون إصابة كلوية أو بالدمج مع اضطراب إلتظم قلبي وخيمة ومهددة للحياة، يجب توخي الحذر بشكل خاص، إذا كنت تتعاطج في نفس الوقت بمحصر بيتا (B-blocker).

• كانت لديك مشاكل في صمامات القلب أو عضلة القلب.
• كنت تعاني من مرض قلب تاجي (الناتج عن تدفق منخفض للدم في الأوعية الدموية الخاصة بالقلب) أو من مرض وعائي دماغي (الناتج عن تدفق منخفض للدم في الدماغ).

• كنت تعاني من فرط الأندوستيرونية الأولى (متلازمة مرتبطة بارتفاع في إفراز هرمون الأندوستيرون من قبل الغدة الكظرية، التي تحدث بسبب خلل في الغدة).

• كنت تتناول أي من الأدوية التالية المستعملة لعلاج ضغط الدم المرتفع:

○ منطبق ACE (مثل، اينابريل، ليسينابوريل، إيميبريل) خاصة إذا كان لديك مشاكل في الكلى المرتبطة بالسكري.

○ الييسكريين

قد يفحص طبيبك عمل الكلى لديك لضغط الدم، وكمية استهلاك المياه (مثلاً، اليوسيوم) في دمك على فترات زمنية ثابتة. انظر أيضاً المعلومات في البند 2 "لا يجوز استعمال الدواء إذا".
• كنت تتناول أدوية أخرى التي قد ترفع مستويات اليوسيوم في المصل (انظر أيضاً المعلومات في البند "تفاعلات بين الأدوية").

**تفاعلات بين الأدوية**
• إذا أخذت في الأونة الأخيرة، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبيب وإضافات تغذية، أخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك.

أخبر طبيبك إذا كنت تتناولون إضافات بوتاسيوم. بدائل ملح التي تحتوي على بوتاسيوم، أدوية خازنة

للبوتاسيوم مثل مدرات بول معينة (أميلوريڊ، سيبروتيلاكون) أو أدوية أخرى (مثلاً، تري فوسفات اليوسيوم في المصل الخلوي). هيرانين، أدوية التي تحتوي على تريميثوبريم، حيث أن دمجها مع لوسارديكس غير موصى به.
• توخي الحذر بشكل خاص إذا كنت تتناول الأدوية التالية خلال العلاج بـلوسارديكس:

• أدوية أخرى لخفض ضغط الدم، لأنها قد تزيد أكثر من انخفاض ضغط الدم الخاص بك. كما قد ينعضض منفعلة من نتيجة لتناول واحد من الأدوية مجموعة الأدوية التالية: مضادات الالتهاب ثابثة الحالات، أدوية مضادة للذهابن، باكوفين، أمفوسيتين.

• أدوية مضادة للالتهاب غير ستيرويدية مثل ايندوميثاسين بما في ذلك مشتقات COX-2
• أدوية مثل الالتهاب والتي يمكن استعمالها للمساعدة في تخفيف الألم).
• لأنها قد تقلل من التأثير المضاعف لضغط الدم الخاص بـلوسارتان.

قد ينعضر طبيبك إلى تغيير الجرعة وأو اتخاذ وسائل أخرى:
• إذا كنت تتناول منطبق ACE أو الييسكريين (انظر أيضاً "معلومات في البند ١١" و١٢ "يجوز استعمال الدواء إذا" والبند "تحذيرات خاصة بخصوص استعمال الدواء").

إذا كان لديك خلل في وظيفة الكلى، قد يؤدي استعمال الدواء والتي يمكن استعمالها للمساعدة في الوظيفة الكلوية.

لا يجوز تناول لوسارديكس بالدمج مع أدوية تحتوي على ليثيوم من دون إشراف لصيق من طبيب. ووسائل حذر خاصة (مثلاً، فحوصات دم) قد تكون ملائمة.

### استعمال الدواء والغذاء والشراب

يمكن تناول لوسارديكس مع أو بدون طعام. يجب الانتعاش عن شرب عصير الجريب فروت أثناء تناول لوسارديكس.

### الحمل والأرضاع

من الواجب عليك إخبار طبيبك إذا كنت تتظبن أنك حامل (أو قد تنحلي في حمل).
سوف لوسارديكس غير موصى به في بداية الحمل، ولا يجوز تناوله إذا كنت حاملاً لأنك من 3 أشهر، لأنه قد يؤدي إلى ضرر ويخيم لرضعيك إذا تم تناوله بعد الشهر الثالث من الحمل.

### الأرضاع

أخبري طبيبك إذا كنت مرضعة أو بصدد البدء بالأرضاع.
لوسارديكس غير موصى به للإمهات المرضعات، وقد يختار طبيبك ألكك علاجاً لك غير موصى به إذا كنت مرضعة. خاصة إذا ولد لرضعك ثلثم، أو ولد قبل أوته.

يجب استشارة طبيبك أو الصيدلي قبل تناول هذا الدواء.

### السياقة واستعمال الآلات

لم يتم القيام بدراسات بخصوص التأثيرات على قدرة السياقة أو تشغيل الآلات.
• مرضى معينين مثل الذين يعانون بدمرات البول بدمج مع مدر للبول (دواء الذي يزيد من كمية الماء التي تفرزها بواسطة كليتيك) وأو ديجيتاليس (دواء يساعد في تقوية وتحسين نجاعة عمل القلب) وأو محصر بيتا.

### جرعة في مجموعات مرضى خاصة:

قد يوصي طبيبك بجرعة أقل خاصة عند بدء علاج مرضى معينين مثل الذين يعانون بدمرات البول بدمج مع مدر للبول (دواء الذي يزيد من كمية الماء التي تفرزها بواسطة كليتيك) وأو ديجيتاليس (دواء يساعد في تقوية وتحسين نجاعة عمل القلب) وأو محصر بيتا.

• البالغين من العمر 65 سنة.
• لا يجوز استعمال (انظر البند ١١ "يجوز استعمال الدواء إذا").

عليك استشارة طبيبك قبل أن تحاول القيام بمثل هذه النشاطات.

**معلومات هامة بخصوص جزء من مركبات الدواء:**
تحتوي أقراص لوسارديكس على لاكتوز، إذا قبل لك من قبل يبيب أنك لديك عدم تحمل لسكريات معينة، يجب استشارة الطبيب قبل تناول هذا الدواء.

### 3. كيفية استعمال الدواء؟

يجب دائماً استعمال الدواء وفقاً لتعليمات الطبيب. عليك التأكد من الطبيب أو من الصيدلي إذا لم تكن متأكدًا بخصوص الجرعة وطريقة العلاج بالذء.
تحدد الجرعة وكيفية العلاج من بعض الأوقات فقط. سيحدد الطبيب الجرعة الملائمة من لوسارديكس، مع الأخذ بعين الاعتبار وضعك وفي حال كنت تتناول أدوية أخرى.

الجرعة الاعتيادية بشكل عام هي:

**مرضى البالغين مع ضغط دم مرتفع**

• يبدأ العلاج عادة مع 50 ملغ لوسارتان مرة في اليوم. ينبغي الوصول إلى التأثير الأمثل لخفض ضغط الدم بعد العلاج بـ 6-3 أسابيع بعد بدء العلاج.
• إذا لم تتعالمجب معينين تكون سيحتاج حاجة في بعض الأحيان بجرعة الدواء بعد ذلك إلى 100 ملغ لوسارتان، مرة في اليوم.

إذا كنت تأخذ إنطباعاً بأن تأثير لوسارتان أقوى من اللازم أو أضعف من اللازم، استشر الطبيب أو الصيدلي.

**مرضى البالغين مع ضغط دم مرتفع، سكري من النوع 2**

• يبدأ العلاج عادة مع 50 ملغ لوسارتان مرة في اليوم. ينبغي معينين تكون هناك حاجة في بعض الأحيان لرفع جرعة الدواء إلى 100 ملغ لوسارتان، مرة في اليوم.

• حسب تأثير الدواء على ضغط الدم، يمكن تناول لوسارتان مرة مع أدوية أخرى لخفض ضغط الدم (مثلاً، مدرات البول، محصرات قوت الكالسسيوم، محصرات ألفا أو محصرات بيتا، ومستحضرات ذات فعالية مركزية) وكذلك أيضاً مع الانسولين وأدوية أخرى التي تستعمل بشكل شائع لخفض مستوى الجلوكوز في الدم (مثلاً، سوفونيل أوربا، جليتايزون ومثبتات جلوكوسيداز).

**مرضى البالغين مع قلس القلب**
• يبدأ العلاج عادة مع 12.5 ملغ لوسارتان مرة في اليوم، عادة، يجب زيادة الجرعة كل أسبوع، بشكل تدريجي (مع بعين، 12.5 ملغ لليوم خلال الأسبوع الأول، 25 ملغ لليوم خلال الأسبوع الثاني، 50 ملغ لليوم خلال الأسبوع الثالث، 100 ملغ لليوم خلال الأسبوع الرابع، 150 ملغ لليوم خلال الأسبوع الخامس) حتى جرعة الدوامة كما حذثت من قبل طبيبك.
الجرعة القصوى هي 150 ملغ، مرة في اليوم.

• علاج فشل القلب، غالبًا ما يعطى لوسارتان بالدمج مع مدر للبول (دواء الذي يزيد من كمية الماء التي تفرزها بواسطة كليتيك) وأو ديجيتاليس (دواء يساعد في تقوية وتحسين نجاعة عمل القلب) وأو محصر بيتا.

**جرعة في مجموعات مرضى خاصة:**
• قد يوصي طبيبك بجرعة أقل خاصة عند بدء علاج مرضى معينين مثل الذين يعانون بدمرات البول بدمج مع مدر للبول (دواء الذي يزيد من كمية الماء التي تفرزها بواسطة كليتيك) وأو ديجيتاليس (دواء يساعد في تقوية وتحسين نجاعة عمل القلب) وأو محصر بيتا.

### ١. لا يجوز تجاوز الجرعة الموصى بها.

### طريقة تناول

يجب بلع الدواء مع كأس ماء. عليك أن تحاول تناول الجرعة اليومية الخاصة بك في نفس الوقت تقريباً كل يوم. من المهم الاستمرار بتناول لوسارديكس حتى يخبرك الطبيب بغير ذلك.

**لوسارديكس 12.5:** لا يجوز الشطر بسبب عدم وجود حط تقسيما.

**لوسارديكس 50:** يجوز التقسيم لأربع أرباع.

**لوسارديكس 100:** يجوز شطره.

لا توجد معلومات بخصوص السحق أو المضغ.

### إذا تناولت جرعة مفرطة بالخطأ

أعراض الجرعة المفرطة هي ضغط دم منخفض، زيادة تضيق القلب، يحدث كذلك انخفاض في نبض القلب. إذا تناولت جرعة مفرطة أو إذا بلغ طفلك من الدواء عن طريق الخطأ، توجه فوراً إلى غرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر عبوة الدواء معك.

**إذا نسيت تناول الدواء**
• إذا نسيت الجرعة اليومية، لا يجوز تناول جرعة مضاعفة.
• إذا الجرعة التالية في الوقت المعتاد واستشر الطبيب إذا لم تتعالمجب معينين تكون سيحتاج حاجة في بعض الأحيان بجرعة الدواء بعد ذلك إلى 100 ملغ لوسارتان، مرة في اليوم.

حتى لو طرأ تحول إلى السيطرة على ضغط دمك، لا يجوز إيقاف العلاج بالذء دون استشارة الطبيب.

### لا يجوز تناول أدوية في الظلام تحقن في المصلص والجرعة في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظرات إذا كنت بحاجة إليها.

إذا كان لديك أسئلة إضافية بخصوص استعمال الدواء، استشر الطبيب أو الصيدلي.

### 4. الأعراض الجانبية

كما في أي دواء، قد يسبب استعمال لوسارديكس أعراض جانبية لدى جزء من المستخدمين. لا تفرغ من قراءة قائمة الأعراض الجانبية. من الممكن أن لا تعاني من أي واحدة منها.

**يجب إيقاف استعمال الدواء وتوجه فوراً إلى الطبيب في أي غرفة الطوارئ القريبة إذا ظهر:**
• رد فعل تحسسي حاد (طفح، حكة، انتفاخ الوجه، التفتيقين، الغم أو الحلق الذي قد يؤدي إلى صعوبة في البلع أو في التنفس).
• إذا عرض جانبي وتخيم ولكن تندر، الذي يظهر بوتيئة من 1-10 أسابيع من بين 10,000، قد تحتاج إلى علاج طبي طارئ أو للمكوث في المستشفى.

**أعراض جانبية إضافية:**
**أعراض جانبية شائعة (أعراض تظهر في 1-10 مستخدمين من بين 100):**

• دوخة.
• تورم.
• ضغط دم منخفض، خاصة بعد فقدان بفرط للماء من الجسم من داخل الأوعية الدموية، مثلاً، لدى مرضى مع فشل قلبي شديد أو يتعالمجون بجرعات عالية من مدرات البول).
• أعراض انخفاض ضغط الدم في الوقت المتعلقة بالجرعة مثل، انخفاض ضغط الدم الذي يظهر عند ارتفاع من وضع الاستلقاء أو الجلوس.

• سكر أكثر انخفاضاً مما ينبغي في الدم (hypoglycaemia).
• تورم عروق في القدمين، زفير أو فقر في الأذنين (طينين).
• اضطراب في التنوق.
• أعراض انخفاض ضغط الدم في الوقت المتعلقة بالجرعة مثل، انخفاض ضغط الدم الذي يظهر عند ارتفاع من وضع الاستلقاء أو الجلوس.

• تغيرات في وظيفة الكلية، بما في ذلك الفشل الكلوي.

• انخفاض في عدد خلايا الدم الحمراء (فقر دم).
• ارتفاع اليوريا في الدم الكرياتينين في المصل واليوسياميوم في المصل.
• أعراض جانبية غير شائعة (أعراض تظهر لدى 1-10 مستخدمين من بين 1,000):

• غثاس.
• صداع.
• اضطراب في النوم.
• شعور بزيادة تضيق القلب (خفقان).
• ألم وخيم في الصدر (تشنة رئوية).
• ضيق تنفس (dyspnoea).
• ألم بطن.

• إذا تناولت جرعة مفرطة بالخطأ
• أعراض الجرعة المفرطة هي ضغط دم منخفض، زيادة تضيق القلب، يحدث كذلك انخفاض في نبض القلب. إذا تناولت جرعة مفرطة أو إذا بلغ طفلك من الدواء عن طريق الخطأ، توجه فوراً إلى غرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر عبوة الدواء معك.

• إذا تناولت جرعة مفرطة أو إذا بلغ طفلك من الدواء عن طريق الخطأ، توجه فوراً إلى غرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر عبوة الدواء معك.

**إذا نسيت تناول الدواء**
• إذا نسيت الجرعة اليومية، لا يجوز تناول جرعة مضاعفة.
• إذا الجرعة التالية في الوقت المعتاد واستشر الطبيب إذا لم تتعالمجب معينين تكون سيحتاج حاجة في بعض الأحيان بجرعة الدواء بعد ذلك إلى 100 ملغ لوسارتان، مرة في اليوم.

حتى لو طرأ تحول إلى السيطرة على ضغط دمك، لا يجوز إيقاف العلاج بـلذء دون استشارة الطبيب.

**لا يجوز تناول أدوية في الظلام تحقن في المصلص**

**أعراض جانبية نادرة (أعراض تظهر لدى 1-10 مستخدمين من بين 10,000):**
• تورم الحساسية.
• فرط وعائية.
• التهاب الأوعية الدموية (التهاب وعائي)، بما في ذلك فرطية فنيخ شولراين (paroaesthesia).
• خدر أو شعور بالأوخز (macrogol 400, carnauba wax (E-171)، سكتة دماغية).

• تضيق قلب سريع جداً وغير منظم (رجفان أذيني).

**التهاب الكبد (hepatitis)**
• أعراض جانبية نادرة (أعراض تظهر في 1-10 مستخدمين من بين 10,000):

• ارتفاع في مستويات نائلة أمين الالانين في الدم (ALT)، الذي يتضحي عادة مع إيقاف العلاج.

**أعراض جانبية شوبعها غير معروف (أعراض لم يحدد شوبعها بعد):**
• انخفاض في عدد صفحات الدم.

• شعور عصبي شقيقة).
• خلل وظائف الكبد.
• الأم عضلات ومفاصل.
• أعراض تشبه الأنفلونزا.

• ألم الظهر والتهاب في مسالك البول.
• زيادة في الحساسية للشعس (تحسس ضوئي).

• عدل عضلات غير مربرة مع بول داكن (بلون الشابي) (لتحال اليريدات).

• التهاب عنج جسبي).
• التهاب البنكرياس (pancreatitis).
• مستويات منخفضة من الصوديوم في الدم (hyponatraemia).

• اكتئاب.
• شعور عام غير جيد.
• تورم طينين، زفير أو فقر في الأذنين (طينين).
• اضطراب في التنوق.

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تلقاكم أحد الأعراض الجانبية أو إذا عاثت من عرض جانبي لم يُذكر في النشرة، عليك استشارة الطبيب.

### التبلغ عن أعراض جانبية

يمكن التبلغ عن الأعراض الجانبية لوزارة الصحة من خلال الخطب على الرابط "إيدوم ليد حوضوت لواز" [www.health.gov.il](http://www.health.gov.il) على الموقع في وزارة الصحة (www.health.gov.il)

• إذا ظهر عرض جانبي، إذا تلقاكم أحد الأعراض الجانبية أو إذا عاثت من عرض جانبي لم يُذكر في النشرة، عليك استشارة الطبيب.

• إذا ظهر عرض جانبي، إذا تلقاكم أحد الأعراض الجانبية أو إذا عاثت من عرض جانبي لم يُذكر في النشرة، عليك استشارة الطبيب.

• إذا ظهر عرض جانبي، إذا تلقاكم أحد الأعراض الجانبية أو إذا عاثت من عرض جانبي لم يُذكر في النشرة، عليك استشارة الطبيب.

• إذا ظهر عرض جانبي، إذا تلقاكم أحد الأعراض الجانبية أو إذا عاثت من عرض جانبي لم يُذكر في النشرة، عليك استشارة الطبيب.

### 5. كيفية استشارة الطبيب عن الدواء؟

• إذا ظهر عرض جانبي، إذا تلقاكم أحد الأعراض الجانبية أو إذا عاثت من عرض جانبي لم يُذكر في النشرة، عليك استشارة الطبيب.

• إذا ظهر عرض جانبي، إذا تلقاكم أحد الأعراض الجانبية أو إذا عاثت من عرض جانبي لم يُذكر في النشرة، عليك استشارة الطبيب.

• إذا ظهر عرض جانبي، إذا تلقاكم أحد الأعراض الجانبية أو إذا عاثت من عرض جانبي لم يُذكر في النشرة، عليك استشارة الطبيب.

• إذا ظهر عرض جانبي، إذا تلقاكم أحد الأعراض الجانبية أو إذا عاثت من عرض جانبي لم يُذكر في النشرة، عليك استشارة الطبيب.

### 6. معلومات إضافية

**بالإضافة إلى المركب الفعال يحتوي الدواء أيضاً على:**
Cellulose microcrystalline, lactose monohydrate, starch pregelatinized, hypromellose, silica colloidal anhydrous, magnesium stearate, titanium dioxide (E-171), macrogol 400, carnauba wax.

**كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العلية**

**لوسارديكس 12.5:** أقراص بيضاء مستديرة مطلية مححدة من الجهتين.

• أحجام عبوة لوسارديكس 12.5: 7, ٢0 ,14 ,10 ,20, 28 أو 30 قرص.
• لوسارديكس 50: أقراص بيضاء مستديرة مطلية مححدة من الجهتين، مع خط قطع

• أحجام عبوة لوسارديكس 50: 2, 10 ,١4 ,20 ,28, ٣0 أو قرص.

• لوسارديكس 100: حبسولات بيضاء مطلية مححدة من الجهتين، مع خط تقسيم في الجانبين.

• أحجام عبوة لوسارديكس 100: 2, 10 ,١4 ,20 ,28, ٣0 أو حبسولة.

• من الممكن أن لا تكون جميع أحجام العبوات مسوقة.
• الممتنع وعائلته:
• دكسل مرض، شارع دكسل 1، أور كعقفاً 3060000 إسرائيل.
• تم تحرير هذه النشرة في كانون الثاني 2023 وفقاً للإرشادات ولوزارة الصحة.

**زرع تسجيل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة:**

• لوسارديكس 12.5: 319490 138
• لوسارديكس 50: 319150 138
• لوسارديكس 100: 31492 138

• لوسارديكس 100: 31492 138

• التسجيل والتبليط وتسجيل الفراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكر. كل الدواء مخصص لأبناء كلا الجنسين.

صاحب التسجيل:

**دكسل فارما تكنولوجوجيا م.ص.**
• شارع تخفندي ناحوم 21، أورشليم-4954802، إسرائيل