

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו - 1986
התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד

אספרוקט® 1000 יחב"ל
אבקה וממס להכנת תמיסה להזרקה

חומר פעיל

טורוקטוקוג אלפא פגול (פקטור קרישה VIII אנושי שעבר פגילציה (rDNA))
(turoctocog alfa pegol).

כל בקבוקון של אספרוקט מכיל 1000 יחב"ל טורוקטוקוג אלפא פגול.
לאחר המסה בממס המסופק באריזה (תמיסה להזרקה המכילה נתרן כלוריד 9 מ"ג/מ"ל (0.9%)),
התמיסה המוכנה להזרקה מכילה 250 יחב"ל טורוקטוקוג אלפא פגול למ"ל.

חומרים בלתי פעילים ואלרגניים: ראה פרק 2 סעיף "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה"
ופרק 6 "מידע נוסף".

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה.
אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.
תרופה זו נרשמה עבורך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי
מצבם הרפואי דומה.

1. למה מיועדת התרופה?

אספרוקט מיועד לטיפול בדימומים ולמניעת דימומים בחולי המופיליה A (חסר פקטור VIII מולד)
שטופלו בעבר.
אספרוקט אינו מכיל פקטור וון וילברנד, ולפיכך אין להשתמש בו לטיפול במחלת וון וילברנד.
קבוצה תרפויטית: פקטורי קרישה, פקטור קרישה VIII.
אספרוקט מכיל את המרכיב הפעיל טורוקטוקוג אלפא פגול, פקטור קרישה VIII רקומביננטי בעל
פעילות ארוכת טווח. פקטור קרישה VIII הוא חלבון בדם המסייע בקרישת דם.
בחולי המופיליה A, פקטור VIII חסר או אינו פועל כראוי. אספרוקט מחליף את פקטור VIII החסר או
הפגום ומסייע ביצירת קריש דם במקום הדימום.

2. לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה אם:

- אתה רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (ראה פרק 6).
- אתה רגיש (אלרגי) לחלבוני אוגר.

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה
שימוש קודם בתרופה המכילה פקטור VIII

דווח לרופא אם השתמשת בתרופות המכילות פקטור VIII בעבר, במיוחד אם פיתחת מעכבים
(נוגדנים) נגד התרופה, מאחר שיייתכן סיכון להתפתחות מעכבים חוזרת.

תגובות אלרגיות

קיים סיכון שתחווה תגובה אלרגית חמורה ופתאומית (כגון תגובה אנפילקטית) לאספרוקט.
הפסק את ההזרקה ופנה לרופא או לחדר מיון מיידי אם אתה חווה סימנים מוקדמים של תגובות
אלרגיות. סימנים מוקדמים אלה עשויים לכלול פריחה, סרפדת, בצקות מקומיות של העור, גרד על
פני אזורי עור נרחבים, אודם ו/או נפיחות בשפתיים, בלשון, בפנים או בכפות הידיים, קשיי בליעה או

נשימה, צפצופים, לחץ בחזה, עור חיוור וקר, קצב לב מהיר או סחרחורת, כאב ראש, בחילות והקאות.

התפתחות מעכבים (נוגדנים) לפקטור VIII

מעכבים (נוגדנים) יכולים להתפתח במהלך טיפול בכל התרופות המכילות פקטור VIII.

- מעכבים אלה, במיוחד ברמות גבוהות, עוצרים את פעילותו התקינה של הטיפול
- אתה תהיה במעקב קפדני לזיהוי ההתפתחות של מעכבים אלה
- אם הדימום אינו נשלט באמצעות אספרוקט, דווח לרופא מייד
- אין להעלות את המנה הכוללת של אספרוקט לצורך שליטה בדימום מבלי לשוחח עם הרופא.

בעיות הקשורות לצנרת

אם מותקן אצלך צנרת שדרכו ניתן להזריק תרופות לדם (התקן לגישה ורידית מרכזית), אתה עלול לפתח זיהומים או קרישי דם באזור הצנרת.

מחלת לב

שוחח עם הרופא או הרוקח אם אתה סובל ממחלת לב או נמצא בסיכון למחלת לב.

ילדים

אספרוקט מתאימה לשימוש בילדים בכל גיל. למידע נוסף ראה פרק 3 "כיצד תשתמש בתרופה?".

תגובות בין-תרופתיות

אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחורונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.

היריון והנקה

אין ניסיון בשימוש בפקטור קרישה VIII בהיריון והנקה. אין להשתמש בתרופה מבלי להיוועץ ברופא לפני התחלת הטיפול. אם את בהיריון או מניקה, חושבת שאת עשויה להיות בהיריון או מתכננת להרות, פני לרופא לייעוץ טרם נטילת תרופה זו.

נהיגה ושימוש במכונות

אספרוקט אינו משפיע, או בעל השפעה זניחה, על היכולת לנהוג ולהשתמש במכונות.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה

תרופה זו מכילה 30.5 מ"ג נתרן (המרכיב העיקרי של מלח בישול/שולחן) בבקבוקון לאחר המסה. כמות זו שוות ערך ל-1.5% מצריכת הנתרן התזונתית היומית המרבית המומלצת עבור מבוגר.

ירידה בפעילות פקטור VIII בחולים שטופלו בעבר

ירידה בפעילות של פקטור VIII עלולה להתרחש בתחילת הטיפול שלך. אם אתה חושב שהתרופה שלך עובדת פחות מהצפוי, ספר לרופא שלך.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

יש להשתמש בתכשיר תמיד בהתאם להוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר. המינון ואופן הטיפול ייקבעו על ידי הרופא בלבד. רופא בעל ניסיון בטיפול בחולי המופיליה A יתחיל את הטיפול באספרוקט.

כיצד ניתן אספרוקט

אספרוקט ניתן כזריקה לתוך וריד (במתן תוך-ורידי), ראה "הוראות לשימוש באספרוקט" למידע נוסף.

באיזו כמות יש להשתמש

הרופא יחשב את המינון עבורך. המינון יהיה תלוי במשקל הגוף והאם התרופה משמשת למניעת דימום או לטיפול בדימום.

למניעת דימום

מבוגרים ומתבגרים (בני 12 ומעלה): המינון המומלץ הוא 50 יחב"ל של אספרוקט לק"ג משקל גוף כל 4 ימים. הרופא עשוי לבחור מינון אחר או תדירות אחרת להזרקות, בהתאם לצורך. ילדים (מתחת לגיל 12): המינון ההתחלתי המומלץ הוא בין 50 IU-75 של אספרוקט לק"ג משקל גוף. התרופה ניתנת פעמיים בשבוע.

לטיפול בדימום

המינון של אספרוקט מחושב בהתאם למשקל הגוף ולרמות פקטור VIII הרצויות. רמות המטרה של פקטור VIII תהיינה תלויות בחומרת הדימום ובמיקומו. אם אתה מרגיש שההשפעה של אספרוקט אינה מספקת, שוחח עם הרופא.

שימוש במתבגרים

מתבגרים (בני 12 ומעלה) יכולים להשתמש באותו המינון כמו מבוגרים.

שימוש בילדים

בטיפול בילדים מתחת לגיל 12 ייתכן שתידרש מנה גדולה יותר או בתדירות גבוהה יותר מזו המומלצת עבור מתבגרים מעל גיל 12 ועבור מבוגרים.

אין לעבור על המנה המומלצת.

אם השתמשת בכמות גבוהה מדי של אספרוקט

אם השתמשת בכמות גבוהה מדי של אספרוקט, פנה לרופא מייד.

אם אתה חייב להגביר את השימוש באספרוקט באופן משמעותי לצורך עצירת דימום, שוחח עם הרופא מייד. למידע נוסף, ראה "התפתחות מעכבים (נוגדנים) לפקטור VIII" בפרק 2. אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מייד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא את אריזת התרופה איתך.

אם שכחת להשתמש באספרוקט

אם שכחת מנה, הזרק את המנה שהוחמצה מייד כשתיזכר. אין להזריק מנה כפולה על מנת לפצות על מנה שנשכחה. עבור להזרקה הבאה כמתוכנן והמשך בטיפול לפי המלצת הרופא. במקרה של ספק, פנה לרופא. יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא.

אם אתה מפסיק להשתמש באספרוקט

אין להפסיק את השימוש באספרוקט מבלי לשוחח עם הרופא. אם אתה מפסיק את השימוש באספרוקט, ייתכן כי לא תהיה עוד מוגן מפני דימום או ייתכן שהדימום הנוכחי לא ייפסק.

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התוויות והמנה בכל פעם שאתה לוקח תרופה. הרכב משקפיים אם אתה זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש באספרוקט עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. ייתכן שלא תסבול מאף אחת מהן.

תגובות אלרגיות (רגישות יתר)

הפסק את ההזרקה מייד אם אתה מפתח תגובות אלרגיות חמורות ופתאומיות (תגובות אנפילקטיות). עליך לפנות לרופא או לחדר מיון מייד אם אתה חווה סימנים של תגובה אלרגית כגון:

- קשיי בליעה או נשימה
- צפצופים בזמן הנשימה
- לחץ בחזה
- אודם ו/או נפיחות בשפתיים, בלשון, בפנים או בכפות הידיים
- פריחה, סרפדת, בצקות מקומיות של העור או גרד

- עור חיזור וקר, קצב לב מהיר או סחרחורת (לחץ דם נמוך)
- כאב ראש, בחילות או הקאות.

התפתחות מעכבים (נוגדנים) לפקטור VIII

אם קיבלת בעבר יותר מ-150 ימי טיפול בפקטור VIII, עלולים להתפתח מעכבים (נוגדנים) (עלולים להופיע בעד משתמש 1 מתוך 100). אם הדבר יקרה, ייתכן כי הפעילות התקינה של התרופה תיפסק ואתה עלול לחוות דימום מתמשך. במקרה זה, עליך לפנות לרופא מייד. ראה "התפתחות מעכבים (נוגדנים) לפקטור VIII" בפרק 2.

תופעות לוואי נוספות

תופעות לוואי שכיחות - תופעות שמופיעות בעד משתמש 1 מתוך 10

- תגובות עוריות במקום ההזרקה
- גרד
- אודם בעור (אריתמה)
- פריחה.

תופעות לוואי שאינן שכיחות – תופעות שמופיעות בעד משתמש 1 מתוך 100

- תגובות אלרגיות (רגישות יתר). תגובות אלו עלולות להפוך לחמורות ועלולות להיות מסכנות חיים, ראה "תגובות אלרגיות (רגישות יתר)" לעיל למידע נוסף
- מעכבים (נוגדנים) לפקטור VIII בחולים שטופלו בפקטור VIII בעבר.

תופעות לוואי נוספות (שכיחות לא ידועה)

- ירידה בפעילות של פקטור VIII בהיעדר מעכבי פקטור VIII.

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צוינה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או על ידי כניסה לקישור: <https://sideeffects.health.gov.il>

5. איך לאחסן את התרופה?

- מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה. אין לגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מרופא.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי אריזת הקרטון, על הבקבוקון ועל תוויות המזרקים המוכנים לשימוש עם ממש. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.

תנאי אחסון

לפני ההמסה (לפני ערבוב האבקה עם הממס):

יש לאחסן במקרר (2°C-8°C). אין להקפיא. יש לאחסן באריזה המקורית כדי להגן מפני אור. ניתן לשמור אספרוקט

- בטמפרטורת החדר ($30^{\circ}\text{C} \geq$) למשך תקופה יחידה של עד 12 חודשים בטווח חיי המדף של התכשיר או
- מעל טמפרטורת החדר ($30^{\circ}\text{C} <$ עד 40°C) למשך תקופה יחידה של עד 3 חודשים בטווח חיי המדף של התכשיר.

כאשר אתה מתחיל לאחסן אספרוקט מחוץ למקרר, תעד את התאריך ואת טמפרטורת האחסון במקום המיועד על קופסת הקרטון.

לאחר הוצאת התכשיר מהמקרר לאחסון, אין לאחסן אותו במקרר שוב.

לאחר ההמסה (לאחר ערבוב האבקה עם הממס):

- לאחר המסת אספרוקט, יש להשתמש בו מייד. אם אינך יכול להשתמש בתמיסה המוכנה מייד, יש להשתמש בה בטווח של
- 24 שעות אם היא מאוחסנת במקרר (2°C - 8°C) או
 - 4 שעות ב 30°C או
 - שעה אחת בין 30°C ל- 40°C , רק אם התכשיר אוסן בטמפרטורה שמעל טמפרטורת החדר (30°C עד 40°C) לפני ההמסה במשך 3 חודשים לכל היותר.

צבע האבקה בבקבוקון הוא לבן עד קרם. אין להשתמש באבקה אם הצבע השתנה.

התמיסה המוכנה חייבת להיות צלולה וחסרת צבע. אין להשתמש בתמיסה המוכנה אם אתה מבחין בחלקיקים או בשינוי צבע.

אין להשליך תרופות למי ביוב או לאשפה ביתית. שאל את הרוקח כיצד להשליך תרופות שאינן בשימוש עוד. אמצעים אלה יסייעו בהגנה על הסביבה.

6. מידע נוסף

נוסף על המרכיב הפעיל התרופה מכילה גם:

sodium chloride, sucrose, L-histidine, calcium chloride dihydrate, polysorbate 80, L-methionine, sodium hydroxide and hydrochloric acid.

- מרכיבי הממס הם:

sodium chloride and water for injections.

כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:

אספרוקט זמין באריזות המכילות 1000 יחב"ל. כל אריזה של אספרוקט מכילה בקבוקון המכיל אבקה בצבע לבן עד קרם, מזרק מוכן לשימוש המכיל 4 מ"ל ממס צלול וחסר צבע, מוט בוכנה ומתאם בקבוקון.

שם בעל הרישום וכתובתו:

נובו נורדיסק בע"מ, רחוב עתיר ידע 1, כפר סבא 4464301

שם היצרן וכתובתו:

נובו נורדיסק איי. אס., נובו אלה, די קיי-2880 בגסוורד, דנמרק

אושר ב- 03/2023

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:

אספרוקט 1000 יחב"ל 172-44-37440-00

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.

Esperoct 1000 IU_PIL_Mar_2023_certification

הוראות לשימוש באספרוקט 1000 יחב"ל

קרא הוראות אלו בעיון טרם השימוש באספרוקט.

אספרוקט מסופק כאבקה. לפני ההזרקה, יש להמיס אותו בממס המסופק במזרק. הממס הוא תמיסה להזרקה המכילה נתרן כלוריד 9 מ"ג/מ"ל (0.9%). יש להזריק את התכשיר המומס לתוך וריד (הזרקה תוך-ורידית (IV)). הציוד באריזה זו מיועד להמסה ולהזרקה של אספרוקט.

כמו כן, תזדקק לפריטים הבאים:

- ערכת עירוי (מחט פרפר עם צינורית)
 - מגבוני אלכוהול סטריליים
 - פד גזה ופולסטרים.
- פריטים אלה אינם כלולים באריזת אספרוקט.

אין להשתמש בציוד ללא הדרכה הולמת על ידי הרופא או האחות.

תמיד רחץ את ידיך וודא שהאזור סביבך נקי.

כאשר אתה מכין ומזריק תרופה ישירות לווריד, חשוב להשתמש בטכניקה נקייה ונטולת חיידקים (אספטית). טכניקה שגויה עלולה לגרום לכניסת חיידקים העלולים לזהם את הדם.

אין לפתוח את הציוד עד אשר תהיה מוכן להשתמש בו.

אין להשתמש בציוד אם הוא נפל או אם הוא פגום. השתמש באריזה חדשה במקומו.

אין להשתמש בציוד אם תוקפו פג. השתמש באריזה חדשה במקומו. תאריך התפוגה מודפס על האריזה החיצונית, על הבקבוקון, על מתאם הבקבוקון ועל המזרק המוכן לשימוש.

אין להשתמש בציוד אם אתה חושד שהוא מזוהם. השתמש באריזה חדשה במקומו.

אין להשליך פריט כלשהו עד אשר תזריק את התמיסה המוכנה.

הציוד מיועד לשימוש חד-פעמי בלבד.

תכולה


האריזה מכילה:

- בקבוקון אחד המכיל אבקת אספרוקט
- מתאם בקבוקון אחד
- מזרק מוכן לשימוש אחד המכיל ממס
- מוט בוכנה אחד (ממוקם מתחת למזרק)


סקירה בקבוקון המכיל אבקת אספרוקט



מתאם הבקבוקון










מזרק מוכן לשימוש המכיל ממש






מוט הבוכנה



 <p>א</p>	<p>1. הכן את הבקבוקון והמזרק</p> <ul style="list-style-type: none"> • הוצא את מספר האריזות של אספרוקט הדרוש לך. • בדוק את תאריך התפוגה. • בדוק את השם, החוזק והצבע של האריזה כדי לוודא שהיא מכילה את התכשיר הנכון. • רחץ את ידיך וייבש אותן כראוי באמצעות מגבת נקייה או הנח להן להתייבש באוויר. • הוצא את הבקבוקון, מתאם הבקבוקון והמזרק המוכן לשימוש מאריזת הקרטון. השאר את מוט הבוכנה באריזת הקרטון מבלי לגעת בו. • אפשר לבקבוקון ולמזרק המוכן לשימוש להגיע לטמפרטורת החדר. אתה יכול לעשות זאת על ידי אחיזתם בידיים עד אשר תרגיש שהם חמים כמו הידיים, ראה איור א'. <p>אין להשתמש בכל דרך אחרת לחימום הבקבוקון והמזרק המוכן לשימוש.</p>
 <p>ב</p>	<ul style="list-style-type: none"> • הסר את מכסה הפלסטיק מהבקבוקון. אם מכסה הפלסטיק רופף או חסר, אין להשתמש בבקבוקון. • נגב את פקק הגומי במגבון אלכוהול סטרילי והנח לו להתייבש באוויר במשך מספר שניות טרם השימוש כדי לוודא שהוא נטול חיידקים ככל האפשר. <p>אין לגעת בפקק הגומי באצבעות מאחר שהדבר עלול לגרום להעברת חיידקים.</p>
 <p>ג</p>	<p>2. חבר את מתאם הבקבוקון</p> <ul style="list-style-type: none"> • הסר את נייר המגן ממתאם הבקבוקון. <p>אם נייר המגן אינו אטום במלואו או אם הוא קרוע, אין להשתמש במתאם הבקבוקון.</p> <p>אין להוציא את מתאם הבקבוקון מתוך מכסה המגן בעזרת האצבעות.</p> <p>אם תיגע בדוקרן שעל מתאם הבקבוקון, תיתכן העברת חיידקים מהאצבעות.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • הנח את הבקבוקון על משטח שטוח ויציב. • הפוך את מכסה המגן, וחבר את מתאם הבקבוקון אל הבקבוקון בלחיצה. • לאחר החיבור, אין להסיר את מתאם הבקבוקון מהבקבוקון.
	<ul style="list-style-type: none"> • לחץ בעדינות על מכסה המגן בעזרת האגודל והאצבע המורה כפי שמוצג באיור. • הסר את מכסה המגן ממתאם הבקבוקון. • אין להרים את מתאם הבקבוקון מהבקבוקון בעת הסרת מכסה המגן.
	<p>3. חבר את מוט הבוכנה והמזרק</p> <ul style="list-style-type: none"> • אחוז במוט הבוכנה בקצה העליון הרחב והוצא אותו מאריזת הקרטון. אין לגעת בצדדים או בתבריג של מוט הבוכנה. אם תיגע בצדדים או בתבריג, תיתכן העברת חיידקים מהאצבעות. • חבר מייד את מוט הבוכנה למזרק על ידי סיבובו בכיוון השעון לתוך הבוכנה שבתוך המזרק המוכן לשימוש עד אשר תורגש התנגדות.
	<ul style="list-style-type: none"> • הסר את מכסה המזרק מהמזרק המוכן לשימוש באמצעות כיפופו כלפי מטה עד שבירת האזור המנוקב. אין לגעת בקצה המזרק מתחת למכסה המזרק. אם תיגע בקצה המזרק, תיתכן העברת חיידקים מהאצבעות. • אם מכסה המזרק רופף או חסר, אין להשתמש במזרק המוכן לשימוש.

	<ul style="list-style-type: none"> • הברג והדק את המזרק המוכן לשימוש אל מתאם הבקבוקון עד אשר תורגש התנגדות.
	<p>4. המס את האבקה בממס</p> <ul style="list-style-type: none"> • החזק את המזרק המוכן לשימוש בהטיה קלה כאשר הבקבוקון פונה כלפי מטה. • דחף את מוט הבוכנה על מנת להזריק את כל הממס לתוך הבקבוקון.
	<ul style="list-style-type: none"> • המשך ללחוץ על מוט הבוכנה כלפי מטה וערבול את הבקבוקון בעדינות עד אשר כל האבקה תתמוסס. • אין לנער את הבקבוקון מאחר שהדבר יגרום להקצפה. • בדוק את התמיסה המוכנה. היא חייבת להיות צלולה וחסרת צבע, וללא חלקיקים הנראים לעין. אם אתה מבחין בחלקיקים או בשינוי צבע, אין להשתמש בה. השתמש באריזה חדשה במקומה.
<p>מומלץ להשתמש באספרוקט מייד לאחר ההמסה.</p> <p>אם אינך יכול להשתמש בתמיסת אספרוקט המוכנה מייד, יש להשתמש בה בטווח של</p> <ul style="list-style-type: none"> • 24 שעות אם היא מאוחסנת במקרר (2°C-8°C) או • 4 שעות בטמפרטורה שאינה עולה על 30°C או • שעה אחת בין 30°C ל-40°C, רק אם התכשיר אוסון בטמפרטורה שמעל טמפרטורת החדר (30°C < עד 40°C) לפני ההמסה במשך 3 חודשים לכל היותר. <p>יש לאחסן את התכשיר המומס בבקבוקון.</p> <p>אין להקפיא את התמיסה המוכנה ואין לאחסן אותה במזרקים.</p>	


יש להרחיק את התמיסה המוכנה מאור ישיר.

!

אם המנה שלך דורשת יותר מבקבוקון אחד, חזור על שלבים א' עד י' עם בקבוקונים, מתאמי בקבוקונים ומזרקים מוכנים לשימוש נוספים עד אשר תגיע למנה הדרושה עבורך.



- המשך ללחוץ על מוט הבוכנה כך שיהיה בתוך המזרק במלואו.
- הפוך את המזרק עם הבקבוקון כך שהבקבוקון נמצא מעל המזרק.
- הפסק ללחוץ על מוט הבוכנה והנח לו לנוע אחורנית מעצמו, תוך מילוי המזרק בתמיסה המוכנה.
- משוך את מוט הבוכנה בעדינות כלפי מטה כדי לשאוב את התמיסה המוכנה לתוך המזרק.
- אם אינך זקוק לכל הכמות של התרופה המוכנה מהבקבוקון, השתמש בשנתות שעל המזרק כדי לשאוב את המנה הדרושה עבורך, לפי הוראות הרופא או האחות.
- אם בשלב כלשהו יהיה אוויר במזרק, הזרק את האוויר חזרה לבקבוקון.
- תוך כדי אחיזת הבקבוקון כשהוא מעל המזרק, הקש על המזרק בעדינות כדי לאפשר לבעות לעלות אל הקצה העליון.
- דחף את מוט הבוכנה לאט עד לסילוק של כל הבעות.



- הסר את מתאם הבקבוקון עם הבקבוקון בתנועה סיבובית.
- אין לגעת בקצה המזרק. אם תיגע בקצה המזרק, תיתכן העברת חיידקים מהאצבעות.

5. הזרק את התמיסה המוכנה

כעת אספרוקט מוכן להזרקה לווריד.

- הזרק את התמיסה המוכנה לפי הוראות הרופא או האחות
- הזרק לאט במשך כ-2 דקות.

אין לערבב אספרוקט עם זריקות או תרופות תוך-ורידיות אחרות כלשהן.

הזרקת אספרוקט באמצעות מחברים נטולי מחט לצנתרים תוך-ורידיים (IV)

זהירות: המזרק המוכן לשימוש עשוי מזכוכית ומיועד להיות תואם למחברי luer-lock סטנדרטיים. חלק ממחברים נטולי מחט עם דוקרן פנימי אינם תואמים למזרק המוכן לשימוש. אי-התאמה זו עלולה למנוע את מתן התרופה ולגרום נזק למחבר נטול המחט.

הזרקת התמיסה דרך התקן לגישה ורידית מרכזית (CVAD) כגון צנתר ורידי מרכזי או פורט-תת-עורי:

- השתמש בטכניקה נקייה ונטולת חיידקים (אספטית). פעל לפי ההוראות לשימוש הולם במחבר וב-CVAD תוך התייעצות עם הרופא או האחות.
- הזרקה לתוך CVAD עשויה לדרוש מזרק פלסטיק סטרילי בנפח 10 מ"ל לצורך שאיבת התמיסה המוכנה. יש לבצע זאת מייד לאחר שלב י'.
- אם יש צורך לשטוף את קו CVAD לפני או לאחר הזרקת אספרוקט, השתמש בתמיסה להזרקה המכילה נתרן כלוריד 9 מ"ג/מ"ל (0.9%).



פינוי

- **לאחר ההזרקה, השלך בבטחה את כל תמיסת אספרוקט שנותרה ללא שימוש, המזרק עם ערכת העירוי, הבקבוקון עם מתאם הבקבוקון וחומרי פסולת אחרים לפי הוראות הרוקח.**

אין להשליך אותם לאשפה הביתית הרגילה.

אין לפרק את הציוד טרם ההשלכה.

אין לעשות שימוש חוזר בציוד.