

05/2023

Briviact 10 mg film coated tablets

Briviact 25 mg film coated tablets

Briviact 50 mg film coated tablets

Briviact 75 mg film coated tablets

Briviact 100 mg film coated tablets

Briviact 10 mg/ml Solution for Injection/Infusion

מרכיב פועל: Brivaracetam

רופא/ה, רוקח/ת נכבד/ה,

חברת ניאופרם בע"מ מבקשת להודיע על עדכון העלון לרופא והעלון לצרכן של התכשירים שבנדון.
העדכנים עודכנו בתאריך מאי 2023.

התוויה הרשומה לתרופות בישראל:

Briviact is indicated as adjunctive therapy in the treatment of partial onset seizures with or without secondary generalisation in adults, adolescents and children from 4 years of age with epilepsy.

בהודעה זו מצוינים השינויים המהותיים בלבד.

מקרה לעדכנים המסומנים:

מידע שהօסור - מסומן בקוו אדום חוצה XXX
תוספת - כתוב כחול

עדכנים מהותיים נעשו בסעיף הבא בעלון לצרכן:

2. לפני השימוש בתרופה

....

הירין, הנקה ופוריות

נשים בגיל הפוריות צריכות לשוחח עם הרופא על השימוש באמצעות מניעת.

אם את בהירין או מיניקה, חושבת שהנרג בהירין או מתכוננת להיכנס להירין, יש להיוועץ ברופא או ברוקח לפני שימוש בתרופות.

לא מומלץ לקחת בריביאקט אם את בהירין **או מיניקה**, כיוון שהשפעות בריביאקט על ההירין ועל העובר **או-****הילוך** אין ידועות. לא מומלץ להנתק את תינוקך במהלך נטילת בריביאקט, כיוון שבריביאקט **עובדת לחלב האם**.

אין להפסיק את הטיפול ללא התייעצות עם הרופא לפני כן. הפסקת הטיפול עלולה להגביר את ההתקפים שלך ולפגוע בתינוק.

עדכוניים מהותיים נעשו בסעיף הבא בעלון לרופא:

4.6 Fertility, pregnancy and lactation

....
Breast-feeding

It is unknown whether Brivaracetam is excreted in human breast milk. **Studies in rats have shown excretion of brivaracetam in breast milk (see section 5.3).** A decision should be made whether to discontinue breastfeeding or to discontinue brivaracetam, taking into account the benefit of the medicinal product to the mother. In case of co-administration of brivaracetam and carbamazepine, the amount of carbamazepine-epoxide excreted in breast milk could increase. There is insufficient data to determine the clinical significance.

....
4.8 Undesirable effects

....
Paediatric population

....
No specific pattern of adverse event (AE) was identified in children from 1 month to < 4 years of age. Limited data are available on neurodevelopment in children <4 years of age. **Limited No** clinical data are available in neonates.

קיימים עדכוניים נוספים. למידע נוסף יש לעיין בעלון לרופא ובעלון לצריך המעודכנים.

העלון לרופא והעלון לצריך נשלחו לפרסום במאגר התרופות שבאתר משרד הבריאות, וניתן לקבלם מודפסים על ידי פניה לבעל הרישום ניאופרם בע"מ, בניין ניאופרם, רחוב השילוח 6 ת.ד 7063 פתח תקווה 4917001,
טלפון: 03-9373770, פקס: 03-9373737.

ברכה,

עדי יפרח

ROKECHT MAMONA