

עלון לצרcn לפי תקנות הרוקחim (תקשיירט) התשמ"ו - 1986
התרופה משוקקת על-פי מרשם רופא בלבד

ויסוי[®]
טבליות מצופות

רכיבים פעילים: כל טבליה מכילה -

סופוסוביבור (zofosubuvir)	400 מ"ג
ולפטסביר (velpatasvir)	100 מ"ג
ווקסילפרביר (voxilaprevir)	100 מ"ג

חומרים בלתי פעילים ואלרגניים בתכשיר: ראה בסעיף 6 'מידע נוספת'.

קרא בעיון את העلون עד סופו בעיון בטרם תשמש בתרופה זו, מכיוון שהוא מכיל מידע חשוב עבורך. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח. תרופה זו נרשמה עבורך בלבד. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם, אפילו אם נראה לך כי מצבם הרפואי דומה.

শפועל חדש של דלקת נגיפית B:

לפני תחילת הטיפול בויסוי, על הרופא שלך לעשות לך בדיקות דם לנוכחות זיהום בנגיף הפטייטיס B. במידה ויש לך או איזהו זיהום בעבר נגיף הפטייטיס B, ויסוי עשוי לגרום לשפועל חדש של דלקת כבד נגיפית B, מצב אשר עשוי, במקרה מסוים, להיות קטלני או לגרום לביעות כבד חמורות (כגון כשל כבד).

שפועל חדש של דלקת נגיפית B יכול להתרחש בעת הטיפול או אחרי סיום הטיפול בויסוי. עליך להיות במקבב קפדי במידת והנור נמצוא בסיכון לשפועל חדש של דלקת נגיפית B בזמן הטיפול בויסוי או אחריו.

למידע נוספת על תופעות לוואי, ראה סעיף 4.

1. למה מיועדת ויסוי?

ויסוי ניתנת לטיפול בזיהום נגיפי כרוני (ארוך טווח) של הכבד שנקרו הפטייטיס C, במבוגרים בני 18 שנים ומעלה.

קבוצה רפואיית:

- **ולפטסביר, סופוסוביבור וווקסילפרביר** הן תרופות נוגדות נגיפים אנט-ויראליות (שירות Direct-acting antiviral)

התרופה ויסוי היא טבליה מושלבת קבועת מינון המכילה את שלושת החומרים הפעילים הבאים: סופוסוביבור, ולפטסביר וכן ווקסילפרביר. החומרים הפעילים בתרופה זו פועלים יחד עלי-ידי חסימת שלושה חלבונים שונים שהנגיף זקוק להם כדי לגדול ולהתרבות, ופעולה זו מביאה לחיסול הזיהום בגוף לצמיתות.

2. לפני השימוש בויסוי:

X אין להשתמש בתרופה אם:

- אתה רגיש (אלרגי) לסופוסוביבור, ולפטסביר, וווקסילפרביר או לכל אחד מהמרכיבים אשר מכילה התרופה זו (המפורט בסעיף 6 בעлон).

← אם הנחיה זו חלה עליו, אל תיטול את ויסוי ודוחה לרופא מיד.

אתה נוטל כיום אחד או יותר מהתרופות הבאות:

- **ריפאמפיצין וריפאבוטין** (תרופות אנטיביאטיות המשמשות לטיפול בזיהומים, כולל שחפת);

- | | |
|--|--|
| <p>פרע מחרור (<i>Hypericum perforatum</i>) St. John's wort – צמח מרפא המשמש לטיפול בדיכאון;</p> <p>קרבמזרין, פנobarbitאַל ופניטואַין (תרופה המשמשת לטיפול באפילפסיה ומונעת התקפים);</p> <p>רוזובסטין (תרופה המשמשת לטיפול ברמות כולסטרול גבוהות בدم או להפחחת הסיכון לאיירועים קרדיומיסקளרים מסוימים);</p> <p>דיביגטרן אטקסילאט (תרופה המשמשת למניעת היוצרות קריישי דם);</p> <p>תרופות המכילות אתילאסטרידיל כוללות מספר רב של גלולות למניעת הריאן.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • • • • • • |
|--|--|

ażhorot myoħdot ha-nogħuot le-shimosh be-tarrofa

- היוועץ ברופא אם אתה:
- **סובל מביעות כאב מלבד הפטיטיס C**, לדוגמה;
 - **אם יש לך או היה לך הפטיטיס B**, מכיוון שייתכן שהרופא ירצה לעקוב אחריך בקבידה יתרה;
 - **אם עברת השתלת לב**.
 - **אתה נוטל תרופה לטיפול בדיזוזים שנגרם על-ידי נגיף הכלש החיסוני האנושי (VH)**, מכיוון שייתכן שהרופא שלך ירצה לעקוב אחר מצבר בקבידה יתרה.

- היוועץ ברופא או ברוקח לפני שתיתויל ווסוי אם:
- אתה נוטל כוּם או נטלת בחודשים האחרונים את התרופה אמיודארון לטיפול בדופק בלתי סדר, כיון שהוא עלול להוביל להאטה מסכנת חיים בקצב הלב שלך. אם נטלת את התרופה ההז'ו' יתכן שהרופא יشكול טיפולים חלופיים. אם נחוץ טיפול בווסוי, יתכן ותזדקק לניטור נוספת נסוף של תפקוד הלב שלך.
 - יש לך סוכרת. יתכן וצטרכך ניתור צמוד יותר של רמות הסוכר בדם / או התאמת של התרופות שלך לשוכרת לאחר תחילת הטיפול בווסוי. חלק מחוליה השוכרת חוו רמות נמוכות של סוכר בדם (היפוגליקמיה) לאחר תחילת טיפול בווסוי. לאחר תחילת טיפול בתרופות כגון ווסוי.

ספר מיד לרופא אם אתה נוטל או נטלת במהלך החודשים האחרונים תרופה כלשהן לב ובהמשך הטיפול אתה חוווה:

- קצב לב איטי או לא סדר או בעיות בקצב לב
- קוצר נשימה או החמרה של קוצר נשימה קיים;
- כאב בחזה;
- סחרחות;
- דפימות לב;
- מצב של כמעט עילפון או עילפון.

badikot dm

- הרופא יערוך לך בדיקות דם לפני הטיפול בווסוי, במהלךיו ואחריו. הסיבות לכך הן:
- לאפשר לרופא להחליט אם عليك ליטול ווסוי ובמשך כמה זמן.
 - לאפשר לרופא לוודא שהטיפול שלך פועל ושאין בגופך נגיף הפטיטיס C.

ילדים ומתבגרים

אין לתת תרופה זו לילדים ולמתבגרים מתחת לגיל 18 שנים. השימוש בווסוי בילדים ומתבגרים טרם נחקר.

tarrofot achoret vissavi

אם אתה לוקח, אם לקחת לאחרונה או אם יתכן ותיקח תרופות אחרות כולל תרופה ללא מרשם ותוספי תזונה, **ספר עלך לרופא או לרוקח.**

אם אין בטוח שוחח עלך עם הרופא שלך או עם הרוקח.

יש תרופות מסוימות שאין ליטול עם ווסוי. נטילת ווסוי עם תרופות אלו עלולה להפסק את פעילותן התקינה של התרופות, או להחמיר את תופעות לוואי:

- **ריפאמפיצין וריפאבוטין** (תרופה אנטיביוטית המשמשת לטיפול בזיהומיים, כולל שחפת);
- **פרע מחורר (St. John's wort)** – צמח מרפא המשמש לטיפול בדיכאון);
- **קרבמצפיין, פנובארביטאל פוניטואין** (תרופה המשמשת לטיפול באפילפסיה ומניעת התקפים);
- **רוזובסטטין** (תרופה המשמשת לטיפול ברמות כולסטרול גבוהות בدم או להפחחת הסיכון לאירועים קרדיוויסקוולריים מסוימים);
- **דיביגטרן אתקסילאט** (תרופה המשמשת למניעת היוצרות קריש דם);
- **תרופות המכילות אטיילאסטרדייל** כוללות מספר רב של גלולות למניעת הריאן.

ספר לרופא או לרוקח אם אתה נוטל אחת מהתרופות הבאות:

- **אמידארון**, המשמשת לטיפול בדופק בלתי סדר;
- **ריפאנטין** (תרופה אנטיביוטית המשמשת לטיפול בזיהומיים, כולל שחפת);
- **אוקסיקרבצfine** (תרופה המשמשת לטיפול באפילפסיה ולמניעת התקפים);
- **טנופובייר דיסופורוקסיל פומראט** או כל תרופה המכילה טנופובייר דיסופורוקסיל פומראט, המשמש לטיפול בזיהום בגין HIV; •
- **אטזנבייר, אפויירנד או לופינביר**, המשמשות לטיפול בזיהום בגין HIV; •
- **דיגוקסין**, המשמשת לטיפול בעיות לב; •
- **מודפיניל**, המשמשת לטיפול בהפרעות שינה; •
- **אטורבסטטיין, פרבסטטיין או סטטינים אחרים** המשמשים לטיפול בrama גבוהה של כולסטרול; •
- **ציקלוספורין**, המשמשת לדיכוי מערכת החיסון. •

נטילת ויסוי עם אחת או יותר מהתרופות הללו עלולה להפסיק את פעולתן התקינה של התרופות או להחמיר את תופעות הלואן. יתכן שהרופא יctrיך לתת לך תרופה אחרת או לשנות את מנת התרופה שאתה נוטל.

- **היוועץ ברופא או ברוקח** אם אתה נוטל תרופות המשמשות לטיפול בכיבי קיבה, צרבת או רפלוקס חומצី מכיוון שהן עלולות להפחית את כמות הולפטසבר בדם. תרופות אלה כוללות:
 - **סוטרי חומצה** (כגון אלומיניום/מגנזיום הידרוקסיד או סיידן חומתי) (calcium carbonate). יש ליטול את התרופות הללו לפחות 4 שעות לפני או 4 שעות אחרי ויסוי.
 - **מעכבי משאבת פרוטונים** (למשל אומפרוזול, לנסופרוזול, רברזרול, פנטופרוזול ואזומפרוזול). אם אתהzekוק למנות גדולות של התרופות הללו, יתכן שהרופא יתן לך במקום תרופה אחרת או יתאים את מנת התרופה שאתה נוטל.
 - **אנטגוניסטים לקולוטני H₂** (כמו פומוטידין, סימטידין, ניזטידין או רביטידין). אם אתהzekook למנות גדולות של התרופות הללו, יתכן שהרופא יתן לך במקום תרופה אחרת או יתאים את מנת התרופה שאתה נוטל.

תרופות אלה עלולות להפחית את הנקודות של ויסוי בדם. אם אתה נוטל את אחת התרופות הללו הרופא יתן לך תרופה שונה לטיפול בכיבי קיבה, צרבת או רפלוקס חומצី, או ימליץ על משטר מינון לשילוב בין התרופות.

- **היוועץ ברופא או ברוקח** אם אתה נוטל וורפרין או תרופות דומות אחרות הנקראות Антагонистим לויטמין K המשמשות לדילול הדם. הרופא שלך אולי יctrיך לעלות את תדירות בדיקות הדם על מנת לבדוק את עליות יכולת קרישת הדם שלך.
- **תפקודי הכבד** שלך עלולים להשנות במהלך הטיפול בהפטיטיס C וכ吐ואה מכך להשפיע על תרופות אחרות (למשל תרופות המשמשות לדיכוי המרכיב החיסוני שלך וכדומה). יתכן והרופא שלך יctrיך לנטר בקפידה אחר תרופות אחרות אלה שהן נוטל ולבצע התאמות לטיפול לאחר תחילת הטיפול בויסוי.

הירין, הנקה ופוריות
אם את בהריון, חשוב שואלי את בהריון, מניקה את תינוקך או מתכנת להרות, היוועץ ברופא לפני Nutzung תרופה זו.

הירין
מולץ שלא ליטול ויסוי בזמן ההריון. ההשפעות של ויסוי בהריון אין ידועות.

הנקה
אין להניך במהלך הטיפול בויסוי. יתכן וchlק מהחומרים הפעילים בויסוי עבריים לחלב אם.

גהיגת ושימוש במכונות

ווסוי אינו אמור להשפיע על היכולת לנוהג או להשתמש בכלים או במכונות כלשהם.

ווסוי מכילה לקטוז

ספר לרופא שלך אם יש לך אי סבירות לקטוז או לסתורים אחרים. ווסוי מכילה לקטוז מונודראט. אם נאמר לך ע"י הרופא שלך שיש לך אי סבירות לסתורים מסוימים, פונה לרופא שלך לפני נטילת תרופה זו.

ווסוי מכילה נתן

תרופה זו מכילה פחות מ- 1 מילימול נתן (23 מ"ג) לטבלייה, כך שניתן לומר שהתרופה נטולת נתן.

3. כיצד השתמש בווסוי?

תמיד יש להשתמש לפי הוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אין בטוח.

המינון המקובל

המינון המקובל הוא טבלייה אחת פעמיים ביום במשך 8 או 12 שבועות.

אין לעבור על המנה המומלצת.

יש לבלווע את הטבלייה שלמה עם אוכל. לא קיים מידע אודוט ריסוק/כתיישה של התכשיר. אין ללעוס, לרסק או לחצוץ את הטבלייה מכיוון שטעמה מר מואוד.

בעיות בכליות

ספר לרופא שלך אם לך בעיות בכליות או אתה עבר דיאליזה של כליות, היית ווסוי לא לבדוק באופן מלא בחולים עם בעיות חמורות בכליות.

בעיות בכבד

ווסוי אינה מומלצת לשימוש במקרים של בעיותBINONIOT או חמורות בכבד.

אם אתה נוטל נוגדי חומצה, יש ליטול את התרופה לפחות 4 שעות לפני או 4 שעות אחרי נטילת ווסוי.

אם אתה מקיא לאחר נטילת ווסוי, הדבר עלול להשפיע על כמות הווסוי בדם. הדבר עלול להפחית את הייעילות של ווסוי.

- במקרה של הקאה בעבר **פחות מ-4 שעות** לאחר שנטלת את ווסוי, יש ליטול מנה נוספת.
- במקרה של הקאה בעבר **יותר מ-4 שעות** לאחר שנטלת את ווסוי, אין צורך ליטול מנה נוספת עד לשעת נטילת המנה הבאה.

אם נטلت מנת ווסוי גדולה מהדרושים

אם נטلت בעutes מנה גדולה מהמנה המומלצת או אם ילד בעל בעutes את התרופה, אתה עלול להיות בסיכון מוגבר לחותות תופעות לוואי (ראה פרק 4, **תופעות לוואי**).

פונה מיד לרופא שלך או לחדר המין הקרוב ביותר למקום מגורי, הבא עmr את בקבוק הטבליות כדי שתוכל לתאר בקלות את מה שנטلت.

אם שכחת ליטול ווסוי

חשוב שלא תחמיר שום מנה של תרופה זו.

אם החמצת מנה, חשב כמה זמן חלף מאז הפעם האחרון שנטلت ווסוי:

- **אם הבדיקה בכרך לפני שחלפו 18 שעות** מהשעה שבה אתה נוטל בדרך כלל ווסוי, עליך ליטול את המנה שנשכחה בהקדם האפשרי. לאחר מכן תול את המנה הבאה בשעה הרגילה.
- **אם חלפו 18 שעות או יותר** מהשעה שבה אתה נוטל בדרך כלל ווסוי, המtan וטול את המנה הבאה בשעה הרגילה. אל תיטול מנה כפולת (שתי מנות במרוחק זמן קצר) כדי לפצות על המנה שנשכחה.

אל תפסיק ליטול ווסוי

חשיבות שתיטול את הטיפול לפי הוראות הרופא. גם אם חל שיפור במצב בריאותך, אין להפסיק ליטול את התרופה ללא הוראת הרופא. חשוב מאוד להשלים את מהלך הטיפול המלא כדי לאפשר לטרופה לטפל בצורה הטובה ביותר בחזיהום בגין הפטייטיס C.

אין ליטול תרופות בחושך. בדוק התווית והמנה **בכל פעם** שהן נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הנן דקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופות, הייעץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, תרופה זו עלולה לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימה של תופעות הלואין. יתכן ולא תסבול מכך אחת מהן.

תופעות לוואי מסוימות עלולות להיות חמורות.

הפסיק ליטול ווסוי וננה מיד לעזרה רפואית במידה אתה חווה כל אחד מהתסמינים הבאים:

- התנפחות הפה, השפטים, הלשון או הלוע (אנגיאודמה) (תופעת לוואי שאינה שכיחה – יכולת להשפיע על אדם אחד מתוך 100 אנשים).
- פריחה רחבה היקף עם עור מתקלף אשר עלולה להיות מלאה בחום, תסמייני שפעת, שלפוחיות באיזור הפה, העיניים /או איברי המין (תסמונת Stevens-Johnson) (שכיחות תופעת לוואי זו אינה ידועה).

תופעות לוואי אחרות עלולות להתרחש

תופעות לוואי שכיחות מאד
(יכולות להשפיע על יותר מאדם אחד מתוך 10 אנשים)

- כאבי ראש
- שלשלולים
- בחילות

תופעות לוואי שכיחות

(יכולות להשפיע על עד אדם אחד מתוך 10 אנשים)

- כאבי בטן
- ירידת בתאבון
- הקאות
- כאבי שרירים (מיאליgia)
- תוצאות מעבדה חריגות של תפוקדי הכבד (בלירובין כלל)
- פריחה

תופעות לוואי לא שכיחות

(יכולות להשפיע על עד אדם אחד מתוך 100 אנשים)

- התכווצויות שרירים

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלואין מחייבת או כאשר אתה סובל מהתופעת לוואי שלא ציינה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

דיווח על תופעות לוואי

אם יהו לך תופעות לוואי כלשהן, היועץ ברוקח או ברוקט. הנchia זו חלה על כל תופעות הלואין האפשריות שאין מוזכרות בעלון זה.

ניתן לדוח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול רפואי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המくん לדוח על תופעת לוואי, או ע"י כניסה לקישור: <https://sideeffects.health.gov.il>.

ניתן בנוסף לדוח על כל תופעת לוואי לבעל הרישום באמצעות דואר אלקטרוני בכתובת הבאה:
DrugSafety.Israel@gilead.com
 תוכל לעזור לספק מידע נוסף על בטיחות התרופה באמצעות דיווח על תופעות לוואי.

5. כיצד לאחסן ווסטוף

מנع הרעליה! תרופה זו יש לשמור הרחק מטבח ראייתם ומהישג ידם של ילדים /או תינוקות. על-ידי כך תמנע הרעליה. אל תגרום להקה ללא הוראה מפורשת מהרופא.

אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp.date), המופיע על הבקבוק ואירוע הקרטון. תאריך התפוגה מתיחס ליום האחרון של אותו חודש.

אין תנאי אחסון מיוחדים. מומלץ לאחסן בטמפרטורת החדר. אחסון את הטבליות באrizה המקורית כדי להגן מפני לחות. שמור את הבקבוק סגור היטב.

אין להשליך תרופות לביב או לפחות האשפה הביתי. שאל את הרוקח איך להשליך תרופות שאין נחוצות עוד. זה יסייע לשמר על הסביבה.

6. מידע נוסף

מה ווסטוי מכילה

- החומרים הפעילים הם סופוסוביר, ולפטסביר, וווקסילפרבריר.** כל טבלייה מצופה מכילה 400 מ"ג סופוסוביר, 100 מ"ג ולפטסביר ו- 100 מ"ג וווקסילפרבריר.

- יתר הרכיבים הם ליבת הטבלייה:**

Microcrystalline cellulose (E460), copovidone, lactose monohydrate (ראאה פרק 2 של העלון), croscarmellose sodium (E468) , magnesium stearate, colloidal anhydrous silica.

ציפוי הטבלייה:

Polyvinyl alcohol (E1203), titanium dioxide (E171), macrogol (E1521), talc (E553b), iron oxide yellow (E172), iron oxide red (E172), iron oxide black (E172).

כיצד גראית ווסטוי ומה תוכן הארץ?

הטבליות המצויפות הן טבליות ב'צ' בצורת קפסולה, שבחן האחד מוטבע "GSI" ובצד השני מוטבע "3". אורך כל טבלייה 20 מ"מ ורוחבה 10 מ"מ.

הטבליות ארוחות באריזת פלסטיק עם סוגר בטיחות נגד ילדים. כל בקבוק מכיל ג'ל סיליקה סופח לחות (חומר מייבש) אותו יש לשמר בתוך הבקבוק על מנת להגן על הטבליות. ג'ל הסיליקה ארוז בשקית נפרדת אותה אסור לבולע.

ניתן להציג אריזות בגודלים הבאים:

- אריזות קרטון חיצונית המכילות בקבוק אחד וбо 28 טבליות מצופות.

בעל הרישום: גיליאד סיננסז ישראל בע"מ, רחוב החרש 4, הוד השרון, 4524075, ישראל

שם הייצור:

Gilead Sciences Ireland UC, IDA Business & Technology Park, Carrigtohill, County Cork,
Ireland

נערך במאי 2023 בהתאם להנחיות משרד הבריאות
מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי משרד הבריאות: 35324

לשם הפשטות ולהקלת הקראיה, עלון זה נושא בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.

עלון אסמכתא: EU label from May 2022

IL-MAY23-EU-MAY22