

ИБУПРОФЕН ПО ПРИМЕНЕНИЮ В СООТВЕТСТВИИ С ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИМИ СТАНДАРТАМИ (ПРЕПАРАТЫ) – 1986

Нурофен жидкие капсулы 200 мг **Состав:**

Каждая жидкая капсула содержит: Ибупрофен 200 мг
Ibuprofen 200 mg

Неактивные компоненты: смотрите список в разделе 6.

- **Перед началом применения данного препарата внимательно ознакомьтесь с инструкцией.** Настоящая инструкция включает краткую информацию о препарате. Если у Вас имеются дополнительные вопросы, обратитесь к врачу или фармацевту.

- Данный препарат предназначен для взрослых и для детей старше 12 лет. Лицам младше этого возраста следует обратиться к врачу. Вам следует использовать препарат надлежащим образом. Проконсультируйтесь с фармацевтом, если Вы нуждаетесь в дополнительной информации. Обратитесь к врачу, если признаки заболевания (симптомы) усугубляются или не улучшаются в течение 10 дней для взрослого и в течение 3 дней для подростка (12-18 лет).

1. Для чего предназначен препарат?

Нурофен жидкие капсулы 200 мг предназначен в качестве обезболивающего средства при болях от слабой до средней степени тяжести, таких как: головная боль, зубные боли, боли, связанные с менструальным циклом, боли в спине и мышцах, в качестве противовоспалительного при ревматических заболеваниях и в качестве жаропонижающего.

Терапевтическая группа: Нестероидные противовоспалительные средства (NSAIDs).

Нурофен жидкие капсулы 200 мг содержат ибупрофен, относящийся к группе препаратов, называемых нестероидными противовоспалительными средствами. Эти препараты действуют, изменяя реакцию организма на боль, отек и высокую температуру.

2. Перед применением препарата

Не следует применять препарат, если:

- Вы чувствительны (у Вас есть аллергия) к ибупрофену или к любому из дополнительных компонентов препарата (смотрите список в разделе 6) или к аспирину или к другим нестероидным противовоспалительным препаратам (NSAIDs).

- Вы страдаете от кровотечения или перфорации в пищеварительной системе после использования препаратов группы NSAIDs.

- Вы страдаете или страдали в прошлом рецидивирующей язвой желудочно-кишечного тракта (2 отдельных эпизода или более, подтвержденной язвы желудочно-кишечного тракта или кровотечения, либо другими заболеваниями пищеварительной системы).

- У Вас ранее наблюдалась гиперчувствительность (например, бронхоспазм, астма, насморк (ринит), ангионевротический отек или крапивница) на прием ибупрофена, аспирина или другого противовоспалительного средства (из группы NSAIDs).

- Вам не исполнилось 12 лет.

- Вы страдаете от тяжелой печеночной недостаточности или тяжелой почечной недостаточности, или тяжелой сердечной недостаточности.

- Вы находитесь на последних трех месяцах беременности (смотрите раздел "Фертильность, беременность и кормление грудью").

Особые предостережения, касающиеся применения препарата

Перед лечением Нурофеном жидкие капсулы 200 мг сообщите Вашему врачу, если:

- Вы страдаете или страдали в прошлом от астмы.
- Вы страдаете заболеваниями почек или печени.
- Вы страдаете заболеваниями сердца, включая сердечную недостаточность, стенокардию, или если в прошлом Вы перенесли инфаркт миокарда, операцию аортокоронарного шунтирования, заболевания

периферических артерий (затрудненное кровообращение в ногах, в результате сужения или закупорки артерий) или любой тип инсульта (включая «мини-инсульт» или транзиторную ишемическую атаку).

- Вы страдаете заболеваниями пищеварительной системы (такими как, болезнь Крона или язвенный колит).

- Вы страдаете высоким кровяным давлением, диабетом, высоким холестерином или, если у Вас в прошлом были заболевания сердца или инсульт, или, если Вы курите.

- Вы страдаете последствиями травмы головы, необъяснимым кровотечением или повышенным внутричерепным давлением.

- Вы страдаете заболеванием соединительной ткани, например, системной красной волчанкой (Лупус).

- Ваш возраст старше 65 лет, поскольку пожилые люди имеют более высокий риск возникновения побочных эффектов, таких как, кровотечение и перфорация желудка, которые могут оказаться фатальными.

- Вы постоянно принимаете лекарства.

o Вы страдали в прошлом от кровотечения или перфорации желудка после приема ибупрофена или других препаратов группы NSAIDs.

Не рекомендуется использовать этот препарат в период заболевания ветряной оспой (Varicella).

- У Вас имеется инфекция - поскольку Нурофен жидкие капсулы 200 мг может скрывать такие признаки инфекции, как жар и боль. Следовательно, возможно, что Нурофен жидкие капсулы 200 мг приведет к отсрочке соответствующего лечения инфекции, что в свою очередь, может вызвать повышение риска возникновения осложнений. Подобное наблюдалось при пневмонии, вызванной бактериями, а также бактериальными кожными инфекциями, связанными с ветряной оспой. Если Вы принимаете данный препарат в то время, когда у Вас имеется инфекция, и при этом симптомы инфекции сохраняются или ухудшаются, немедленно обратитесь к врачу.

- Вы - подросток, страдающий обезвоживанием. В этом случае существует риск повреждения почек.

Дополнительные предостережения

Прием противовоспалительных/обезболивающих препаратов, таких как ибупрофен, может быть связан с небольшим увеличением риска сердечного приступа или инсульта, особенно при использовании высоких доз. Не превышайте рекомендованную дозу или продолжительность лечения.

Сообщалось о серьезных кожных реакциях при лечении препаратом Нурофен жидкие капсулы 200 мг. Вам следует прекратить прием препарата Нурофен жидкие капсулы 200 мг и немедленно обратиться за медицинской помощью, если у Вас появилась кожная сыпь, поражения слизистых оболочек, волдыри или другие признаки аллергии, поскольку это могут быть первые признаки очень серьезной кожной реакции. См. раздел 4.

Межлекарственные взаимодействия

Если Вы принимаете или принимали в последнее время другие лекарственные препараты, включая безрецептурные препараты и биодобавки, сообщите об этом Вашему врачу или фармацевту. В особенности, если Вы принимаете:

- Аспирин или препараты группы NSAIDs (например, COX-2 inhibitors).

- Кортикостероиды (такие как преднизолон), поскольку это может вызвать повышенный риск возникновения язвы желудка и кровотечения.

- Лекарства для лечения сердечной недостаточности, такие как, дигоксин.

- Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина для лечения депрессии (SSRIs), поскольку они могут увеличить риск возникновения побочных эффектов в желудочно-кишечном тракте.

- Диуретики, поскольку препараты группы NSAIDs могут ослабить их действие.

- Литий (для лечения депрессии), так как имеются сообщения о возможном повышении уровня лития в крови.

- Метотрексат (для лечения рака и ревматизма), так как имеются сообщения о возможном повышении уровня метотрексата в крови.

- Гипогликемические препараты (пероральные препараты для лечения диабета).

- Аминогликозиды (антибиотики).

- Пробенецид (для лечения подагры).

- Циклоспорин или такролимус (для подавления иммунной системы), так как существует риск увеличения поражения почек.

- Зидовудин: повышается риск внутреннего кровоизлияния и кровотечения в суставах у пациентов с HIV (+), получающих лечение зидовудином и ибупрофеном одновременно.

- Хинолоны (антибиотики) - так как пациенты, принимающие

препараты группы NSAIDs и антибиотки группы хинолонов подвергаются риску возникновения судорог.

- Антикоагулянты (например, для снижения свертываемости крови, такие как, аспирин, варфарин, тиклопидин).

- Препараты для снижения артериального давления, такие как, бета-блокаторы (например, атенолол), ингибиторы ACE (например, каптоприл) и антагонисты ангиотензина II (например, лосартан).

- Мифепристон (для прекращения беременности).

Ряд других препаратов также может повлиять на лечение препаратом Нурофен жидкие капсулы 200 мг, либо лечение им может повлиять на лечение данными препаратами. Поэтому, следует всегда консультироваться с врачом или фармацевтом, прежде чем принимать этот препарат вместе с другими.

Фертильность, беременность и кормление грудью

- Данный препарат относится к группе препаратов, которые могут ухудшать фертильность у женщин. Это состояние обратимо после прекращения использования препарата. Препарат может повлиять на Ваши шансы забеременеть. Если Вы планируете забеременеть или не можете забеременеть, проконсультируйтесь с врачом перед использованием этого лекарства.

Данный препарат имеет возможный побочный эффект в виде поражения почек у плода и дефицита амниотической жидкости, начиная с 20-й недели беременности. Рекомендуется избегать применения препаратов NSAIDs начиная с 20-й недели беременности и проконсультироваться с медперсоналом в случае необходимости.

- Проконсультируйтесь с врачом, если Вы находитесь в периоде первых 6 месяцев беременности. Не используйте это лекарство, если Вы находитесь в периоде последних 3 месяцев беременности.

- Ибупрофен может проникать в грудное молоко при очень низких концентрациях, маловероятно, что этот препарат повлияет на Вашего ребенка. Нет необходимости избегать кормления грудью во время кратковременного лечения рекомендуемой дозой.

Вождение и управление механизмами

Нет никакого известного эффекта препарата на вождение автомобиля и управление механизмами.

Использование препарата подростками

Существует риск нарушения функции почек у подростков, страдающих обезвоживанием.

Важная информация о некоторых компонентах препарата

Данный препарат содержит 22.26 мг сорбитола в каждой жидкой капсуле.

Если врач сообщил Вам, что Вы страдаете непереносимостью некоторых углеводов, Вам следует проконсультироваться с врачом перед приемом данного препарата.

Препарат также содержит Ponceau4R (E124), который может вызвать аллергическую реакцию.

3. Как использовать препарат?

При возникновении сомнений Вам следует обратиться к врачу или фармацевту.

Рекомендуемая дозировка, как правило:

Взрослые и дети старше 12 лет:

1-2 жидкие капсулы со стаканом воды, до 3 раз в день. Следует обождать, как минимум, 4 часа перед приемом следующей дозы.

Не принимать более 6 жидких капсул в течение 24 часов.

Препарат не предназначен для детей младше 12 лет.

Нельзя превышать рекомендуемую дозировку.

Подросткам (12-18 лет) - не следует принимать данный препарат более 3 дней.

Взрослым не следует принимать данный препарат более 10 дней без четких указаний врача.

Для облегчения симптомов следует принимать минимальную дозу в течение кратчайшего периода времени.

Если признаки заболевания не улучшаются или усугубляются, или если появляются новые признаки заболевания, проконсультируйтесь с Вашим врачом или фармацевтом.

Если Вы страдаете от инфекции, а симптомы (такие как жар и боль) не проходят или усиливаются, следует немедленно обратиться к врачу (смотрите раздел 2).

Способ приема: Проглотить препарат, запив стаканом воды. Следует проглотить жидкую капсулу целиком. Не жевать.

- **Если Вы по ошибке допустили передозировку** или если

ребенок по ошибке проглотил этот препарат, немедленно обратитесь к врачу или в приемный покой больницы, взяв с собой упаковку препарата. Симптомы могут включать тошноту, боль в животе, рвоту (может быть с кровью), головную боль, звон в ушах, спутанность сознания и подергивание глаз. При приеме высоких доз сообщалось о сонливости, боли в груди, сильноном сердцебиении, потере сознания, судорогах (особенно у детей), слабости и головокружении, крови в моче, ощущении холода в теле и нарушении дыхания.

- **Если Вы забыли принять препарат** в необходимое время, не следует принимать двойную дозу. Примите следующую дозу в обычное время и не превышайте рекомендуемой дозировки.

- Не принимайте лекарства в темноте! **При каждом** приеме препарата проверьте этикетку и дозировку. При необходимости пользуйтесь очками.

При возникновении дополнительных вопросов об использовании препарата, проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом.

4. Побочные эффекты

Как и при приеме любого лекарственного препарата, прием Нурофена жидкие капсулы 200 мг может привести к побочным эффектам у части потребителей. Не следует пугаться при прочтении списка побочных эффектов. Вероятно, что Вы не будете страдать ни от одного из них.

Необходимо обратиться к врачу, если у Вас есть:

- Нарушения пищеварения, такие как, необъяснимая боль в животе, диспепсия, тошнота или рвота, запор, понос, метеоризм.
- Признаки кровотечения в желудке или кишечнике (кровавая рвота и/или черный стул) или обострение язвенного колита и болезни Крона.
- Язва желудка.
- Заболевания печени или почек.
- Серьезное воспаление горла, сопровождающееся лихорадкой и гриппоподобными симптомами, чрезмерной усталостью, кровотечением из носа или кожи, язвami во рту.
- Серьезные кожные проявления, такие как: шелушение кожи, например, синдром Стивенса-Джонсона.
- Сильная головная боль, скованность в шее, тошнота, рвота, лихорадка, спутанность сознания.

• **Аллергическая реакция**, такая как необъяснимые хрипы, одышка, отек лица, языка или горла, сердцебиение, кожная сыпь или зуд (крапивница).

• Астма, обострение астмы или хрипы.

• Нарушения в системе кровообращения, припухлость (отек), высокое кровяное давление, сердечная недостаточность, нарушения четкости зрения.

• Легко возникающие синяки или кровотечения (тромбоцитопения - снижение количества тромбоцитов).

• Осложнения в виде тяжелых инфекций кожи и мягких тканей во время ветряной оспы (Varicella).

• Тяжелая кожная реакция, известная как DRESS синдром (синдром лекарственно-индуцированной реакции с эозинофилией и системными симптомами). Симптомы (DRESS) включают: кожную сыпь, лихорадку, отек лимфатических узлов и увеличение количества эозинофилов (тип лейкоцитов).

• Красная диффузная сыпь с чешуйками, кожными возвышениями и волдырями, распространенными преимущественно в складках кожи, на туловище и верхних конечностях, сопровождается жаром на начальном этапе лечения (острый генерализованный экзантематозный пустулёз, AGEP). Если у Вас возникли эти симптомы, следует прекратить использование препарата Нурофен жидкие капсулы 200 мг и немедленно обратиться за медицинской помощью. См. также раздел 2.

Кожа становится чувствительной к свету.

Побочные эффекты могут ослабнуть при приеме малых доз и кратковременном приеме препарата.

- Такие препараты, как Нурофен жидкие капсулы 200 мг, могут быть связаны с небольшим увеличением риска инфаркта миокарда или инсульта.

- Пожилые люди подвергаются повышенному риску возникновения побочных эффектов.

- Если у Вас в прошлом были аллергические заболевания, у Вас может возникнуть одышка.

Сообщите Вашему врачу, в случае возникновения каких-либо необычных симптомов, в особенности, если у Вас появился черный стул, рвота или боль в животе.

Было сообщено, что серьезные поражения кожи (например, синдром Стивенса-Джонсона) могут быть связаны с приемом

NSAIDs. При первом проявлении сыпи, язв в полости рта или любых других признаков аллергических реакций, следует немедленно прекратить прием Нурофена жидкие капсулы 200 мг. У больных, страдающих язвенной болезнью, и у пожилых людей существует повышенный риск возникновения желудочных кровотечений, язв и перфорации, связанный с увеличением дозы NSAIDs. Рекомендуется начинать лечение с приема самой малой дозы. Следует проконсультироваться с врачом по поводу добавления лекарственного препарата, защищающего желудок.

Если появился побочный эффект, если один из побочных эффектов обострился, или если Вы страдаете от побочного эффекта, не указанного в данной инструкции, Вам необходимо проконсультироваться с врачом.

Сообщение о побочных эффектах можно отправить в Министерство здравоохранения через онлайн форму отчета о побочных эффектах, размещенную на домашней странице веб-сайта Министерства здравоохранения по адресу: (www.health.gov.il) или через следующую ссылку:

http://sideeffects.health.gov.il

5. Как хранить препарат?

Избегайте отравления! Данное лекарство, как и любое другое, следует хранить в закрытом, недоступном для детей и/или младенцев месте, во избежание отравления. **Не вызывайте рвоту**, не получив на это четких указаний врача!

- Не используйте препарат после истечения срока годности (exp. date), указанного на упаковке. Срок годности относится к последнему дню указанного месяца.

Условия хранения:

- Храните при температуре ниже 25°C. Следует хранить препарат в той же упаковке.

Не следует выбрасывать лекарства в унитаз или в мусор. Проконсультируйтесь с фармацевтом о том, как выбрасывать ненужные лекарства, в целях охраны окружающей среды.

6. Дополнительная информация

В дополнении к действующему веществу препарат также содержит:

Macrogol 600, Potassium Hydroxide (minimum 85% purity), Purified water, Gelatin, Sorbitol liquid, partially hydrated, Ponceau 4R (E124), Opacode WB white NS-78-18011.

Как выглядит лекарство и что включает упаковка:

- Мягкая полупрозрачная капсула красного цвета, овальной формы, с импринтингом белого цвета. Капсулы упакованы форме подноса (блистера).

- Размер упаковки: препарат предоставляется в картонной упаковке, содержащей блистер с 4, 10, 16, 20 или 40 капсулами. Не все виды упаковки могут находиться в продаже.

Владелец лицензии и его адрес: Рекит бенкизер (Нир Ист) Лтд., Ул. Ханагар 6, Ход хашарон 4527704.

Эл.почта: service.israel@rb.com

Производитель и его адрес: Рекит бенкизер хелфкер интернэшннал Лтд., Ноттингем, Англия.

Пересмотрено в мае 2022 года в соответствии с указаниями Минздрава.

Регистрационный номер лекарства из государственного реестра Министерства здравоохранения: 159-74-34707-00