

أوجمنتين معلق 400 ملغ/5 ملل

مسحوق لتحضير معلق للشرب

كل 5 ملل معلق تحتوي على:

400 ملغ أموكسيسيلين (على شكل تريهيدرات)

amoxicillin (as trihydrate)

57 ملغ حمض كلافلولانريك (على شكل ملح البوتاسيوم)

clavulanic acid (as potassium salt)

كل 1 ملل معلق يحتوي على:

80 ملغ أموكسيسيلين (على شكل تريهيدرات)

amoxicillin (as trihydrate)

11.4 ملغ حمض كلافلولانريك (على شكل ملح البوتاسيوم)

clavulanic acid (as potassium salt)

مواد غير فعّالة ومثيرة للحساسية: أنظر الفصل 2 البند "معلومات مهمة عن قسم من مركبات الدواء" والفصل 6 "معلومات إضافية"

اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل إستعمالك للدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي. وصف هذا الدواء من أجلك/من أجل طفلك. لا تعطيه للأخرين. فهو قد يضرهم حتى ولو بدا لك أن حالتهم الطبية مشابهة لحالتك.

1. لأي غرض مخصص الدواء؟

يستعمل أوجمنتين لدى الكبار، الأطفال والرضع لعلاج التلوثات التالية:

- تلوثات في الأذن الوسطى والجيوب الأنفية
- تلوثات في الطرق التنفسية
- تلوثات في المسالك البولية
- تلوثات في الجلد وفي الأنسجة الرخوة، بما في ذلك التلوثات في الأسنان
- تلوثات في العظام والمفاصل
- التهاب اللوزتين المتكرر.

لا تتوفر معطيات سريرية بخصوص متعاجين دون عمر شهرين.

أوجمنتين عبارة عن مضاد حيوي الذي يعمل بواسطة إبادة الجراثيم المسببة للتلوثات. فهو يحتوي على دوائين إثنين مختلفين يسميان أموكسيسيلين وحمض كلافلولانريك. ينتمي أموكسيسيلين لفصيلة الأدوية المسماة "بينيسيلينات" التي يمكن أن يتوقف عملها أحياناً (تصبح غير فعّالة). إن المركب الفعال الآخر (حمض كلافلولانريك) يمنع حدوث هذا الأمر.

الفصيلة العلاجية

أموكسيسيلين: مضاد حيوي من فصيلة البنيسيلينات

حمض كلافلولانريك: مثبطات الإنزيم بيتا-لاكتاماز

2. قبل إستعمال الدواء

لا يجوز إستعمال الدواء إذا:

- كنت أنت أو طفلك لديكما حساسية (أليرجيا) لـ أموكسيسيلين، لحمض كلافلولانريك، لبينيسيلين أو لكل واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء (مفصلة في الفقرة 6)

- حدث لديك أو لدى طفلك ذات مرة رد فعل تحسسي خطير لأي مضاد حيوي آخر. ذلك قد يشمل طفح في الجلد أو إنتفاخ الوجه أو الحنجرة
- حدث لديك أو لدى طفلك ذات مرة مشاكل في الكبد أو يرقان (إصفرار الجلد) عند تناول مضاد حيوي.
- ← لا تتناول أوچمنتين أو لا تعطي لطفلك أوچمنتين إذا إنطبق عليك أو على طفلك واحد مما ذكر. إذا لم تكن واثقاً، تحدث مع الطبيب أو الصيدلي قبل إعطاء/تناول أوچمنتين.

تحذيرات خاصة تتعلق باستخدام الدواء

إستوضح من الطبيب أو الصيدلي قبل إعطاء أوچمنتين لطفلك أو تناول أوچمنتين إذا:

- وجد لديك أو لدى طفلك مرض القيلة
 - كنت أنت أو طفلك تتلقين علاجاً جراً مشاكل في الكبد أو الكلية
 - كنت أنت أو طفلك لا تتبولان بشكل سليم.
- إذا لم تكن واثقاً فيما إذا ينطبق عليك أو على طفلك واحد مما ذكر، تحدث مع الطبيب أو الصيدلي قبل إعطاء/تناول أوچمنتين.
- في حالات معينة، من الجائز أن يفحص الطبيب نوع الجرثومة المسببة للتلوث. وفقاً للنتائج، من الجائز أن يعطى لك أو لطفلك أوچمنتين من عيار آخر أو دواء آخر.

حالات يتوجب عليك الإنتباه إليها

قد يؤدي أوچمنتين إلى تفاقم حالات معينة موجودة، أو يسبب أعراضاً جانبية خطيرة. هذه تشمل ردود فعل تحسسية، إختلاجات (تشنجات) والتهاب الأمعاء الغليظة. عليك الإنتباه لأعراض معينة خلال فترة تناولك أنت أو طفلك لـ أوچمنتين، لتقليل خطورة حدوث أية مشاكل. أنظر 'حالات يتوجب عليك الإنتباه إليها' في الفقرة 4.

فحوص الدم والبول

بلغ الطبيب بأنك أنت/طفلك تتناولان أوچمنتين وذلك إذا كنت أنت أو طفلك تجتازان فحوص الدم (مثل فحوص تقييم حالة خلايا الدم الحمراء أو فحوص لوظائف الكبد) أو فحوص البول (لفحص نسب الجلوكوز). وذلك لأن أوچمنتين يمكن أن يؤثر على نتائج فحوص من هذا النوع.

تفاعلات/ردود فعل بين الأدوية

- إذا كنت أنت/طفلك تتناولان، إذا تناولت/تناول مؤخراً أو إذا كان من الجائز أن تتناول/يتناول أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية، أدوية نباتية وإضافات غذائية، إحك للطبيب أو الصيدلي عن ذلك. خاصة:
- إذا كنت أنت/طفلك تتناولان ألپورينول (يستعمل للنقرس) مع أوچمنتين، فهناك إحتمال أكبر بأن يحدث لديك/لدى طفلك رد فعل تحسسي جلدي.
 - إذا كنت تتناول أنت/طفلك پروبيبيسيد (يستعمل للنقرس)، فمن الجائز أن يقرر الطبيب ملاءمة الجرعة الدوائية من أوچمنتين.
 - إذا تم تناول أدوية تساعد على منع تخثر الدم (مثل وارفارين أو أسينوكومارول) مع أوچمنتين فمن الجائز أن يتطلب الأمر إجراء فحوص دم إضافية.
 - يمكن أن يؤثر أوچمنتين على طريقة عمل ميتوتريكسات (دواء يستعمل لعلاج السرطان أو الأمراض الروماتيزمية).
 - يمكن أن يؤثر أوچمنتين على طريقة عمل ميكوفينولات موفيتيل (دواء يستعمل لمنع رفض الأعضاء المزروعة).

الحمل، الإرضاع والخصوبة

إذا كنت أنت/طفلك المقبلة على تناول هذا الدواء، في فترة الحمل أو الرضاعة، تعتقدن أنك حامل/أنه من الجائز أنها حامل أو تخطط للحمل، توجهي إلى الطبيب أو الصيدلي لتلقي إستشارة قبل تناول هذا الدواء.

السياقة وإستعمال الماكينات

يمكن أن يسبب أوچمنتين أعراضاً جانبية حيث أن هذه الأعراض قد تجعلك غير مؤهل للسياقة. لا تقم بالسياقة أو تشغيل الماكينات إلا إذا كنت تشعر بشكل جيد.

معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء

يحتوي أوچمنتين على أسپارتام، كحول بنزيلي و مالتوديكسترين.

- يحتوي أوجمنتين على 2.5 ملغ أسبارتام (E951) في كل 1 ملل. أسبارتام هو مصدر لـ فينيل ألانين. هذا الأمر قد يضر بالمتعالمين الذين يعانون من بيلة الفينيل كيتون، اضطراب جيني نادر حيث يتراكم فيه فينيل ألانين لأن الجسم غير قادر على طرحه كما ينبغي.
- يحتوي أوجمنتين على آثار الكحول البنزيلي. من الممكن أن يسبب الكحول البنزيلي ردود فعل تحسسية.
- يحتوي أوجمنتين على مالتوديكتستين (چلوکوز). إذا قيل لك من قبل الطبيب بأن لدى طفلك/لديك عدم تحمل لسكريات معينة، إتصل بالطبيب قبل إعطاء/تناول هذا الدواء.

3. كيفية استعمال الدواء؟

يجب دائماً استعمال المستحضر حسب تعليمات الطبيب. عليك الإستيضاح من الطبيب أو من الصيدلي إذا لم تكن واثقاً بخصوص الجرعة الدوائية وطريقة العلاج بالمستحضر. الجرعة الدوائية وطريقة العلاج يحددان من قبل الطبيب فقط. الجرعة الدوائية الإعتيادية هي عادة:

الكبار والأطفال الذين يزنون 40 كغ أو أكثر

- لا يوصى عادة بهذا المعلق لكبار وأطفال يزنون 40 كغ وما فوق. راجع الطبيب أو الصيدلي لتلقي إستشارة.

الأطفال الذين يزنون أقل من 40 كغ

- يتم حساب كافة الجرعات الدوائية وفقاً لوزن الجسم بالكيلوغرامات.
- يوصيك طبيبكم كم من أوجمنتين عليك إعطاء رضيعك أو طفلك.
- من الجائز أن يتم تزويدك بملعقة كبيرة أو محقنة قياس بلاستيكية. بالإمكان إيجاد تعليمات استعمال محقنة القياس في نهاية هذه النشرة. عليك استعمالهما لإعطاء الجرعة الدوائية الصحيحة لرضيعك أو لطفلك.
- لا تتوفر معطيات سريرية بخصوص متعالمين دون عمر شهرين.

متعالمون لديهم مشاكل في الكلية والكبد

- إذا وجدت لديك أو لدى طفلك مشاكل في الكلية فمن الجائز أن يتم تخفيض الجرعة الدوائية. فمن الجائز أن يختار الطبيب عيار آخر أو دواء آخر.
- إذا وجدت لديك أو لدى طفلك مشاكل في الكبد فمن الجائز أن يحتاج الأمر إجراء فحوص دم بتواتر أكبر وذلك لفحص وظائف الكبد.

لا تتجاوز الجرعة الدوائية الموصى بها

تعليمات الفتح: لنزع الغطاء، يجب الضغط نحو الأسفل والتدوير نحو اليسار (ضد إتجاه عقارب الساعة) في نفس الوقت. تعليمات الإغلاق: يجب إغلاق القنينة جيداً بواسطة الغطاء، بتدويره نحو اليمين (مع إتجاه عقارب الساعة) حتى الإغلاق التام.

كيف تعطي/تتناول أوجمنتين

- دائماً خض القنينة جيداً قبل كل جرعة دوائية.
- أعطي/تناول في بداية وجبة الطعام أو قبلها بقليل.
- يجب توزيع الجرعات الدوائية بشكل متساوي خلال اليوم، بفاصل زمني قدره 4 ساعات على الأقل. لا تتناول/تعطي طفلك جرعتين دوائيتين خلال ساعة واحدة.
- لا تتناول/تعطي طفلك أوجمنتين لأكثر من أسبوعين. إذا ما زلت أنت/طفلك تشعران بسوء، فعليك/عليه العودة لمراجعة الطبيب.

إذا أعطيت/تناولت بالخطأ جرعة دوائية أكبر

إذا أعطيت طفلك/تناولت بالخطأ أكثر مما ينبغي من أوجمنتين، فإن العلامات قد تشمل إنزعاج في البطن (غثيان، تقيؤ أو إسهال) أو إختلاجات. راجع طبيبكم بأسرع ما يمكن. خذ معك علبة الدواء لتريها للطبيب. إذا بلغ طفلك بالخطأ من الدواء، توجه حالاً إلى الطبيب أو لغرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر علبة الدواء معك.

إذا نسيت إعطاء/تناول أوجمنتين

إذا نسيت إعطاء طفلك جرعة دوائية أو نسيت تناول جرعة دوائية، أعطها/تناولها لحظة تذكرك بذلك. لا تعطي طفلك/لا تتناول الجرعة الدوائية التالية أبكر مما ينبغي، بل إنتظر 4 ساعات تقريباً قبل إعطاء/تناول الجرعة الدوائية التالية. لا تعطي/لا تتناول جرعة دوائية مضاعفة للتعويض عن الجرعة الدوائية المنسية. يجب المواظبة على العلاج حسب توصية الطبيب.

إذا توقف طفلك/أنت عن تناول أوجمنتين

عليك مواصلة إعطاء طفلك/تناول أوجمنتين إلى إنتهاء العلاج، حتى ولو شعر طفلك/ شعرت أنت بشكل أفضل. كل جرعة دوائية من الجرعات الدوائية هي مهمة من أجل طفلك/من أجلك للمساعدة على محاربة التلوث. إذا بقيت بعض الجرثائم على قيد الحياة فبإمكانها التسبب بعودة التلوث.

لا يجوز تناول الأدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتأكد من الجرعة الدوائية في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول إستعمال الدواء، إستشر الطبيب أو الصيدلي.

4. الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، إن إستعمال أوجمنتين قد يسبب أعراضاً جانبية عند بعض المستعملين. لا تندهش من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز ألا تعاني أنت/يعاني طفلك أياً منها. الأعراض الجانبية المذكورة أدناه من شأنها أن تحدث مع هذا الدواء.

حالات يتوجب عليك الإنتباه إليها

ردود فعل تحسسية:

- طفح جلدي
- التهاب الأوعية الدموية (*vasculitis*) الذي من شأنه أن يبدو كبقع حمراء أو بنفسجية بارزة على الجلد، لكنه يمكن أن يؤثر على مناطق أخرى من الجسم
- سخونة، ألم في المفاصل، إنتفاخ غدد في الرقبة، الإبط أو في منفرج الرجلين
- إنتفاخ، أحياناً في الوجه أو الحنجرة (وذمة وعائية)، الذي يؤدي لصعوبات في التنفس
- إنهيار

← راجع الطبيب حالاً إذا قاسيت أنت/طفلك من إحدى تلك الأعراض.

توقف عن إعطاء/تناول أوجمنتين.

التهاب الأمعاء الغليظة

يؤدي التهاب الأمعاء الغليظة إلى إسهال مائي الذي يترافق عادة بدم ومخاط، وإلى ألم في البطن و/أو سخونة. ← راجع الطبيب بأسرع ما يمكن لتلقي إستشارة وذلك إذا قاسيت أنت/طفلك من تلك الأعراض.

أعراض جانبية إضافية

أعراض جانبية شائعة

- من شأنها أن تظهر لدى حتى 1 من كل 10 أشخاص
- فطر (المبيضات-تلوث فطري في المهبل، الفم أو ثنايا الجلد)
 - غثيان، خاصة عند تناول جرعة دوائية مرتفعة
 - ← إذا ظهر غثيان، تناول/أعطي أوجمنتين قبل الطعام
 - تقيؤ
 - إسهال (لدى الأطفال)

أعراض جانبية غير شائعة

- من شأنها أن تظهر لدى حتى 1 من كل 100 شخص
- طفح في الجلد، حكة
 - طفح بارز وحاك (شرى)
 - مشاكل هضمية
 - دوار

- صداع
- أعراض جانبية غير شائعة التي من شأنها أن تظهر في فحوص الدم:
- ارتفاع في إنزيمات الكبد

أعراض جانبية نادرة

- من شأنها أن تظهر لدى حتى 1 من كل 1000 شخص
- طفح في الجلد، الذي من شأنه أن يشمل حويصلات (التي تبدو مثل بقع داكنة في المركز محاطة بمنطقة شاحبة، مع حلقة داكنة حول الأطراف - حمى متعددة الأشكال (*erythema multiforme*)
- ← إذا لاحظت إحدى تلك الأعراض راجع الطبيب عاجلاً.
- أعراض جانبية نادرة من شأنها أن تظهر في فحوص الدم:
- قلة عدد الخلايا التي تشارك في تخثر الدم
- قلة عدد خلايا الدم البيضاء

أعراض جانبية بشيوع غير معروف (لا يمكن معرفة الشيوع من المعطيات المتوفرة)

- ردود فعل تحسسية (أنظر سابقاً)
- التهاب الأمعاء الغليظة (أنظر سابقاً)
- التهاب العشاء الواقي الذي يغلف الدماغ (التهاب السحايا الدماغية اللا تلوثي)
- ردود فعل جلدية خطيرة:
- طفح منتشر مع حويصلات وتقشر للجلد، خاصة حول الفم، الأنف، العينين والأعضاء التناسلية (متلازمة ستيفنس - جونسون)، وعرض أكثر خطورة، الذي يؤدي إلى تقشر واسع للجلد (أكثر من 30% من مساحة سطح الجسم - إنحلال البشرة الناخر السمي)
- طفح أحمر منتشر في الجلد يترافق بحويصلات صغيرة حاوية على قيح (*bullous exfoliative dermatitis*)
- طفح أحمر حشفي يترافق بنتوءات تحت الجلد وحويصلات (*exanthematous pustulosis*)
- أعراض شبيهة بالإنفلونزا تترافق بطفح، سخونة، إنتفاخ في الغدد، ونتائج شاذة في فحوص الدم (بما في ذلك ارتفاع كمية خلايا الدم البيضاء [*eosinophilia*] وإنزيمات الكبد) (رد فعل للدواء الذي يشمل كثرة الحمضات وأعراض جهازية [*DRESS*])
- ← راجع الطبيب حالاً إذا قاسيت أنت/طفلك من إحدى تلك الأعراض.
- التهاب الكبد (*hepatitis*)
- يرقان، الذي ينجم عن ارتفاع في البيليروبين في الدم (مادة تنتج في الكبد) الذي قد يؤدي إلى إصفرار الجلد وبياض العين لدى طفلك/لديك
- التهاب أنابيب الكلية
- إطالة زمن التخثر
- فرط نشاط (*hyperactivity*)
- إختلاجات (لدى أشخاص يتناولون جرعات دوائية مرتفعة من أوجمنتين أو لديهم مشاكل في الكلية)
- لسان أسود يبدو مليء بالشعر
- بقع على الأسنان (لدى الأطفال)، عادة يمكن إزالتها بالتفريش
- أعراض جانبية التي من شأنها أن تظهر في فحوص الدم أو البول:
- إنخفاض شديد في عدد خلايا الدم البيضاء
- إنخفاض عدد خلايا الدم الحمراء (فقر الدم الإنحلالي)
- بلورات في البول.

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقت إحدى الأعراض الجانبية أو عندما يعاني طفلك/تعاني أنت من عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة، عليك إستشارة الطبيب.

بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "تبليغ عن أعراض جانبية عقب علاج دوائي" الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يوجهك إلى النموذج المباشر للتبليغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق تصفح الرابط:

<https://sideeffects.health.gov.il>

5. كيفية تخزين الدواء؟

تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي ومجال رؤية الأطفال و/أو الرضع وذلك لتفادي إصابتهم بالتسمم. لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب. لا يجوز إستعمال الدواء بعد إنقضاء تاريخ الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على ظهر العلبة. يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

مسحوق جاف

يجب التخزين في العلبة الأصلية للحماية من الرطوبة. يجب التخزين دون 25°C.

معلق سائل

خزن في البراد (ما بين 2°C إلى 8°C). لا يجوز التجميد. بعد التحضير، يجب إستعمال المعلق خلال 7 أيام. لا يجوز رمي الأدوية في المجاري أو في القمامة المنزلية. إستشر الصيدلي عن كيفية التخلص من أدوية لم تعد قيد الإستعمال. تساعد هذه الإجراءات في الحفاظ على البيئة.

6. معلومات إضافية

• يحتوي الدواء بالإضافة للمواد الفعالة أيضاً على:

Silicon dioxide (anhydrous), hydroxypropylmethylcellulose dried (hypromellose), colloidal anhydrous silica, golden syrup dry flavour*, raspberry dry flavour*, orange dry flavour 1* (includes benzyl alcohol), xanthan gum, aspartame (E951), orange dry flavour 2*, succinic acid. (*also includes maltodextrin)

أنظر أيضاً 'معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء' في الفقرة 2.

• كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العلبة:

عبوة قنينة يصعب على الأطفال فتحها.

أوجمنتين معلق 400 ملغ/5 ملل (بطعم الفواكه) مسحوق لتحضير معلق فموي، هو مسحوق أبيض-أوف-وايت متوفر ضمن قنينة زجاجية شفافة. بعد تحضيره تحتوي القنينة على 35 ملل، 70 ملل، أو 140 ملل خليط سائل لونه أبيض-أوف-وايت يسمى معلق. قد لا يتم تسويق جميع أحجام العبوات.

• إسم صاحب الإمتياز وعنوانه: جلاكسوسميثكلين (إسرائيل) م.ض.، شارع بازل 25، بيتنح تكفا.

• إسم المنتج وعنوانه: جلاكسوسميثكلين تريدينج سيرفيس ليميتد، دبلن، إيرلندا.

• تم تحريرها في نيسان 2023 وفق تعليمات وزارة الصحة.


• رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة: 112-75-29288

• من أجل سهولة وتهوين القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكر. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.

تعليمات التحضير:

إنزع غطاء القنينة. تأكد من أن ختم الورق المعدني كاملاً قبل الإستعمال. أعد غطاء القنينة.

1. خذ القنينة لفصل المسحوق.



2. إنزع غطاء القنينة.



3. قشر ختم الورق المعدني للخلف من أجل إزالته.



4. أضف حجم ماء (كما هو مذكور أدناه). أعد غطاء القنينة، إقلب وخض جيداً.

لتحضير معلق ضمن عبوة ذات 35 ملل يجب إضافة 31 ملل ماء.

لتحضير معلق ضمن عبوة ذات 70 ملل يجب إضافة 62 ملل ماء.

لتحضير معلق ضمن عبوة 140 ملل يجب إضافة 124 ملل ماء.

5. خزن في البراد ودائماً خض قبل الإستعمال.

في اللحظة التي يكون فيها جاهزاً، يجب إستعمال المعلق خلال 7 أيام.

تعليمات إستعمال محقنة القياس


يتم التزويد بمحقنة من أجل إعطاء أوجمنتين

المحقنة مخصصة للإستعمال مع أوجمنتين فقط ولا يجوز إستعمالها من أجل إعطاء أية أدوية أخرى، لأن التدرجات خاصة بهذا المنتج. تُزود المحقنة مع منسق الذي يتيح لها الإلتصاق بالقنينة. يشار للجرعة الدوائية على محقنة القياس الفموية بالميليلترات (ml). عليك تناول/إعطاء طفلك الجرعة الدوائية التي أوصى بها الطبيب.

تأكد من نظافة المحقنة والمنسق قبل الإستعمال، إغسل بواسطة مياه نظيفة إذا تطلب الأمر.

1. خض قنينة المعلق جيداً قبل كل جرعة دوائية.


2. إنزع المنسق من المحقنة. أمسك القنينة بشدة وأدخل المنسق في عنق القنينة (يجب إبقاء المنسق في مكانه).




3. أدخل المحقنة داخل المنسق تأكد من أنها مؤمنة.




4. إقلب القنينة بينما تمسك المحقنة في مكانها وإسحب الجرعة الدوائية المطلوبة كما ذكر الطبيب.



5. ضع القنينة بشكل مستقيم وقم بإخراج المحقنة.




6. من أجل تناول/إعطاء الجرعة الدوائية، ضع طرف المحقنة بحذر داخل الفم وإدفع ببطء مكبس المحقنة نحو الأسفل (كرر المراحل 3، 4، 5 و- 6، إذا تطلب أكثر من محقنة واحدة لإعطاء الجرعة الدوائية).



7. إغسل المحقنة جيداً بماء نظيف. دع المحقنة تجف تماماً قبل الإستعمال التالي.



8. أعد غطاء القنينة.



9. خزن في البراد ودائماً خض قبل الإستعمال.
بعد التحضير، يجب إستعمال المعلق خلال 7 أيام.

- العلامات التجارية هي بملكية أو بإمتياز مجموعة شركات GSK.
©2023 مجموعة شركات GSK أو صاحب الإمتياز الخاص بها.