

רמסימה 120 מ"ג/מ"ל תת-עור

החותם הפעיל וכמוות:

-

1. למה מיועדת התרופה?

- מיסימה 120 מ' גמל ת-תער, שילב במס הפטהנויגר מומס והוטטםים נול פישור הפוך. מטופלים מוגברים עם מלח פוליבר אסידיר או אנטיביוטיק (DMARDs), כלל מומנט. מושעות את מוחה מוחלה כוואר, סוליר וטיפל. מטופלים מוגברים עם מלחה כוואר, סוליר וטיפל. בערב עם מומטורקס אט או מלחה כוואר בקטצ'ן. באכיאוליזים מומיטליים פיל זונדרה אנטיביוטיק. יפי סומדה אנטיביוטיק קרי רטגן. **(Crohn's disease) חלה לת-תער מיסימה 120 מ' גמל ת-תער מועדת:**

טיפוליים מסווג זה.

דלקת חוליות מקשחת (ankylosing spondylitis) – דלקת חוליות מקשחת בעורקן ולבטן, מחלת נסיעה, מחלת ג'ונברג זנאל.

- (Psoriatic arthritis):** מחלת מפרקים ספציפית של מפרקים נסיבתית גורמת לכאבי מפרקים אכזריים וריגמיים. מחלת מפרקים ספציפית מוגדרת ככאבים נסיבתיים של מפרקים שאינם מוגדרים כהיפרטייניטיס או ארכיטיס. מחלת מפרקים ספציפית מוגדרת ככאבים נסיבתיים של מפרקים שאינם מוגדרים כהיפרטייניטיס או ארכיטיס. מחלת מפרקים ספציפית מוגדרת ככאבים נסיבתיים של מפרקים שאינם מוגדרים כהיפרטייניטיס או ארכיטיס.

טיפוסי עורם נסיבותם בזיהוים וטיפולם

בחולים מבוגרים אשר טיפול סיסטמי אחר, בטיפא גנטית ב>Showalter et al., 2003.

TNF alpha מעורב בתהליכי דלקתים בגוף ולהפחית את הדלקת בגוף. **Rheumatoid arthritis – מפרקים שיגוניים –**

דלקת מפרקים שיגורונית היא מחלת דלקתית היורם כובל מדלקת מפרקית ושיגורונית פעילה.

- במחלה קרונית היא מחלת דלקתית של המעיים. א. (Crohn's disease) לשפר את הפקת המפרקם. ב. להפחית את סמיון ומסמי מחלה.

הקהלה, טיפול קודם בתרומות אחרות. אם תרומות מספק טוב, מקבל רטסימה 120 מ"ג/מ"ל תת-עומק לטפל במחלת קרחן פעילה.

- להפחית את מספר הפיסטולות בין המעים לעור, באמצעות תרופות אחרות או ניתוח.


הוראות שימוש
קורא בעיון הוראות אלו לפני השימוש בעט רמסימה 120 מ"ג/מ"ל תת-עור.



- השימוש בעט רק אם הרופא או האחות שלך הדריכו אותך לגבי הדרכן נכון ל�权ה.
- שאל את הרופא שלך באיזו וידיות תצטרך להזריק.
- שהת מקומות ההזרקה בכל פעם שאתה מודע. כל מקום ההזרקה חדש צריך להיות לפחות בעט אמ"נ נפל או שישנו מזק הדראה לעין. עט שניזוק עלול לא לתפקיד יכולויות.
- אין לעשות שימוש חוזר בעט.
- אין לנער את העט בל-ודן.

אוזות עט רמסימה 120 מ"ג/מ"ל תת-עור'


חלקן העט (ראה אייר א')




אין להסיר את המכסה עד שאתה מוכן להזריק. ברגע שהמכסה מוסר, אין להזכיר שוב את העט באמצעות המכסה.

הכנה להזרקה

1. א. הנקה משטח נקי ושטוח, כגון שולחן או משטח שיש, באזור מאור הטב.
ב. הוציא את העט מריאת הקרטון המקורי המואחסנת במקורה.
ג. ודאי שיש ברשותך האביזרים הבאים:
 - עט
 - דכ אלכוהול
 - צנור גוף או זזה*
 - אנד מדק (פלטסטר)*
 - מיל סיליקון סולולת חדה** פיטישם שלא ללולים באירוע הקרטון.



2. בוחן את התרופה (ראה אייר ב').
המודל אמרו להזמין השקוף והסר צבע עד חום בהיר.
אין להשתמש בעט אם הנזול הימן עירום, דהוי או מכיל חלקיקים בתוכו.
הערה: יתכן שתדראה בשושן אויר בתחת הנעל. זה תקין.



3. המסתן 30 דקוטן.
א. השאיר את העט בטמפרטורת החדר במשך 30 דקות על מנת שהתרמימה התתחמם באופן טבעי.
אין להזכיר את העט תוך שימוש בחום כגון מים חמים או מיקרגול.



4. בחר מקום להזרקה (ראה אייר ג').
א. בחר מקום הרופך ניתן להזריק.
ב. אזור הקדמי של הרכיב.
ב- בין חוץ- 5 ס"מ מסביב לטברן.
• אחוריו החיצוני של הרועשת העליונות (יבצע על-ידי מטפל או צוות רפואי בלבד).
אין להזריק לתוכן העור באזורי של עד 5 ס"מ מההברור או לעור עדין, פונז, חובל, פצע או מצולק.
הערה: שינה את מקום ההזרקה בכל פעם שאתה מזריק. כל מקום הרזרקה חדש צריך להיות לפחות בעט אמ"נ נפל או שישנו מזק הדראה לעין. זה תקין.



5. נקה את מקום ההזרקה (ראה אייר ד').
א. נקה את מקום ההזרקה עם פד אלכוהול.
ב. יש למלטתן עד ליבוש העור לפני ההזרקה.
אין לשוח על מקום ההזרקה או לגעת במקומות ההזרקה שוב לפני ההזרקה.



6. שוטף את ידיך.
א. שוטף את ידיך עם סבון ומים וייבש אותן ביסודות.



7. נקה את מקום ההזרקה.
א. נקה את מקום ההזרקה עם פד אלכוהול.
ב. יש למלטתן עד ליבוש העור לפני ההזרקה.
אין לשוח על מקום ההזרקה או לגעת במקומות ההזרקה שוב לפני ההזרקה.



8. הסר את מזקם ההזרקה (ראה אייר ד').
א. מושך את המכסה בצעע יירוק צוואר לאויסו ור恵ת אומו באחד.
אין לגעת במכסה המתה. נגעה במכסה המתה עלולה להוות בעיטה בפצעה מהדקירת התחטט.
הערה: זה תקין לראות טיפול נזול בקצת המחת.



9. מזקם את העט מעל אזור ההזרקה (ראה אייר ה').
א. החזק את העט כך שתוכל לזראות את החלון.
ב. ללא צבירה או מתיחה של העור, מזקם את העט מעל אזור ההזרקה בזווית של 90 מעלות.

10. התחל את ההזרקה (ראה אייר י').
א. לחץ על העט ביציבות נגד העור.
הערה: כאשר מתחילה ההזרקה תשמע את הנקישה החזקה החלונה.
ב. המשך לאחיזה בעט ביציבות כנגד העור והאנן לנקישה החזקה השנייה ("קליק").

11. סיום ההזרקה (ראה אייר ז').
א. לאחר שתשמע אונת הנקישה החזקה השניה ("קליק"), המשך לאחיזה את העט ביציבות כנגד העור וספור לפחות לפוחתות עד 5 על מנת לוודא שאתה מזרק את המנה במלואה.

