

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו – 1986

התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד

אלוקטה 250, 500, 1000, 2000, 3000 IU

אבקה וממס להכנת תמיסה להזרקה

שם התרופה צורתה וחוזקה:

כל בקבוקון אבקה מכיל:

פקטור קרישה 8 הומני רקומביננטי 250 IU Recombinant human coagulation factor VIII (efmoroctocog alfa)

פקטור קרישה 8 הומני רקומביננטי 500 IU Recombinant human coagulation factor VIII (efmoroctocog alfa)

פקטור קרישה 8 הומני רקומביננטי 1000 IU Recombinant human coagulation factor VIII (efmoroctocog alfa)

פקטור קרישה 8 הומני רקומביננטי 2000 IU Recombinant human coagulation factor VIII (efmoroctocog alfa)

פקטור קרישה 8 הומני רקומביננטי 3000 IU Recombinant human coagulation factor VIII (efmoroctocog alfa)

לאחר המסה במים להזרקה:

- 1 מ"ל של אלוקטה 250 IU מכיל בקירוב 83 IU (250 IU / 3 מ"ל) של פקטור קרישה 8 הומני רקומביננטי
- 1 מ"ל של אלוקטה 500 IU מכיל בקירוב 167 IU (500 IU / 3 מ"ל) של פקטור קרישה 8 הומני רקומביננטי
- 1 מ"ל של אלוקטה 1000 IU מכיל בקירוב 333 IU (1000 IU / 3 מ"ל) של פקטור קרישה 8 הומני רקומביננטי
- 1 מ"ל של אלוקטה 2000 IU מכיל בקירוב 667 IU (2000 IU / 3 מ"ל) של פקטור קרישה 8 הומני רקומביננטי
- 1 מ"ל של אלוקטה 3000 IU מכיל בקירוב 1000 IU (3000 IU / 3 מ"ל) של פקטור קרישה 8 הומני רקומביננטי

חומרים בלתי פעילים ואלרגניים: ראה סעיף 6 "מידע נוסף" וסעיף 2 "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה".

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

תרופה זו נרשמה לטיפול במחלתך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מחלתם דומה.

1. למה מיועדת התרופה?

אלוקטה מיועדת לטיפול ומניעה של דימום בחולים הסובלים מהמופיליה מסוג A (חסר מולד בפקטור קרישה 8).

קבוצה תרפויטית: אלוקטה שייכת לקבוצת תרופות למניעת דימום המכילות פקטור קרישה 8.

אלוקטה מכילה את החומר הפעיל פקטור קרישה 8 הומני-רקומביננטי. פקטור קרישה 8 הינו חלבון המיוצר באופן טבעי בגוף, הנחוץ לתהליך קרישת הדם ועצירת דימום. **אלוקטה** מיוצרת בטכנולוגיה רקומביננטית ללא הוספה של מרכיבים מן האדם או מן החי בתהליך הייצור.

בחולי המופיליה מסוג A, פקטור 8 חסר או אינו עובד כראוי. **אלוקטה** ניתנת על מנת להתגבר על החסר של פקטור 8. **אלוקטה** מעלה את הרמה של פקטור הקרישה 8 בדם, ומתקנת באופן זמני את הנטייה לדימום.

2. לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש בתכשיר אם:

- אתה רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל-efmoroctocog alfa, או לכל אחד מהרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה. לרשימת המרכיבים הלא פעילים, ראה סעיף 6 "מידע נוסף".

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה

יש לפנות לרופא, רוקח או אחות לפני תחילת השימוש באלוקטה:

- קיימת אפשרות נמוכה לתגובה אלרגית חמורה פתאומית (תגובה אנאפילקטית) ל**אלוקטה**. סימנים של תגובה אלרגית עלולים לכלול גרוד כללי, סרפדת, חרלת, לחץ בחזה, קשיי נשימה ולחץ דם נמוך. אם מופיעים אצלך אחד מהתסמינים האלו, הפסק את הטיפול מיד ופנה לרופא.
- היווצרות של מעכבים (נוגדנים) הינו סיבוך ידוע שעלול להתרחש במהלך הטיפול בכל תכשירי פקטור 8. מעכבים אלו, בייחוד ברמות גבוהות, מונעים מהטיפול לעבוד כמו שצריך, ולכן אתה או ילדך תעברו מעקב צמוד לבדיקת רמות מעכבים אלו. אם הדימום שלך או של ילדך לא נשלט עם **אלוקטה**, פנה לרופא באופן מיידי.

לפני התחלת הטיפול באלוקטה, ספר לרופא אם:

- הנך סובל ממחלת לב או נמצא בסיכון לחלות במחלת לב.

- אם אתה זקוק להתקן גישה לווריד מרכזי (CVAD), יש לשקול את הסיכונים הכרוכים ב-CVAD, כגון: זיהומים מקומיים, הימצאות חיידקים בדם והיווצרות פקיק בתוך כלי הדם (תרומבוזיס) באזור החדרת הקטטר.

תיעוד

מומלץ לתעד את השם ומספר האצווה של התכשיר בכל פעם שנעשה שימוש באלוקטה.

אינטראקציות/ תגובות בין תרופתיות:

אם אתה לוקח או לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.

היריון, הנקה ופוריות:

אם את בהיריון או מניקה, חושבת שהנך בהריון או מתכננת היריון, יש להיוועץ ברופא לפני השימוש בתרופה.

נהיגה ושימוש במכוונות:

לא נצפתה השפעה על נהיגה או הפעלת מכוונות.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה:

נתרן – התרופה מכילה פחות מ-1 mmol (23 מ"ג) נתרן בכל בקבוקון, ולכן נחשבת כתרופה "ללא נתרן". עם זאת, כתלות במשקל גופך והמינון, ייתכן ותצטרך טיפול ביותר מבקבוקון בודד. יש לקחת זאת בחשבון אם אתה תחת דיאטה דלת נתרן.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

התרופה מיועדת לכל הגילאים.

התחלת הטיפול עם **אלוקטה** תעשה ע"י רופא המנוסה בטיפול בחולים עם המופיליה מסוג A. יש להשתמש בתכשיר תמיד בהתאם להוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח במידה ואינך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר.

המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד (ראה סעיף "הוראות שימוש מפורטות להכנה והזרקה של **אלוקטה**"). התרופה מיועדת להזרקה תוך ורידית הנמשכת כמספר דקות כתלות ברמת הנוחות שלך. קצב המתן לא יעלה על 10 מ"ל/דקה. מספר היחידות של פקטור קרישה 8 מתבטא ביחידות בינלאומיות (IU). הרופא יחשב את מספר היחידות הנדרשות לטיפול כתלות באם נדרש טיפול בדימום או מניעת דימום וכתלות במצבך הרפואי. פנה לרופא אם אתה חושב שהדימום שלך אינו נשלט על ידי המינון הרגיל של **אלוקטה** הנלקח על ידך.

הרופא ייקבע את תדירות הטיפול, בהתאם לתגובה הטיפולית של **אלוקטה**. הרופא יבצע בדיקות מעבדה מתאימות על מנת לוודא שהמינון שניתן לך מספק רמות הולמות של פקטור 8 בדם.

טיפול בדימום

המינון של **אלוקטה** יחושב כתלות במשקל גופך והרמות של פקטור 8 שיש להשיג. רמות המטרה של פקטור 8 יהיו תלויות בחומרת הדימום ובמיקומו.

מניעת דימום

המינון של **אלוקטה** הוא בדרך כלל 50 IU לקילוגרם משקל גוף הניתן במרווחים של 3-5 ימים. הרופא עשוי להתאים את המינון של **אלוקטה** בטווח של 25-65 IU לקילוגרם משקל גוף. במקרים מסוימים, במיוחד בחולים צעירים יותר, ייתכן שיהיה צורך במרווחי מינון קצרים יותר או במינונים גבוהים יותר.

קשישים

קיים ניסיון מועט בשימוש בחולים מגיל 65 שנה ומעלה.

ילדים ומתבגרים

ניתן להשתמש ב**אלוקטה** בילדים ומתבגרים בכל הגילאים. עבור ילדים מתחת לגיל 12, ייתכן שיהיה צורך במינונים גבוהים יותר או זריקות תכופות יותר.

אין לעבור על המנה המומלצת.

אם נטלת בטעות מינון גבוה יותר עליך לפנות לרופא בהקדם האפשרי. יש להשתמש ב**אלוקטה** תמיד בהתאם להוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח במידה ואינך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר.

אם שכחת ליטול את התרופה בזמן המיועד, אין ליטול מנה כפולה כדי לפצות על המנה שנשכחה. קח את המנה הבאה מיד והמשך במרווחים הרגילים כפי שהומלץ על ידי הרופא שלך. התייעץ עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח.

יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא.
אין להפסיק את הטיפול בתרופה ללא התייעצות עם הרופא.

אם אתה מפסיק את נטילת התרופה, ייתכן שלא תהיה מוגן מפני דימום או שדימום נוכחי לא ייפסק.

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה בכל פעם שהנך נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הינך זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היועץ ברופא.

4. **תופעות לוואי**

כמו לכל תרופה, השימוש ב**אלוקטה** עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. ייתכן ולא תסבול מאף אחת מהן.

אם מופיעה תגובה אלרגית חמורה פתאומית (תגובה אנאפילקטית), הפסק מיידית את ההזרקה.
יש לפנות לרופא באופן מיידי בעת הופעת אחד מהתסמינים הבאים של תגובה אלרגית: נפיחות בפנים, פריחה, גרד כללי, סרפדת, חלרת, לחץ החזה, קשיי נשימה, צריבה ועקצוץ במקום ההזרקה, צמרמורת, הסמקה, כאב ראש, לחץ דם נמוך, תחושת חולי כללית, בחילה, אי שקט וקצב לב מהיר, סחרחורת או אובדן הכרה.

בילדים שלא טופלו בעבר בתכשירים המכילים פקטור 8, תיתכן היווצרות של נוגדנים מעכבים (ראה סעיף 2 "אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה") בשכיחות גבוהה מאד (יותר ממטופל 1 מתוך 10 מטופלים); עם זאת, בחולים שטופלו בעבר בפקטור 8 (יותר מ-150 ימי טיפול) תיתכן היווצרות של מעכבים באופן לא שכיח (פחות ממטופל 1 מתוך 100 מטופלים). במקרה כזה, התרופה עלולה להפסיק לפעול כראוי, ואתה עלול לחוות דימום ממושך. אם זה קורה, עליך לפנות לרופא מיד.

תופעות לוואי נוספות

תופעות לוואי שאינן שכיחות (uncommon) תופעות שמופיעות ב 1-10 משתמשים מתוך 1,000:

כאב ראש, סחרחורת, שינויים בטעם, קצב לב איטי, לחץ דם גבוה, גלי חום, כאב בכלי הדם לאחר ההזרקה, שיעול, כאב בבטן התחתונה, פריחה, פצעונים, תרומבוזיס הקשור לקטטר, נפיחות במפרקים, כאבי שרירים, כאב גב, כאבי מפרקים, תחושת אי נוחות כללית, כאב בחזה, תחושת חולי כללית ולחץ דם נמוך.

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה, או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צוינה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או ע"י כניסה לקישור: <https://sideeffects.health.gov.il>

5. **איר לאחסו את התרופה?**

- מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה החיצונית. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש. אין להשתמש בתרופה שאוחסנה בטמפרטורת החדר מעל 6 חודשים.

תנאי אחסון:

- יש לשמור בקירור, בין 2-8°C. אין להקפיא.
- יש לשמור באריזה המקורית על מנת להגן על התכשיר מפני חשיפה לאור.
ניתן לשמור את התרופה בטמפרטורת החדר (עד 30 מעלות צלזיוס) לתקופה בודדת עד 6 חודשים. כאשר התרופה מאוחסנת בטמפרטורת החדר, תוקף התרופה יהיה 6 חודשים מיום הוצאתה מהקירור או תאריך התפוגה המצוין על גבי האריזה, המוקדם מבניהם. חובה לציין על גבי האריזה את תאריך ההוצאה מהמקרר והאחסון בטמפרטורת החדר. לאחר שהתרופה אוחסנה בטמפרטורת החדר, אין להחזירה למקרר.
- יש להשתמש בתכשיר מיד לאחר הכנתו (המסת האבקה). אם לא ניתן להשתמש במיידית אז יש להשתמש בתכשיר עד 6 שעות בתנאי אחסון של עד 30°C. אין לשמור את התמיסה המוכנה במקרר. יש להגן על התמיסה המוכנה מחשיפה ישירה לאור השמש. לאחר 6 שעות יש להשמיד את התמיסה המוכנה אם לא נעשה בה שימוש. מבחינה מיקרוביאלית – יש להשתמש בתכשיר מייד לאחר המסתו.
- יש להשליך שאריות של תמיסה שלא נעשה בה שימוש. אין להשליך תרופות באמצעות שפכים או פסולת ביתית. שאל את הרוקח כיצד יש לזרוק תרופות שאינך משתמש בהן יותר. אמצעים אלה יסייעו בהגנה על הסביבה.

6. מידע נוסף

- נוסף על החומר הפעיל, התרופה מכילה גם:

Sucrose, Sodium chloride, Histidine, Calcium chloride dihydrate, Polysorbate 20, Sodium hydroxide (for pH adjustment), Hydrochloric acid (for pH adjustment)

ממס: Water for injections

אם אתה תחת דיאטה דלת נתרן, ראה סעיף 2 "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה".

• כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:

- **אלוקטה** מגיעה כערכה המורכבת מאבקה וממס להכנת תמיסה להזרקה. האבקה בצבע לבן עד בז' (off-white) הממס הינו תמיסה שקופה, חסרת צבע במזרק מוכן מראש. התמיסה המתקבלת לאחר המסה הינה שקופה עד מעט גוון חלבי וחסרת צבע. כל אריזה של **אלוקטה** מכילה בקבוקון עם אבקה ומזרק ממולא מראש עם ממס. כמו כן, היא מכילה מוט בוכנה, מתאם לבקבוקון, סט אינפוזיה, 2 ספוגיות אלכוהול, 2 פלסטרים ופד גזה. הפריטים הדרושים להמסה ולהזרקה מסופקים עם כל אריזת תכשיר.

- **בעל הרישום וכתובתו:** מגאפארם בע"מ, התדהר 15, רעננה, ישראל.

- **שם היצרן וכתובתו:** סווידיש אורפן ביוויטרם AB (SOBI), שטוקהולם, שוודיה.

- אושר בספטמבר 2022 ע"י משרד הבריאות


- מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:

אלוקטה 250 IU	170-48-36894-00
אלוקטה 500 IU	170-49-36895-00
אלוקטה 1000 IU	170-50-36896-00
אלוקטה 2000 IU	170-51-36898-00
אלוקטה 3000 IU	170-52-36899-00

- לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.

הוראות שימוש מפורטות להכנה והזרקה של אלוקטה

להלן הנחיות המתארות כיצד להכין ולהשתמש ב**אלוקטה**. אנא קרא הנחיות אלו במלואן לפני השימוש ב**אלוקטה**. **אלוקטה** ניתנת בהזרקה תוך ורידית לאחר המסתה עם הממס המגיע במזרק מוכן מראש. כל אריזה מכילה:











- 1 בקבוקון אבקה (A)
- 3 מ"ל ממס במזרק מוכן מראש (B)
- 1 מוט בוכנה (C)
- 1 מתאם לבקבוקון (D)
- 1 סט אינפוזיה (E)
- 2 ספוגיות אלכוהול (F)
- 2 פלסטרים (G)
- 1 פד גזה (H)





אין לערבב תרופה זו עם תמיסות אחרות להזרקה או לעירוי.

רחץ את ידיך לפני פתיחת האריזה.

הכנה:


1. בדוק את השם והחוזק שעל האריזה על מנת לוודא שהיא שמכילה את התרופה הנכונה. בדוק את תאריך התפוגה על אריזת הקרטון. אין להשתמש אם תאריך התפוגה המופיע על האריזה חלף.
2. אם אלוקטה אוחסנה במקרר, אפשר לבקבוקון של אלוקטה (A) ולמזרק עם הממס (B) להגיע לטמפרטורת החדר לפני השימוש. אין להשתמש במקור חום חיצוני.

<p>3. הנח את הבקבוקון על משטח ישר ונקי. הסר את פקק הפלסטיק מעל הבקבוקון (A).</p>	
<p>4. נגב את החלק העליון של הבקבוקון עם אחת מספוגיות האלכוהול (F) המסופקות עם האריזה, והנח לו להתייבש באוויר לפני השימוש. <u>אל</u> תיגע בחלק העליון של הבקבוקון ו<u>אל</u> תאפשר מגע של כל משטח או חפץ עם החלק העליון של הבקבוקון לאחר הניגוב.</p>	
<p>5. קלף את ציפוי הנייר ממתאם הבקבוקון (D). <u>אל</u> תיגע בחלק הפנימי של אריזת המתאם.</p>	
<p>6. הנח את הבקבוקון על משטח ישר. החזק את המתאם דרך אריזת הפלסטיק שלו, והנח אותו באופן אנכי (זווית ישרה) על החלק העליון של הבקבוקון. לחץ כלפי מטה בחוזקה עד שהמתאם ייכנס למקומו בנקישה על פתח הבקבוקון, כך שחוד (יתד) המתאם יחדור את פקק הבקבוקון.</p>	
<p>7. חבר את מוט הבוכנה (C) למזרק הממולא עם הממס על ידי הכנסת קצה מוט הבוכנה לתוך הפתח בבוכנה של המזרק. סובב את מוט הבוכנה בחוזקה עם כיוון השעון עד שהוא מחובר היטב למזרק.</p>	
<p>8. החזק את גוף המזרק, שבור את מכסה הפלסטיק הלבן בקצה של המזרק על ידי כיפוף המכסה עד שיינתק. הנח את המכסה בצד על ידי הנחתו עם החלק העליון כלפי מטה על משטח שטוח. <u>אל</u> תיגע בחלק הפנימי של המכסה או בקצה המזרק.</p>	
<p>9. הסר את האריזה מהמתאם והשלך לפח.</p>	
<p>10. חבר את מזרק הממס למתאם הבקבוקון על ידי הכנסת קצה המזרק לתוך פתח המתאם. דחף בחוזקה את המזרק וסובב עם כיוון השעון עד שהוא מחובר היטב.</p>	


<p>11. לחץ באיטיות על מוט הבוכנה כדי להזריק את כל הממס לבקבוקון האבקה.</p>	
<p>12. כשהמזרק עדיין מחובר למתאם ומוט הבוכנה לחוץ כלפי מטה, ערבב בעדינות את הבקבוקון עד אשר כל האבקה מתמוססת. אל תנער.</p>	
<p>13. לפני השימוש, בחן חזותית את התמיסה הסופית שהתקבלה. התמיסה צריכה להיראות צלולה עד מעט גוון חלבי וחסרת צבע. אין להשתמש בתמיסה אם היא עכורה או מכילה חלקיקים נראים לעין.</p>	
<p>14. ודא כי בוכנת המזרק עדיין לחוצה באופן מלא כלפי מטה, הפוך את הבקבוקון. משוך באיטיות את מוט הבוכנה כדי לשאוב בחזרה את כל התמיסה דרך מתאם הבקבוקון לתוך המזרק.</p>	
<p>15. נתק את המזרק ממתאם הבקבוקון על ידי משיכה וסיבוב בעדינות של הבקבוקון נגד כיוון השעון.</p>	
<p>הערה: אם אתה משתמש ביותר מבקבוקון אחד של אלוקטה לכל הזרקה, יש למהול כל בקבוקון בנפרד לפי ההוראות המתוארות מעלה (שלבים 1 עד 13). הסר את מזרק הממס, והשאר את מתאם הבקבוקון במקומו. ניתן להשתמש במזרק יחיד גדול luer lock כדי לשאוב חזרה את התמיסה המוכנה בכל אחד מהבקבוקונים הנפרדים.</p>	
<p>16. השלך את הבקבוקון ואת המתאם. הערה: אם אינך משתמש בתמיסה מיידית, יש להחזיר את מכסה המזרק בזהירות על קצה המזרק. אין לגעת בקצה המזרק או בחלק הפנימי של המכסה. לאחר ההכנה, ניתן לאחסן את אלוקטה בטמפרטורת החדר עד 6 שעות מוגן מאור שמש ישיר. לאחר 6 שעות, יש לזרוק את התמיסה המוכנה.</p>	

אופן מתן (זריקה למתן תוך ורידי):

יש להשתמש בערכת העירוי (E) המסופקת באריזה זו.

<p>1. פתח את אריזת ערכת העירוי והסר את המכסה בקצה הצינור. חבר את המזרק עם התמיסה המוכנה לקצה צינור ערכת העירוי על ידי סיבוב עם כיוון השעון.</p>	
---	---


2. במידת הצורך יש להניח חוסם עורקים ולהכין את מקום ההזרקה על ידי ניקוי העור עם ספוגית האלכוהול השנייה המצורפת בחבילה



3. הסר את האוויר בצינור ערכת העירוי על ידי לחיצה איטית על מוט הבוכנה עד שהנוזל יגיע למחט של ערכת העירוי. אין לדחוף את התמיסה דרך המחט. הסר את כיסוי הפלסטיק השקוף מהמחט.

4. הכנס את המחט של ערכת העירוי לווריד לפי הנחיות הרופא או האחיות והסר את חוסם העורקים. אם אתה מעדיף, אתה יכול להשתמש באחד מהפלסטרים (G) המסופקים באריזה כדי להחזיק את כנפי הפלסטיק של המחט במקומן באתר ההזרקה. הזרק את התמיסה המוכנה לווריד במשך מספר דקות. הרופא עשוי לשנות את קצב ההזרקה המומלץ לך בהתאם לרמת הנוחות שאתה חש.

5. לאחר הזרקת התכשיר אל תוך הוריד, והסרת המחט, קפל את מגן המחט והצמד אותו על המחט.



6. יש להשליך לתוך פסולת רפואי מתאים את - המחט המשומשת, כל תמיסה שאינה בשימוש, המזרק והבקבוקון הריק, מכיוון שאמצעים אלה עלולים לפגוע באחרים אם לא יושלכו כראוי.