

نشرة طبية للمستهلك بموجب أنظمة الصيدلية

(مستحضرات) 1986

يسوق هذا الدواء بحسب وصفة طبيب فقط

فوريكونازول تيفع جديد

أفراص مطلية

التركيبية

يحتوي كل قرص مطلي على:

فوريكونازول 200 ملغ

Voriconazole 200 mg

للحصول على معلومات عن المركبات غير الفعالة ومسببات الأراجية انظر البند 6 "معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء" والبند 6 "معلومات إضافية".

أقرأ النشرة باعتماد حتى نهايتها قبل استعمالك للدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات مخصصة عن الدواء. إذا تفرقت لديك أسئلة إضافية، فراجع الطبيب أو الصيدلي.

لقد وصف هذا الدواء من أجل علاجك. لا تعطه للأخرين. قد يضرهم الدواء حتى لو بدأ لك أن حالتهم الطبية مشابهة لحالتك.

1. لأي غرض مخصص هذا الدواء؟

فوريكونازول تيفع عبارة عن دواء مضاد للفطريات، واسع الطيف ومخصص لعلاج:

- داء الرشاشيات الغزوي (ثلوث تسببه فطريات من نوع الرشاشيات).
- تلوثات المبيضات (كانديدا) في الجهاز الدوري (وجود المبيضات في الدم لدى المرضى غير المصابين بقلعة العدلات).
- تلوثات المبيضات الغزوية المقاومة لفلوكونازول (دواء آخر مضاد للفطريات) بما في ذلك *C. Krusei*.
- التهلثات الفطرية الخطيرة التي تسببها فطريات من النوعين *Fusarium* و *Scedosporium*.

فوريكونازول تيفع مخصص للمرضى المصابين بثلوثات فطرية خطيرة، بل ربما تشكل خطراً على الحياة

فوريكونازول تيفع مخصص لمنع التلوثات الفطرية الغزوية لدى الأشخاص الذين خضعوا لزراعة النخاع العظمي والمعرضين لخطورة عالية.

الفصيلة العلاجية:

مضاد للفطريات من فصيلة التريازولات. يعمل عن طريق قتل أو إيقاف نمو الفطريات المختلفة التي تسبب التلوثات.

2. قبل استعمال الدواء

لا يجوز استعمال الدواء إذا:

- كانت لديك حساسية (أرجية) للمادة الفعالة أو لأي من المركبات الأخرى التي يحتوي عليها الدواء. الوارد تفصيلها في البند 6.
- لا يجوز استعمال هذا الدواء مع تيرفينادين (للأرجية)، أستيميزول (للأرجية)، سيبرادي (للمشاكل في المعدة)، بيموزيد (للمشاكل النفسية)، كينيدين (للمشاكل في نظم القلب)، إيفابريدن (لعلاج قصور القلب المزمن)، ريفابوتين (لعلاج السيل)، ريفامبين (لعلاج السل)، كاريمازيبين (لعلاج الاختلاجات)، فينوباربيتال (لعلاج الاختلاجات والأرق الشديد)، مشتقات الإبروتج (إيبروجتامين، ديبيريرو إيبروجتامين؛ لعلاج الصداع النصفي)، سيورليوموس (لدى المرضى الذين خضعوا لزراعة الأعضاء)، إيفيقيرين بجرعة دوائية مقدارها 400 ملغ فما فوق مرتين واحدة في اليوم (لعلاج HIV)، ريتونافير بجرعة دوائية مقدارها 400 ملغ فما فوق في كل مرة تغطي مرتين في اليوم (لعلاج HIV)، نبتة العرن (St. John's wort)، نالوكسجول (لعلاج الإسهال الخفيف الشديد عن استعمال مسكنات الألم من نوع الأفيونات (مثلا مورفين، أوكسيكودون، فينتانيل، ترامول، كوديين))، تولفانان (المستعمل لعلاج نقص الصوديوم في الدم (المسببات المنخفضة للصوديوم في الدم) أو يستعمل لإبطاء التندي في وظيفة الكلوتين لدى المرضى (لعلاج المصابين بداء الكلية المتعددة الكيسات)، لوراسيدون (لعلاج الاكتئاب)، فيينتولاكس (لعلاج متلقي العلاج المصابين ببيضاض الدم الليمفاوي المزمن-CLL).

قبل العلاج بفوريكونازول تيفع، أخبر الطبيب إذا:

- كنت تعاني الآن أو عانيت في الماضي من رد فعل تحسسي على مستحضرات من فصيلة التريازولات.
- كنت تعانين من مرض في عضلة القلب (اعتلال عضلة القلب)، نظم قلبي غير منظم أو بطيء، أو من شدود في مضطط كهربية القلب (أي كي جي) يسمى "متلازمة QTc الطويلة".
- كنت تعانين الآن أو عانيت في الماضي من مرض في الكبد. سيراقب الطبيب وظائف الكبد لديك عن طريق إجراء فحوص للدم.

تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال الدواء

- يجب الامتناع عن أي ضوء شمس وعن التعرض للشمس أثناء استعمال الدواء. من المهم تغطية مناطق الجلد المعرضة للشمس واستعمال كريم واقي ذي معامل وقاية (SPF) عالية، لأنه قد تزداد حساسية الجلد لإشعاع الشمس (UV). ينطبق على التحذير أيضا على الأولاد.
- أثناء استعمال الدواء، أخبر الطبيب بشكل فوري إذا تطور لديك: حمى شمسية، طفح جلدي شديد أو حويصلات في الجلد، الآم في العظم.
- إذا ظهر أحد هذه الأعراض الجدية، فقد يحيلك الطبيب إلى طبيب الجلد. هناك احتمالات لنطور سرطان الجلد عند استعمال الطويل الأمد لفوريكونازول تيفع.
- إذا تطورت لديك علامات على "قتل الغدة الشوكية"، وهي حالة خطيرة لا تقوم الغدتان الكظريةان فيها بإنتاج كميات كافية من هرمونات ستيرويدية معينة مثل كورتيزول، مما قد يسبب أعراضا مثل التعب المزمن أو المتواصل، ضعف العضلات، فقدان الشهية، نقصان الوزن، الآم البطن، فيرجى إخبار الطبيب.
- إذا تطورت لديك أعراض لـ"متلازمة كوشينج" التي ينتج الجسم فيها فقشاً من هرمون الكورتيزول الذي قد يؤدي إلى أعراض مثل: ارتفاع الوزن، تسريح دهني بين الكتفين، وجه مستدير، اغمقاق الجلد في البطن، الركبتين، التدين والذراعين، جلد رقيق، ميل إلى التكدم بسهولة، سكر مرتفع في الدم، فرط الشعر، فرط التعرق، فيرجى إخبار الطبيب.
- سيراقب الطبيب وظائف الكبد والكلتين عن طريق إجراء فحوص خلال مدة فترة العلاج بفوريكونازول تيفع.
- قبل البدء بالعلاج وحالته يجب إجراء مراقبة للأضرابات في مستويات الكهارل مثل المستويات المنخفضة للبوتاسيوم، المغنيزيوم والكالسيوم.

الأولاد والمراهقون

هذا الدواء غير مخصص لأولاد والأطفال الرضع الذين عمرهم أقل من عامين.

الفحوص والمتابعة

بما أن فوريكونازول تيفع يؤثر على الكبد والكلتين، سيراقب الطبيب وظيفة الكبد والكلتين عن طريق إجراء فحوص الدم. يرجى إخبار الطبيب إذا أحسست بالألم البطن أو إذا كان هناك تغيير في قوام برازك.

التفاعلات بين الأدوية

- إذا كنت تستعمل الآن، أو قد استعملت مؤخرا أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبيب وإضافات غذائية، فأخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك. خاصة إذا كنت تستعمل:
- أدوية يجب الامتناع قدر الإمكان عن استعمالها بالدمج مع فوريكونازول تيفع وهناك حاجة إلى ملائمة الجرعة الدوائية إذا تم إعطاؤها سوياً معاً:
- فينيتوين (لعلاج الصرع). إذا كنت تستعمل هذا الدواء فيجب مراقبة مستوى فينيتوين في الدم.
- ريتونافير (HIV علاج) بجرعة دوائية منخفضة مقدارها 100 ملغ مرتين في اليوم. لا يمكن تناول جرعات دوائية معينة من ريتونافير مع فوريكونازول تيفع. انظر "لا يجوز استعمال الدواء إذا" في هذا البند.
- جلامديبديج (لعلاج السرطان) - إذا كان عليك استعمال الدواء، سيراقب طبيبك نظم القلب في أحيان أكثر تفرأً.
- دمج فوريكونازول تيفع مع الأدوية التالية قد يتطلب ملائمة الجرعة الدوائية والمتابعة للتأكد من أن الأدوية و/أو فوريكونازول تيفع لا تزال ذات التأثير المرغوب به:
- إرفارفين ومضادات التحتر الأخرى (مثل فينيزوكومون، أسينوكومارول)
- سيكلوسبورين، تاكروليموس (للمرضى الذين خضعوا لزراعة الأعضاء)
- أدوية من نوع سولفنيل يوريا (مثل تولوتاميد، جليليزيد وجليبوريد) (العلاج السكري)

- ستاتينات (مثل أتورفاستاتين، سيمفاستاتين، لوفاستاتين) (لخفض مستويات الكوليسترول)
- بينيزوديان بيبينات (مثل ميدازولام، البرازولام وتريازولام) (لعلاج الأرق الشديد والتهلث)
- أوميبرازول (لعلاج قرحة المعدة)
- حبوب منع الحمل (قد تتشأ أعراض جانبية مثل الغثيان والاضطرابات في الدورة الشهرية)
- مشتقات فينكا (مثل فينكريستين، فينبلاستين) (لعلاج السرطان)
- مثبطات تيروزين كيناز (مثل: أكسيبتينيب، بوسوتينيب، كايوزانتينيب، سيريتينيب، كويمبينيبتيب، دابرافينيب، دازاتينيب، تيلوتينيب، سونيتينيب، إيروتينيب، ريبوسكيب) (لعلاج السرطان)
- تريتينوين (لعلاج بياض الدم)
- إيندينافير والمثبطات الأخرى للإنزيم HIV بروتياز (لعلاج HIV)

- أدوية من فصيلة NNRTI للعلاج HIV (مثل ديلافيردين، نيفيرابين، إيفابرينز) لا يمكن تناول جرعات دوائية معينة من إيفابرينز مع فوريكونازول تيفع. انظر "لا يجوز استعمال الدواء إذا" في هذا البند
- ميتادون (لعلاج الإدمان)
- الأفيونات القوية الأمد (مثل أفينانيل، فينتانيل، سوفنتانيل) (مسكنات للألم في الإجراءات الجراحية)
- أوكسيكودون وبيروكودون (لتسكين الآلام المتوسطة إلى الشديدة)
- أدوية مضادة للالتهاب لستيرودية (مثل إيبوبروفين وديكلوفيناك) (لعلاج الآلم والالتهاب)
- فلوكونازول (لعلاج التلوثات الفطرية)
- إيفرليوموس (لعلاج السرطان المتقدم في الكلية ومتلقي العلاج الذين خضعوا لزراعة الأعضاء)
- ليثيرموفير (لمنع مرض سببها الفيروس المضخم للخلايا (CMV) بعد زراعة النخاع العظمي)
- إيفاكافنور (لعلاج التليف الكيسي (CF))
- للحصول على قائمة الأدوية التي لا يجوز استعمالها بالتزامن مع فوريكونازول تيفع، انظر رجاء "لا يجوز استعمال الدواء إذا" في هذا البند.

الحمل والإرضاع

- لا يجوز استعمال الدواء إذا كنت حاملاً، إلا إذا تلتقيت تعليمات صريحة من الطبيب. يجب على النساء في سن الخصوبة أن يستعملن وسائل فعالة لمنع الحمل أثناء استعمال الدواء. إذا حلت أثناء استعمال فوريكونازول تيفع فرجاعي طبيبك فوراً.
- إذا كنت حاملاً أو مرضعاً، فتلقني كل حمل أو تخططين للحمل، فاستشيري الطبيب قبل استعمال الدواء.
- السياسة واستعمال الماكينات**
- قد يسبب فوريكونازول تيفع نشوفاً في الروية أو حساسية للضوء. إذا تأثرت من ذلك فلا جاز السباحة أو تشغيل الماكينة الخطرة. بالنسبة لأولاد فيجب تحذيرهم من ركوب الدراجة الهوائية أو اللعب بالقرب من الشارع وما شابه ذلك.
- معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء**
- يجب القرص على الكلتوز، وذلك إذا أخبرك الطبيب بأن لديك عدم تحمل لسكريات معينة، فراجع الطبيب قبل استعمال الدواء.
- يجب القرص على أقل من 1 من مليون (23 ملغ) من الصوديوم، أي أنه يُعتبر "خالياً من الصوديوم".

3. كيف تستعمل الدواء؟

- يجب استعمال الدواء دوماً بموجب تعليمات الطبيب.
- عليك استشارة الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكداً من الجرعة الدوائية ومن كيفية العلاج بالذواء.
- الجرعة الدوائية وكيفية العلاج سيجدهما الطبيب فقط. سيتم تحديد الجرعة الدوائية اعتماداً على وزنك ونوع التلوث لديك.
- اعتماداً على استجابته للعلاج، قد يرفع الطبيب أو يخفض الجرعة الدوائية اليومية.
- إذا كان لديك مرض في الكبد، فقد يقلل الطبيب جرعتك الدوائية.
- يمنع تجاوز الجرعة الموصى بها!**
- إذا كنت تستعمل أو كان ولدك يستعمل فوريكونازول تيفع لمنع التلوثات الفطرية، فقد يوقف طبيبك العلاج إذا نشأت لديك أو لدى ولدك أعراض جانبية مرافقة للعلاج.
- يجب إعطاء الأقرص فقط إذا كان الولد قادراً على بلع الأقرص.

يجب تناول القرص قبل وجبة الطعام بساعة أو بعدها بساعة على الأقل. يجب بلع القرص بأكمله مع القليل من الماء. عند عدم وجود خط للشرط - يمنع شطر القرص. لا تتوفر معلومات بالنسبة للهرس المضعف.

إذا تناولت خطأ جرعة دوائية أكبر من اللازم

إذا تناولت جرعة مفرطة أو إذا قام ولد ببلع الدواء خطأ، فتوجه فوراً إلى غرفة الطوارئ في المستشفى واتصل معك عبوة الدواء. قد تشعر بحساسية مزائدة للضوء نتيجة التلوث المفرط.

إذا نسيت تناول الدواء

من المهم تناول الدواء كل يوم في نفس الساعة. إذا نسيت تناول هذا الدواء في الوقت المحدد، فتناول الجرعة القادمة في الوقت الاعتيادي، لكن لا يجوز بأي حال من الأحوال تناول جرعة مضاعفة لتعويض عن الجرعة المنسية. يجب المواظبة على العلاج حسب توصية الطبيب. حتى لو طراً تحسن على حالتك الصحية، فلا يجوز إيقاف العلاج بالدواء دون استشارة الطبيب.

إذا توقفت عن استعمال الدواء

يجب الاستمرار في استعمال الدواء إلى أن يرشحك الطبيب إلى التوقف عن ذلك. إذا توقفت عن استعمال الدواء في وقت مبكر، فقد يستمر التلوث لديك أو قد يعاودك. قد يتطلب الأمر علاجاً طويل الأمد لمنع معاودة التلوث لدى متلقي العلاج ذوي الجهاز المناعي المضعف أو المصابين بثلوثات معينة.

لا يجوز تناول الأدوية في العمدة! راجع الملصق وتأكد من الجرعة في كل مرة تتناول فيها دواء. ضِع النظرات الطبية إذا كنت بحاجة إليها.

إذا تفرقت لديك أسئلة إضافية حول استعمال الدواء، فاستشر الطبيب أو الصيدلي.

4. الأعراض الجانبية

- مثل أي دواء، قد يؤدي استعمال فوريكونازول تيفع إلى نشوء أعراض جانبية عند بعض المستهلكين. لا تحدث عند قراءة قائمة الأعراض الجانبية. قد لا تعانين من أي واحد منها.**
- أعراض جانبية خطيرة - يجب التوقف عن استعمال الدواء والتوجه فوراً إلى الطبيب في الحالات التالية:**
- يرقان؛ تغير في نتائج فحص وظائف الكبد في فحص الدم
- التهاب في البنكرياس (بانكرياتيتيس)
- أعراض جانبية أخرى**
- أعراض جانبية شائعة إذا (قد تظهر لدى أكثر من شخص 1 من بين 10 أشخاص):
- حُمى في الروية (تغيرات في الروية، بما في ذلك: روية مؤشمة، تغيرات في الألوان، حساسية متزايدة للضوء، عصب الألوان، حُمى في العين، روية هالة ضوئية، عصب ليبي، اهتزازية في الروية، روية شرارات، روية أوردة، انخفاض في حدة الروية، إبهار ضوئي، تقلص مجال الروية، بقع/نقاط في مجال الروية)
- حُمى مرتفعة
- طفح جلدي
- غثيان، تقوي، إسهال
- صداع
- انتفاخ في الأطراف
- آلام البطن
- صعوبات في التنفس
- ارتفاع في أنزيمات الكبد
- أعراض جانبية شائعة (قد تظهر لدى شخص 1 كحدّ أقصى من بين 10 أشخاص):
- التهاب الجيوب الأنفية، التهاب في اللثة، تسرعيرة روية، ضعف مستوى مخفض، يشمل المستوى المنخفض بشكل خطير، لجزء من خلايا الدم الحمراء و/أو البيضاء (أحياناً مصحوب بالحمى)، مستوى منخفض للصفائح الدموية التي تساعد على تحتر الدم
- مستوى منخفض للسكر في الدم، مستوى منخفض للبوتاسيوم في الدم، مستوى منخفض للصوديوم في الدم
- قلق، تملل، اكتئاب، ارتباك، صعوبات في النوم، هلوسات، اختلاجات، ارتجاف أو حركات لا إرادية في العضلات، إحساس بالخز أو إحاسيس جلدية غير عادية، ارتفاع في التوتر العضلي، ميل إلى النوم، دوار
- نزيف دموي في العين
- مشاكل في نظم القلب بما في ذلك النبض السريع/البطيء جداً، أعضاء

- ضخظ دم منخفض، التهاب الأوردة (الالتهاب الوريدي)
- صعوبات شديدة في التنفس، ألم في الصدر، انتفاخ في الوجه (الغم، الشفتين وحول العينين)، احتباس السوائل في الرئتين (إمساك، صعوبات في الهضم، التهاب في الشفتين)
- يرقان، التهاب في الكبد (هيپاتيتيس) وتضرر الكبد
- طفوح جلدية قد تسبب تشوهاً خطيراً في الجلد وحويصلات جلدية تتميز بمطقة حمراء مسطحة في الجلد ومغطاة بنتوات صغيرة متصلة ببعضها، احمرار الجلد
- حكة
- تساقط الشعر
- آلم في الظهر
- قتل كلوي، دم في البول، تغيرات في فحوص وظيفة الكلتين
- أعراض جانبية غير شائعة (قد تظهر لدى شخص 1 كحدّ أقصى من بين 100 شخص):

- أعراض شبيهة بالإنفلونزا، تهيج والتهاب في الجهاز الهضمي، التهاب في الجهاز الهضمي يسبب الإسهال، التهاب الأوعية الليمفاوية
- التهاب في النسيج اللينق الموجود في الجدار الداخلي للبطن والذي يعطي التجوف البطني
- غدد ليفاوية متضخمة (أحياناً مؤلمة)، قتل النخاع العظمي، ارتفاع في مستوى البوزونيات في الدم
- انخفاض في وظيفة الكظرية، قصور الغدة الدرقية
- وظيفة غير سوية للدماع، أعراض شبيهة بالباركنسون، تضرر عصبى يسبب الخدر، الآلم، الوخز أو الإحساس بالاحتراق في الأطراف
- مشكلة في التوازن أو في التناسق الحركي
- انتفاخ في الماع

- روية مزوجة، حالات خطيرة في العين تشمل: ألمًا والتهابًا في العينين والأجفان، حركية غير عادية للعين، صرورا للعصب البصري يسبب اختراباً في الروية، انتفاخًا في القرص البصري
- انخفاض في الحساسية للمس
- تغير في حسنة التوق
- اضطرابات في السمع، طنين في الأذنين، فير تيجو (شعور بالذوق)
- التهابات في أعضاء داخلية معينة - البنكرياس والأمعاء، انتفاخ والتهاب في اللسان
- تضخم الكبد، قتل كلبي، حصى أو مرض في حويصلة المرارة
- التهاب المفاصل، التهاب الأوردة المصحوب بتكون خثرة دموية (خثر)
- التهاب في الكلية، بروتين في البول، ضرر للكلية
- نظم قلبي سريع جدًا أو إنقاص دقات - مصحوب أحياناً بتدغعات كهربائية غير ثابتة

- تغيرات في مخطط كهربية القلب
- ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم، ارتفاع في مستوى البورفيريا في الدم
- ردود فعل تحسسية في الجلد (خطيرة أحياناً) بما في ذلك الحالات الجلدية التي تشكل خطراً على الحياة وتسبب ظهور حويصلات مؤلمة، جروح/ثآليل في الجلد والأغشية المخاطية، خاصة في الفم، التهاب الجلد، شرى، حروق شمسية أو ردود فعل جلدية خطيرة نتيجة التعرض للضوء أو للشمس، جد محمض ومتهيج، بقع حمراء أو بنفسجية في الجلد في أعقاب انخفاض تعداد الصفائح الدموية، إيكزيما
- رد فعل تحسسية أو رد فعل شاذ للجهاز المناعي
- أعراض جانبية نادرة (قد تظهر لدى شخص 1 كحدّ أقصى من بين 1,000 شخص):
- فرط نشاط الغدة الدرقية
- تدهور الوظيفة الدماغية (من المضاعفات الخطيرة لمرض في الكبد)
- أضرار شديد للعصب البصري، تكمر في القرنية، حركات لا إرادية للعينين
- ظهور حويصلات نتيجة للحساسية/التعرض للضوء
- اضطراب بيهاج في الجهاز المناعي في الجسم جزءاً من الجهاز العصبي المحيطي
- مشاكل في نظم أو موصلية القلب (أحياناً تشكل خطراً على الحياة)
- رد فعل تحسسي يشكل خطراً على الحياة
- اضطراب في نظام التنخر في الدم
- ردود فعل تحسسية في الجلد (خطيرة أحياناً) بما في ذلك الانتفاخ السريع (وذمة) في الجلد، بقع مثيرة للحكة أو مؤلمة من الجلد المسمى الحمص مع القشرة، حكة في الجلد والأغشية المخاطية - جلدية جلدية تشكل خطراً على الحياة وتسبب انفصال أجزاء واسعة من الأدمة (طبقة الجلد الخارجية) عن طبقات الجلد السفلية
- بقع جلدية صغيرة، جافة وحرشفية، أحياناً متغلطفة مع "قرون"
- أعراض جانبية مدى شيوها غير معروف (أعراض لا يتم تحديد مدى شيوها بعد):
- تمشل وبقع تصبغ

- أعراض جانبية مدى شيوها غير معروف (أعراض لا يتم تحديد مدى شيوها بعد)، لكنها مهمة ويجب التبليغ عنها للطبيب المعالج بشكل فوري:
- سرطان الجلد
- التهاب السنج المحيط بالمعظم
- مناطق حمراء ومتقشرة في الجلد أو كدمات في الجلد شكلها شبه بالطفة وقد تكون عرضاً لمرض مناعي ذاتي يسمى الذئبة الحمامية الجلدية
- تتواجد تلميحات عن تطور سرطان الجلد لدى متلقي العلاج الذين استعملوا فوريكونازول لفترة طويلة.
- شوه دوار شمسي أو رد فعل جلدي خطير، نتيجةً للتعرض للضوء أو الشمس، بشووع أكبر لدى الأولاد. إذا نشأت لديك/لدى ولدك اضطرابات في الجلد، فقد يحيلك طبيبك المعالج إلى طبيب الجلد، والذي سيقترح بعد المشورة ما إذا كان من المهم أن تحضرن/يحضرن ولدك للتلماعية على أساس دائم. شوه أيضاً ارتفاع في إنزيمات الكبد بشووع أكبر لدى الأولاد.
- إذا ظهر عرض جانبي، إذا تعلق أحد الأعراض الجانبية، أو إذا كنت تعانين من عرض جانبي لم يذكر في النشرة، فعليك استشارة الطبيب.

التبليغ عن الأعراض الجانبية بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغف على الرابط "التبليغ عن أعراض جانبية عب العلاج الدوائي" الموجود في الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.au)، والذي يوجه إلى الاستشارة المتصلة بالتبليغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق الدخول إلى الرابط: https://sideeffects.health.gov.au

5. كيف يجب تخزين الدواء؟

- امنح التستم هذا الدواء، وأي دواء آخر، في حفظه في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي الأطفال والابو الأطفال الرضع وعن مجال رؤيتهم، وبذلك تستمع التسلام. لا تسبب التلف بدون تعليمات صريحة من الطبيب.
- لا يجوز استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (exp. date) المدون على العبوة. يشير تاريخ انتهاء الصلاحية إلى اليوم الأخير من ذلك الشهر.
- يجب التخزين في درجة حرارة دون 25°C.

6. معلومات إضافية

يحتوي الدواء بالإضافة إلى المادة الفعالة أيضاً على:

Lactose monohydrate, pregelatinized maize starch, croscarmellose sodium, povidone, magnesium stearate, hypromellose, titanium dioxide, glycerol

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العبوة:

قرص مطلي، أبيض، مطوّل، على أحد جانبيه مطبوع "V" وعلى الجانب الآخر "200"

يسوق الدواء في عبوة بلاستز (شرائط حويصلات) تحتوي على 28، 14، 30 قرصاً مطلياً.

اسم لصاحب الامتياز والمصنع وعنوانه:

تيفع إسرائيل رض. شارع دقوره هالينغيتيه 124، تل أبيب 6944020

تمّ تحرير النشرة في كانون الأوّل/ديسمبر 2021 وفقاً لإرشادات وزارة الصحة.

رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الرسمي في وزارة الصحة: 168-66-36179-00

من أجل التبسيط والتسهيل للقراء، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكّر. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.

VORICONAZOLE TABS PIL MW12121

teva