עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים)
התשמ"ו - 1986

התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד

ווריקונאזול טבע חדש

טבליות מצופות
הרכב
כל טבליה מצופה מכילה:
ווריקונאזול 200 מ"ג
Voriconazole 200 mg

למידע על מרכיבים בלתי פעילים ואלרגניים ראה סעיף 2 "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה" וסעיף 6 "מידע נוסף".

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.
תרופה זו נרשמה לטיפול עבורך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם גם אם נראה לך כי מצבם הרפואי דומה לשלך.

1. למה מיועדת התרופה?

וריקונאזול טבע הינה תרופה אנטי פטריתית רחבת טווח המיועדת לטיפול ב:
- אספרגילוזיס פולשני (זיהום הנגרם על ידי פטריות מהסוג אספרגילוס).
- זיהומים של קנדידה במערכת הדם (קנדידמיה) בחולים שאינם נויטרופניים.
- זיהומים פולשניים של קנדידה שעמידים לפלוקונאזול (תרופה אנטי פטריתית אחרת) כולל C. Krusei.
- זיהומים פטרייתיים חמורים הנגרמים על ידי פטריות מסוגים Scedosporium ו-Fusarium.

וריקונאזול טבע מיועדת לחולים עם זיהומים פטרייתיים חמורים, אולי אף מסכני חיים.
וריקונאזול טבע מיועדת למניעת זיהומים פטרייתיים פולשניים אצל מושתלי מח עצם הנמצאים בסיכון גבוה.
קבוצה תרפויטית:
אנטי פטרייתי מקבוצת הטריאזולים. פועל באמצעות הריגת או עצירת הצמיחה של פטריות שונות הגורמות לזיהומים.

2. לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה אם:

- אתה רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה, המפורטים בסעיף 6.
- אין ליטול תרופה זו עם טרפנדין (לאלרגיה), אסטמיזול (לאלרגיה), ציספריד (לבעיות בקיבה), פימוזיד (לבעיות נפשיות), כינידין (לבעיות בקצב הלב), איבברדין (לטיפול באי ספיקת לב כרונית), ריפאבוטין (לטיפול בשחפת), ריפמפיצין (לטיפול בשחפת), קרבמזפין (לטיפול בפרכוסים), פנוברביטל (לטיפול בפרכוסים ובנדודי שינה חמורים), נגזרות של ארגוט (ארגוטמין, דיהידרואראגוטמין; לטיפול במיגרנות), סירולימוס (בחולים שעברו השתלה), אפאיורנז במינון של 400 מ"ג ויותר הניתן פעם ביום (לטיפול ב-HIV), ריטונאביר במינון של 400 מ"ג ויותר בכל פעם הניתן פעמיים ביום (לטיפול ב-HIV), צמח ההיפריקום (St. John's Wort), נאלוקסגול (לטיפול בעצירות הנגרמת בעיקר משימוש במשככי כאבים מסוג אופיואידים (למשל מורפין, אוקסיקודון, פנטניל, טרמדול, קודאין)), טולבפטן (המשמש לטיפול בהיפונתרמיה (רמות נמוכות של נתרן בדם) או משמש להאטת הירידה בתפקוד הכליות במטופלים עם מחלת כליות פוליציסטית), לורסידון (לטיפול בדיכאון), ונטוקלקס (לטיפול במטופלים עם לוקמיה לימפוציטית כרונית-CLL).

לפני הטיפול בוריקונאזול טבע, ספר לרופא אם:
- הינך סובל או סבלת בעבר מתגובה אלרגית לתכשירים מקבוצת האזולים.
- הינך סובל ממחלה של שריר הלב (קרדיומיופתיה), קצב לב לא סדיר או איטי או חריגה באלקטרוקרדיוגרם (אקג"ג) המכונה 'תסמונת QTc מואר'.
- הינך סובל או סבלת בעבר ממחלת כבד. הרופא ינטר את תפקודי הכבד שלך על ידי ביצוע בדיקות דם.

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה
- יש להימנע מכל אור שמש וחשיפה לשמש בזמן השימוש בתרופה. חשוב לכסות אזורי עור חשופים לשמש ולהשתמש בקרם הגנה עם מקדם הגנה (SPF) גבוה, מכיוון שעלולה להיות עלייה ברגישות העור לקרינת השמש (UV). אזהרה זו מתייחסת גם לילדים.
- בזמן השימוש בתרופה, ספר לרופא באופן מיידי אם אתה מפתח: כוויית שמש, פריחה חמורה או שלפוחיות בעור, כאבים בעצמות.
- אם הופיעה אחת מהתופעות העוריות הללו, הרופא עשוי להפנות אותך לרופא עור. ישנו סיכוי קטן להתפתחות סרטן העור בשימוש ארוך טווח בווריקונאזול טבע.
- אם אתה מפתח סימנים של 'כשל יותרת הכליה', מצב רפואי בו בלוטות יותרת הכליה אינן מייצרות כמויות מספיקות של הורמונים סטרואידיים מסוימים כגון קורטיזול, העלול לגרום לתסמינים כגון עייפות כרונית ואי מתמשכת, חולשת שרירים, אובדן תיאבון, ירידה במשקל, כאבי בטן, אנא ספר לרופא.
- אם אתה מפתח תסמינים של "תסמונת קושינג" בה הגוף מייצר עודף של הורמון קורטיזול אשר עלול להוביל לתסמינים כגון: עליה במשקל, רקמה שומנית בין הכתפיים, פנים מעוגלות, התכהות העור בבטן, בברכיים, בשדיים ובזרועות, עור דק, נטייה לחבורות בקלות, סוכר גבוה בדם, שיעור יתר, הזעת יתר, אנא ספר לרופא.
- הרופא ינטר את תפקודי הכבד והכליות על ידי ביצוע בדיקות דם במהלך הטיפול בוריקונאזול טבע.
- לפני התחלת הטיפול ובמהלכו יש לבצע ניטור להפרעות ברמות אלקטרוליטים כגון רמות נמוכות של אשלגן, מגנזיום וסידן.

ילדים ומתבגרים
תרופה זו אינה מיועדת לילדים ולתינוקות מתחת לגיל שנתיים.

בדיקות ומעקב
מכיוון שוריקונאזול טבע משפיעה על הכבד והכליות, הרופא ינטר את תפקוד הכבד והכליות על ידי ביצוע בדיקות דם. אנא ספר לרופא אם אתה חש בכאבי בטן או אם יש שינוי במרקם הצואה שלך.

תגובות בין תרופתיות
אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח. במיוחד אם אתה לוקח:
תרופות שיש להימנע מלקחת בשילוב עם ווריקונאזול טבע במידת האפשר ונדרשת התאמת מינון אם ניתנות יחד:
- פניטואין (לטיפול באפילפסיה). אם הינך נוטל תרופה זו יש לנטר את רמת הפניטואין בדם.
- ריטונאביר (לטיפול ב-HIV) במינון נמוך של 100 מ"ג פעמיים ביום. לא ניתן ליטול מינונים מסוימים של ריטונאביר עם וריקונאזול טבע. ראה "אין להשתמש בתרופה אם" בסעיף זה.
- גלסדגיב (לטיפול בסרטן) – אם הינך נדרש להשתמש בשתי התרופות, הרופא שלך יינטר את קצב הלב לעיתים קרובות יותר.

שילוב של וריקונאזול טבע עם התרופות הבאות, ייתכן שידרוש התאמת מינון ומעקב כדי לוודא שהתרופות ו/או וריקונאזול טבע עדיין בעלות האפקט הרצוי:
- וארפרין ונוגדי קרישה אחרים (כגון פנפרוקומון, אסנוקומרול)
- ציקלוספורין, טקרולימוס (למטופלים שעברו השתלה)
- תרופות מסוג סולפונילאוריאה (כגון טולבוטמיד, גליפיזיד וגליבוריד) (לטיפול בסוכרת)
- סטטינים (כגון אטורבסטטין, סימבסטטין, לובסטטין) (להורדת רמות כולסטרול)
- בנזודיאזפינים (כגון מידזולאם, אלפרזולאם וטריאזולאם) (לטיפול בנדודי שינה חמורים ולהרגעה)
- אומפרזול (לטיפול בכיב קיבה)
- גלולות למניעת היריון (ייתכנו תופעות לוואי כגון בחילה והפרעות במחזור החודשי)
- נגזרות וינקה (כגון וינקריסטין, וינבלסטין) (לטיפול בסרטן)
- מעכבי טירוזין קינאז (כגון: אקסיטיניב, בוסוטיניב, קבוזנטיניב, סריטיניב, קובימטיניב, דברפניב, דזטיניב, נילוטיניב, סוניטיניב, איברוטיניב, ריבוציקליב) (לטיפול בסרטן)
- טרטינואין (לטיפול בלוקמיה)
- אינדינאביר ומעכבי האנזים HIV פרוטאז אחרים (לטיפול ב-HIV)
- תרופות ממשפחת NNRTI לטיפול ב-HIV (כגון דלאווירדין, נוויראפין, אפאיורנז) (מינונים מסוימים של אפאיורנז לא ניתן ליטול עם וריקונאזול טבע, ראה "אין להשתמש בתרופה אם" בסעיף זה)
- מתדון (לטיפול בהתמכרות)
- אופיאטים קצרי טווח (כגון אלפנטניל, פנטניל, סופנטניל) (משככי כאבים בהליכים כירורגיים)
- אוקסיקודון והידרוקודון (לשיכוך כאבים בינוניים עד חזקים)
- תרופות נוגדות דלקת שאינן סטרואידים (כגון איבופרופן ודיקלופנק) (לטיפול בכאב ובדלקת)
- פלוקונאזול (לטיפול בזיהומים פטרייתיים)
- אוורולימוס (לטיפול בסרטן מתקדם בכליה ובמטופלים שעברו השתלה)
- לטרמוביר (למניעה של מחלה הנגרמת על ידי ציטומגלו-וירוס (CMV) לאחר השתלת מח עצם)
- איבקפטור (לטיפול בסיסטיק פיברוזיס (CF))

לרשימת תרופות שאין ליטול בו זמנית עם וריקונאזול טבע, אנא ראה "אין להשתמש בתרופה אם" בסעיף זה.

היריון והנקה
אין להשתמש בתרופה אם הינך בהיריון, אלא אם קיבלת הוראה מפורשת מהרופא. נשים בגיל הפוריות צריכות להשתמש באמצעי מניעה יעילים בזמן השימוש בתרופה. אם נכנסת להיריון בזמן נטילת וריקונאזול טבע פני לרופא שלך מייד.
אם הינך בהיריון או מניקה, חושבת שאת בהיריון או מתכננת היריון, התייעצי עם הרופא לפני נטילת התרופה.

נהיגה ושימוש במכונות
וריקונאזול טבע עלולה לגרום לטשטוש בראייה או לרגישות לאור. אם אתה מושפע מכך אין לנהוג או להפעיל מכונות מסוכנות. באשר לילדים, יש להזהירם מרכיבה על אופניים או ממשחקים בקרבת הכביש וכדומה.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה
- הטבליה מכילה לקטוז ולכן אם נאמר לך על ידי הרופא שיש לך אי-סבילות לסוכרים מסוימים, פנה לרופא לפני נטילת התרופה.
- הטבליה מכילה פחות מ-1 מילימול (23 מ"ג) נתרן, כלומר נחשבת "נטולת נתרן".

3. כיצד תשתמש בתרופה?

יש להשתמש בתרופה תמיד בהתאם להוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ולאופן הטיפול בתרופה.
המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד. המינון יקבע כתלות במשקלך ובסוג הזיהום שלך.
כתלות בתגובתך לטיפול, הרופא עשוי להעלות או להוריד את המינון היומי.
אם יש לך מחלת כבד, הרופא עשוי להפחית את המינון שלך.

אין לעבור על המנה המומלצת!
אם אתה או ילדך נוטלים וריקונאזול טבע למניעת זיהומים פטרייתיים, ייתכן כי הרופא שלך יפסיק את הטיפול אם אתה או ילדך מפתחים תופעות לוואי נלוות לטיפול.
- יש לתת טבליות רק אם הילד מסוגל לבלוע טבליות.

יש ליטול את הטבליה לפחות שעה לפני או שעה אחרי הארוחה. יש לבלוע את הטבליה בשלמותה עם מעט מים.
בהעדר קו חציה – אסור לחצות את הטבליה. אין מידע לגבי כתישה/לעיסה.

אם נטלת בטעות מינון גבוה יותר
אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מייד לחדר מיון של בית חולים והבא את אריזת התרופה איתך. ייתכן שתחוש רגישות מוגברת לאור כתוצאה מנטילת יתר.

אם שכחת ליטול את התרופה
חשוב ליטול את התרופה בכל יום בשעה קבועה.
אם שכחת ליטול תרופה זו בזמן המיועד, קח את המנה הבאה בזמן הרגיל, אך בשום אופן אין ליטול מנה כפולה כדי לפצות על המנה שנשכחה.
יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא.
גם אם חל שיפור במצב בריאותך אין להפסיק את הטיפול בתרופה ללא התייעצות עם רופא.

אם אתה מפסיק את נטילת התרופה
יש להמשיך לקחת את התרופה עד שהרופא ינחה אותך להפסיק. אם אתה מפסיק את נטילת התרופה מוקדם, הזיהום שלך עלול להימשך או לחזור. במטופלים עם מערכת חיסון מוחלשת או עם זיהומים קשים ייתכן שיידרש טיפול ארוך טווח כדי למנוע את חזרת הזיהום.
אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה <u>בכל פעם</u> שהינך נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הינך זקוק להם.
אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בוריקונאזול טבע עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. ייתכן שלא תסבול מאף אחת מהן.
תופעות לוואי חמורות – יש להפסיק את השימוש בתרופה ולפנות מייד לרופא במקרים הבאים:
- פריחה
- צהבת; שינוי בתוצאות בדיקת תפקודי כבד בבדיקת דם
- דלקת בלבלב (פנקריאטיטיס)

תופעות לוואי נוספות
תופעות לוואי שכיחות מאוד (עשויות להופיע ביותר מ-1 מתוך 10 אנשים):
- ליקוי בראייה (שינויים בראייה, כולל: ראייה מטושטשת, שינויים בצבעים, רגישות מוגברת לאור, עיוורון צבעים, ליקוי בעין, ראיית הילה, עיוורון לילה, תנודתיות בראייה, ראיית ניצוצות, ראיית אאורה, ירידה בחדות הראייה, סנוור, צמצום שדה הראייה, כתמים/נקודות בשדה הראייה)
- חום גבוה
- פריחה
- בחילה, הקאה, שלשול
- כאב ראש
- נפיחות בגפיים
- כאבי בטן
- קשיי נשימה
- עלייה באנזימי כבד

תופעות לוואי שכיחות (עשויות להופיע ב – עד 1 מתוך 10 אנשים):
- סינוסיטיס, דלקת בחניכיים, צמרמורת, חולשה
- רמה נמוכה, כולל נמוכה באופן חמור, של חלק מתאי הדם האדומים ו/או הלבנים (לעיתים מלווה בחום), רמה נמוכה של טסיות העוזרות בקרישת הדם
- רמה נמוכה של סוכר בדם, רמה נמוכה של אשלגן בדם, רמה נמוכה של נתרן בדם
- חרדה, חוסר מנוחה, דיכאון, בלבול, קשיי שינה, הזיות
- פרכוסים, רעד או תנועות שרירים לא רצוניות, תחושת עקצוץ או תחושות עוריות לא רגילות, עלייה בטונוס (מתח) שרירים, ישנוניות, סחרחורת
- דימום בעין
- בעיות בקצב הלב כולל דופק מהיר/איטי מאוד, עילפון
- לחץ דם נמוך, דלקת ורידים (פלביטיס)
- קשיי נשימה חמורים, כאב בחזה, נפיחות בפנים (פה, שפתיים ומסביב לעיניים), אצירת נוזלים בריאות
- עצירות, קשיי עיכול, דלקת בשפתיים
- צהבת, דלקת בכבד (הפטיטיס) ופגיעה בכבד
- פריחות בעור העלולות לגרום לקילוף חמור ולשלפוחיות בעור המתאפיינות באזור אדום ושטוח בעור המכוסה בבליטות קטנות מחוברות, אדמומיות בעור
- גירוד
- נשירת שיער
- כאב גב
- כשל כלייתי, דם בשתן, שינויים בבדיקות תפקוד הכליות

תופעות לוואי שאינן שכיחות (עשויות להופיע ב – עד 1 מתוך 100 אנשים):
- תסמינים דמויי שפעת, גירוי ודלקת במערכת העיכול, דלקת במערכת העיכול הגורמת לשלשול, דלקת של כלי הלימפה
- דלקת ברקמה הדקה הנמצאת בדופן הפנימית של הבטן ומכסה את חלל הבטן
- בלוטות לימפה מוגדלות (לעיתים כואבות), כשל מח העצם, עלייה ברמת האאוזינופילים בדם
- ירידה בתפקוד בלוטת יותרת-הכליה, תת פעילות של בלוטת התריס
- תפקוד מוחי לא תקין, תסמינים דמויי פרקינסון, פגיעה עצבית הגורמת לחוסר תחושה, כאב, עקצוץ או תחושת בעירה בגפיים
- בעיה בשיווי משקל או בקואורדיניצה
- נפיחות במוח
- ראייה כפולה, מצבים חמורים בעין הכוללים: כאב ודלקת בעיניים ובעפעפיים, תנועתיות לא רגילה של העין, נזק לעצב הראייה הגורם להפרעה בראייה, נפיחות בדיסק האופטי
- ירידה ברגישות למגע
- שינוי בחוש הטעם
- הפרעות בשמיעה, צלצולים באוזניים, ורטיגו (תחושת סחרור)
- דלקות באיברים פנימיים מסוימים – לבלב ומעי, נפיחות ודלקת בלשון
- הגדלת הכבד, כשל כבדי, אבנים או מחלה בכיס המרה
- דלקת מפרקים, דלקת ורידים המלווה ביצירת קריש דם (פקקת)
- דלקת בכליה, חלבון בשתן, נזק לכליה
- קצב לב מאוד מהיר או החסרת פעימות – לעיתים מלווה באימפולסים חשמליים לא קבועים
- שינויים באלקטרוקרדיוגרם (אק"ג)
- עלייה ברמת הכולסטרול בדם, עלייה ברמת האוריאה בדם
- תגובות אלרגיות בעור (לעיתים חמורות) כולל מצבים מסכני חיים בעור הגורמים להופעת שלפוחיות כואבות, פצעים/יבלות בעור ובממברנות ריריות, במיוחד בפה, דלקת בעור, חרלת, כוויות שמש או תגובות עוריות חמורות כתוצאה מחשיפה לאור או לשמש, עור אדמומי ומגורה, כתמים אדומים או סגולים בעור עקב ירידה בספירת טסיות הדם, אקזמה
- תגובה אלרגית או תגובה חריגה של מערכת החיסון

תופעות לוואי נדירות (עשויות להופיע ב – עד 1 מתוך 1,000 אנשים):
- פעילות יתר של בלוטת התריס
- הדרדרות בתפקוד המוחי (סיבוך חמור של מחלת כבד)
- נזק חמור לעצב הראייה, עכירות בקרנית, תנועות עיניים לא רצוניות
- הופעת שלפוחיות כתוצאה מרגישות/חשיפה לאור
- הפרעה שבה מערכת החיסון של הגוף תוקפת חלק ממערכת העצבים ההיקפית
- בעיות בקצב או בהולכה של הלב (לעיתים מסכנות חיים)
- תגובה אלרגית מסכנת חיים
- הפרעה במערכת הקרישה בדם
- תגובות אלרגיות בעור (לעיתים חמורות) כולל התנפחות מהירה (בצקת) בעור, כתמים מגרדים או כואבים של עור עבה, אדמומי עם קשקשים, גרד בעור ובממברנות ריריות – מצב עורי מסכן חיים אשר גורם לחלקים נרחבים של האפידרמיס (השכבה החיצונית של העור) להיפרד משכבות העור התחתונות
- כתמי עור קטנים, יבשים וקשקשיים, לעיתים מעובים עם "קרניים"

תופעות לוואי ששכיחותן אינה ידועה (תופעות ששכיחותן טרם נקבעה):
- נמשים וכתמי פיגמנטציה

תופעות לוואי ששכיחותן אינה ידועה (תופעות ששכיחותן טרם נקבעה), אך הינן משמעותיות ויש לדווח עליהן לרופא המטפל באופן מיידי:
- סרטן העור
- דלקת של הרקמה המקיפה את העצם
- אזורים אדומים ומתקלפים בעור או חבורות בעור בצורה דמוית טבעת העלולים להיות סימפטום למחלה אוטואימונית הנקראת זאבת אדמנתית עורית

קיימים דיווחים על התפתחות סרטן העור במטופלים אשר נטלו וריקונאזול למשך תקופה ארוכה.
כוויית שמש או תגובה עורית חמורה, כתוצאה מחשיפה לאור או לשמש, נצפתה בשכיחות גבוהה יותר אצל ילדים. אם אתה/ילדך מפתח הפרעות בעור, ייתכן שתופנה על ידי הרופא המטפל שלך לרופא עור, אשר לאחר ייעוץ יחליט האם חשוב שאתה/ילדך תגיעו למעקב על בסיס קבוע. עלייה באנזימי כבד גם כן נצפתה בשכיחות גבוהה יותר אצל ילדים.
אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה, או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צוינה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.
דיווח על תופעות לוואי
ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או על-ידי כניסה לקישור:
https://sideeffects.health.gov.il

5. איך לאחסן את התרופה?

- מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.
- **יש לאחסן מתחת ל-25°C.**

6. מידע נוסף

נוסף על החומר הפעיל התרופה מכילה גם:
Lactose monohydrate, pregelatinised maize starch, croscarmellose sodium, povidone, magnesium stearate, hypromellose, titanium dioxide, glycerol
כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:
טבליה מצופה, לבנה, מוארכת, בצידה האחד מוטבע "V" ובצדה השני "200".
התרופה משווקת באריזת בליסטר המכילה 14, 28 או 30 טבליות מצופות.
ייתכן שלא כל גדלי האריזות משווקים.
שם בעל הרישום והיצרן וכתובתו:
טבע ישראל בע"מ
רח' דבורה הנביאה 124, תל אביב 6944020
העלון נערך בדצמבר 2021 בהתאם להנחיות משרד הבריאות.
מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות: 00-36179-68-168
לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.

VORICONAZOLE TABS PIL MW1221

teva