

חברת פאדאגיס ישראל סוכנויות בע"מ מבקשת ליידע אתכם על עדכון עלוני התכשיר:

MOVIPREP® מוביפרפ®**Powder for solution**חומרים פעילים:שקיק 1 מכיל:

Macrogol 3350	100 gram גרם	(ידוע גם בשם פוליאיתילן גליקול 3350)
Sodium sulfate anhydrous	7.5 gram גרם	נתרן סולפאט אנהידרוס
Sodium Chloride	2.691 gram גרם	נתרן כלוריד
Potassium Chloride	1.015 gram גרם	אשלגן כלוריד

שקיק 2 מכיל:

Ascorbic Acid	4.7 gram גרם	חומצה אסקורבית
Sodium Ascorbat	5.9 gram גרם	נתרן אסקורבט

התוויה: For bowel cleansing prior to any clinical procedures requiring a clean bowel e.g. bowel endoscopy or radiology.

בהודעה זו מוצגים עדכונים מהותיים בלבד.

עלון לצרכן**מתי ליטול?**

הקפד תמיד ליטול את התרופה הזאת בדיוק כפי שמוסבר בעלון הזה או כפי שהרופא אמר לך. שאל את הרופא שלך אם אינך בטוח. עליך לסיים את הטיפול במוביפרפ לפני הבדיקה שלך.

הטיפול יכול להינתן בחלוקה לשתי מנות או כולו במנה אחת, **בהתאם לאופן בו מתבצעת הבדיקה (עם או ללא הרדמה כללית)**, כמתואר להלן:

כאשר הבדיקה מתבצעת תחת הרדמה כללית:

1. **בחלוקה לשתי מנות:** יש לשתות ליטר אחד של מוביפרפ בערב לפני ההליך הקליני הבדיקה וליטר אחד של מוביפרפ מוקדם בבוקר היום שבו יתבצע ההליך הקליני מתבצעת הבדיקה. **חשוב לסיים לשתות את כל כמות המוביפרפ (2 ליטרים) ונוזלים צלולים אחרים (ראה פירוט הנוזלים תחת "חשוב") לפחות שעתיים לפני תחילת הבדיקה.**

2. **במנה אחת:** יש לשתות שני ליטרים של מוביפרפ בערב לפני ההליך הקליני הבדיקה, או שני ליטרים של מוביפרפ בבוקר היום שבו יתבצע ההליך הקליני מתבצעת הבדיקה. **חשוב לסיים לשתות את כל כמות המוביפרפ (2 ליטרים) ונוזלים צלולים אחרים (ראה פירוט הנוזלים תחת "חשוב") לפחות שעתיים לפני תחילת הבדיקה.**

כאשר הבדיקה מתבצעת ללא הרדמה כללית:

1. בחלוקה לשתי מנות: יש לשתות ליטר אחד של מוביפרפ בערב לפני הבדיקה וליטר אחד של מוביפרפ מוקדם בבוקר היום שבו מתבצעת הבדיקה.
חשוב לסיים לשתות את כל כמות המוביפרפ (2 ליטרים) ונוזלים צלולים אחרים (ראה פירוט הנוזלים תחת "חשוב") לפחות שעה אחת לפני תחילת הבדיקה.
2. במנה אחת: יש לשתות שני ליטרים של מוביפרפ בערב לפני הבדיקה, או שני ליטרים של מוביפרפ בבוקר היום שבו מתבצעת הבדיקה.
חשוב לסיים לשתות את כל כמות המוביפרפ (2 ליטרים) לפחות שעתים לפני תחילת הבדיקה.
יש לסיים לשתות נוזלים צלולים אחרים (ראה פירוט הנוזלים תחת "חשוב") לפחות שעה אחת לפני תחילת הבדיקה.

לטיפול שניתן בשתי מנות וליטפול במנה אחת שניתנת בערב שלפני ההליך הקליני צריך להשאיר פרק זמן של שעה אחת לפחות בין סיום שתיית נוזל כלשהו (מוביפרפ או נוזל צלול) ובין תחילת ביצוע הקולונוסקופיה.

לטיפול שניתן במנה אחת בבוקר היום שבו מבוצע ההליך הקליני, יש להשאיר פרק זמן של שעתים לפחות לפני סיום נטילת מוביפרפ ושעה אחת לפחות לפני סיום שתיית נוזל צלול כלשהו ותחילת ביצוע הקולונוסקופיה.
חשוב: אל תאכל מזון מוצק מהרגע שאתה מתחיל לשתות מוביפרפ, ועד לאחר הבדיקה.

במהלך הטיפול הזה, שתיית מוביפרפ מומלץ לשתות ליטר אחד נוסף של נוזל צלול, כדי שלא תחוש צמא מאוד ולא תתייבש. משקאות מתאימים הם: מים, מרק צלול, מיץ פירות (ללא ציפת הפרי), משקאות קלים, תה או קפה (ללא חלב). אתה יכול לשתות את המשקאות האלה בכל עת שתרצה. **לכל המאוחר עד שעתים לפני הבדיקה במידה והבדיקה נעשית תחת הרדמה כללית, או לכל המאוחר עד שעה לפני הבדיקה אם הבדיקה מתבצעת ללא הרדמה כללית.**

אם שכחת ליטול את התרופה בזמן המיועד, שתה את המנה מיד כשאתה מגלה שלא שתית אותה. אם זה קורה מספר שעות לאחר הזמן שבו היה עליך לשתות אותה, פנה אל הרופא שלך או אל הרוקח והתייעץ איתם. **חשוב שתשלים את ההכנה שלך בזמן. על פי פירוט הזמנים המופיע בתחילת הפרק (פרק 3 – כיצד להשתמש בתרופה", תחת הכותר "מתי ליטול?").**

שעה אחת לפחות לפני הבדיקה כאשר אתה נוטל מוביפרפ בחלוקה לשתי מנות, ושעתים לפחות לפני הבדיקה אם אתה נוטל את כל מנת מוביפרפ שלך בבוקר הבדיקה.

עלון לרופא

This course of treatment can be taken either as divided doses, or as a single doses and timing is dependent on whether the clinical procedure is conducted with or without general anaesthesia as specified below:

For procedures conducted under general anaesthesia:

1. Divided doses: as one One liter litre of Moviprep in the evening before and one liter litre of Moviprep in the early morning of the day of the clinical procedure. Ensure consumption of Moviprep as well as any other clear fluids has finished at least two hours before the start of the clinical procedure.
2. Single dose: two Two liters litres of Moviprep in the evening preceding before the clinical procedure or two liters litres of Moviprep in the morning of the clinical procedure. Ensure consumption of Moviprep as well as any other clear fluids has finished at least two hours before the start of the clinical procedure.

For procedures conducted without general anaesthesia:

1. Divided doses: One litre of Moviprep in the evening before and one litre of Moviprep in the early morning of the day of the clinical procedure. Ensure consumption of Moviprep as well as any other clear fluids has finished at least one hour before the start of the clinical procedure.
2. Single dose: Two litres of Moviprep in the evening before the clinical procedure or two litres of Moviprep in the morning of the clinical procedure. Ensure consumption of Moviprep has finished at least two hours before the start of the clinical procedure. Ensure consumption of any clear fluids has finished at least one hour before the clinical procedure.

For the divided dose and single dose taken the evening before the procedure there should be at least one hour between the end of intake of fluid (Moviprep or clear liquid) and the start of the colonoscopy.

For the single dose in the morning of the procedure, there should be at least two hours between the end of intake of Moviprep and at least one hour between the end of intake of any clear liquid and the start of the colonoscopy.

העלונים המעודכנים במלואם נשלחו לפרסום במאגר התרופות שבאתר משרד הבריאות.

ניתן לצפותם במלואם בכתובת:

<https://israeldrugs.health.gov.il/#!/medDetails/145%2038%2033156%2000>

בברכה,

פאדאגיס ישראל סוכנויות בע"מ