

5 سوليفيناسين-تر بما

10 سوليفيناسين-تر بما

أعراض مطالية

يحتوي كل قرص من سوليفيناسين-تر بما 5 على:

Solifenacin succinate 5 ملجم Solifenacin succinate 5 ملجم

يحتوي كل قرص من سوليفيناسين-تر بما 10 على:

Solifenacin succinate 10 ملجم Solifenacin succinate 10 ملجم

لمعانية المواد غير الفعالة ومتباينات الحساسية: انظر الفصل 2 البند "معلومات عن بعض مركبات الدواء" والفصل 6 "معلومات إضافية".

اقرأ النشرة بالمعنون حتى نهايتها قبل استعمال الماء حتى تتحقق هذه النشرة على معلومات ملخصة عن الدواء، إذا توفرت لديك أسلحة مضاربة، فراعم الطبيب أو الصيدلي.

لقد دُعِّصَتْ هذه الدواء من أملوك، لا تعطه للآخرين. قد يضره الماء، حتى لو بدا لك أن حالتهم الطبلية متابهة.

لا يجوز استعمال الدواء لدى الأولاد والراهقين الذين سنهم دون الـ 18.

1. لأي غرض مخصوص هذا الدواء؟
الدواء مخصوص لعلاج سلس البول /أو حالات ارتفاع وتيرة التبول والجاج البول لدى المرضى

الذين يعانون من فرط نشاط المثانة البولية.

المضيلة العلاجية: مضادات الكوليدين**2. قبل استعمال الدواء:**
لا يجوز استعمال الدواء.**3. كف تستعمل الدواء؟**

يجب استعمال المستحضر دوماً وفق تعليمات الطبيب. عليك استشارة الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكون متأكداً من الجرعة الدوائية ومن كيفية العلاج بالمستحضر.
الجرعة الدوائية وكيفية العلاج يحددها الطبيب فقط الجرعة الدوائية الاعتيادية عادة هي: قرص واحد من 5 أو 10 ملجم في اليوم. سيتم تحديد الجرعة الدوائية بشكل فردي من قبل الطبيب. يفضل تناول الدواء في نفس الساعة كل يوم.

يمنعتجاوز الجرعة الموصى بها.

يجب بلع الدواء كاملاً مع الماء.

الهيرس/الشطير/المضبغ: يمنع الهيرس/الشطير/المضبغ بسبب طلاء الفرج.

إذا تناولت جرعة مفرطة أو إذا قام ولم بلع الدواء خطأ، فتوجه فوراً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى واصطحب معك عينة الدواء.

الأعراض الجانبية لفترط الجرعة الدوائية: صداع، جفاف الفم، دوران، تشنج الرؤية، نعاس، هلوسة، فرط الاستimulation، اختلالات، صعوبات في التنفس، ندقات قلبية مت}sار، توسيع الحفقة وحرصر البول.

إذا نسيت تناول هذا الدواء في الوقت المحدد، فلا تتناول جرعة مضاعفة. تناول الجرعة التالية في الوقت الاعتيادي واستشر الطبيب.

يجب المواظنة على العلاج حسب توصية الطبيب.

حتى لو طرأ تحسن على حالتك الصحية، فلا يجوز التوقف عن العلاج بالدواء دون استشارة الطبيب. قد يؤدي إيقاف العلاج إلى ظهور أعراض فرط نشاط المثانة البولية مرة أخرى أو تفاقها.

لا يجوز تناول الأدوية في اللعنة! راجع الملصق وتأكد من الجرعة في كل مرة تتناول فيها الدواء.

ضع النظارات الطبية إذا كنت بحاجة إليها. إذا توفرت لديك أسلحة مضاربة حول استعمال الدواء فاستشر الطبيب أو الصيدلي.

4. الأعراض الجانبية

مثل كل دواء، قد يؤدي استعمال سوليفيناسين-تر بما إلى نشوء أعراض جانبية عند بعض المستعملين. لا تقلق عن حدقة قافية الأعراض الجانبية. قد لا تعي من أي واحد منها.

يجب التوقف عن الاستعمال والتوجه إلى الطبيب إذا:

ظهور فعل تحبسن جلدي ينطلي كونمات تحت سطح الجلد ومحصورة بصعبات في التنفس - ظاهرة تسمى الوذمة الوعائية (angioedema).

يجب التوجه فوراً إلى الطبيب إذا ظهرت الأعراض التالية:

أصيبت بنيوحة تحبسن-تر بما زد فعل جلدي خطير (متلاً ظهر حويصلات وتقرن الجلد).

إذا كنت حساساً (أرجو) لل المادة الفعالة أو لأي من المركبات الأخرى التي يحتوي عليها الدواء.

في حالة حصر البول، الاستمرارات الخفيرة في الجهاز الهضمي (تضخم القولون السُّنْقُ)، الوهن المضلي الويلبي (ضعف شديد في العضلات) أو الضغط داخل العين المتصور باختصار الرُّزق).

لدى مرضى الكلى الذين يعانون من فرط نشاط العلاج بالديالysis والمريض الذي يعانون من الفشل الكلوي الخطير.

لدى المرضى الذين يعانون من مرض كلوي خطير أو مرض كبدى متوسط ويتأثرون علاجاً متزاماً بدواء آخر يسبب انتفاضاً في وتيرة تخلص الجسم من سوليفيناسين-تر بما، مثل كيتوكونازول.

تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال الدواء:**قبل العلاج بـ سوليفيناسين-تر بما، أخبر الطبيب إذا:**

كانت لديك مشكلة في التبول (السدادار جلوني)، كنت تعاني من إمساك، كنت معرضاً لخطر تباطؤ المرارة المعدية المضمني (حركة المعدة والأمعاء)، كنت تعاني من مرض كلوي حاد، كنت تعاني من مرض كبدى متوسط، كنت تعاني من فتق حاجاني أو من حرقة المعدة، كنت تعاني من اضطراب في الجهاز العصبي (اعتلال عصبي مستقل).

الأولاد والراهقون:

سوليفيناسين-تر بما غير مخصوص لاستعمال لدى الأولاد والراهقين الذين سنهم دون الـ 18.

نفخات/ارتجاد الفعل بين الأدوية:

إذا كنت تتناول، أو قد تناولت مخثر، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبيب وإضافات غذائية فأخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك، خاصة إذا كنت تتناول:

أدوية أخرى مضادة للذهن - قد تقلل تأثير سوليفيناسين-تر بما.

أدوية كولينيتية الفعل - قد تزيد تأثير سوليفيناسين-تر بما.

ميتوكراپاميد، سيزابيريد - أدوية تتسبب في تسرع عمل الجهاز الهضمي. قد يعطي سوليفيناسين-تر بما ثابت هما.

اعراض جانبية شائعة جداً - (very common) اعراض تظهر عند أكثر من مستعمل واحد من بين عشرة:
جفاف الفم

اعراض جانبية شائعة - (common) اعراض تظهر عند 1-10 مستعملين من بين 100:
امساك، تتوسّر الرؤية، غثيان، صعوبات في الهضم مثل شعور بامتلاء البطن، الالم في البطن، تجمّعات، حرقة المعدة وازعاج في البطن.

اعراض جانبية غير شائعة - (uncommon) اعراض تظهر عند 1-10 مستعملين من بين 1,000:
عدوى المسالك البولية وأو المثانة البولية، نعاس وتعب، تغيرات في حالة الذوق، جفاف/تهيج العينين، الحجرة، الجلد أو الألف، صعوبة في النبول، حرقة المعدة، الجذر المعدى المريبي، وذمة في الجزء السفلي من الرجل.

اعراض جانبية نادرة - (rare) اعراض تظهر عند 1-10 مستعملين من بين 10,000:
انسداد الأمعاء، امساك شديد، حصر البول، دوار، صداع، تقيّبات، حكة، فطح جلدي.

اعراض جانبية نادرة جداً - (very rare) اعراض تظهر عند أقل من مستعمل واحد من بين 10,000:
هلوسة، ارتباك، فطح جلدي تحسسي.

- اعراض جانبية انتشارها غير معروفة:
 - تغيرات في النشاط الكهربائي في القلب (تغيرات في مخطط كهربائية القلب)، نظم قلبي غير منتظم، دقات قلبية قوية، نبض سريع
 - انخفاض في الشهية، متغيرات مرتفعة للبوتاسيوم في الدم قد تسبب نظماً قلبياً غير سوي
 - ضغط مرتفع داخل الميدينين
 - اضطراب في الصوت
 - اضطراب في وظيفة الكبد
 - ضعف العضلات
 - اضطراب في وظائف الكلىتين

إذا ظهر عرض جانبى، إذا تفاقم أحد الأعراض الجانبية، أو إذا عانيت من عرض جانبى لم يذكر في هذه النشرة، فعليك استشارة الطبيب.

بإمكان التالية عن اعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "التلبلغ عن اعراض جانبية تقب العلاج الدوائي" الموجود في الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) والذي يوجه إلى استمارنة المنشطة للتلبلغ عن اعراض جانبية، أو عن طريق الدخول إلى الرابط: <https://sideeffects.health.gov.il> بالإضافة، يمكن أيضًا التلبلغ إلى البريد الإلكتروني: safety@trima.co.il.

5. كيف يجب تخزين الدواء؟

امنِ النسق! هذا الدواء، وكل دواء آخر، يجب حفظه في مكان ملقم بعيداً عن متناول أيدي الأولاد وأو الأطفال الرضيع ومحال رؤيئهم، وبذلك ستمتنع النسبم. لا تسبب الفقد بدون تعليمات صريحة من الطبيب.

لا يجوز استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (exp. date) المدون على العبوة، يشير تاريخ انتهاء الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

ظروف التخزين:

يجب التخزين في مكان جاف، دون الـ 25°C

6. معلومات إضافية

يحتوي الدواء بالإضافة إلى المادة الفعالة أيضاً على:

Lactose anhydrous, maize starch, hydroxypropyl methylcellulose, magnesium stearate, titanium dioxide, D&C yellow No. 10 aluminum lake, polyethylene glycol, erythrosine aluminum lake, FD&C blue #2 indigo carmine aluminum lake.

معرفوت 4023000
منتجات طيبة إسرائيلية
معرفوت م.ض.

P00001245

ترى ما

PIL-1122-04