

עלון לצרcn לפי תקנות הרוקחים (תקשיירם) התשמ"ז - 1986

השימוש מתחת לגיל 6 חודשים הינו על פי מרשם רופא בלבד.
מעל גיל 6 חודשים – התרופה משווקת ללא מרשם רופא.

נורופן לילדים תפוז

20 מ"ג/1 מ"ל, תרחיף

חומר פעיל ורכיביו:

כל 1 מ"ל מכיל: איבופרופן (Ibuprofen) 20 מ"ג

לרשימת החומרים הבלתי פעילים, אנא ראה סעיף 6. ראה גם סעיף "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה".

קרא בעיון את העלון עד סופו לפני שימוש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

עליך להשתמש בתכשיר על פי ההוראות בסעיף המינון לעלון זה. היועץ ברוקח אם הנר זוקק למידע נוספת. עליך לפנות לרופא במידה וتسمני המחלת (סימפטומים) מחמירים או אינם משתפרים לאחר 24 שעות בתינוקות בגלאי 6-3 חודשים או לאחר 3 ימים בילדים בני 6 חודשים ומעלה.

תרופה זו מתאימה לרוב התינוקות מעל גיל 3 חודשים, ילדים ולמבוגרים. השימוש בתינוקות בגלאי 6-3 חודשים הינו על פי מרשם רופא.
יש לפנות לרופא אם ילך נוטל אספירין במינון מעל 75 מ"ג ביום או אם ילך מפתח פריחה, קשי נשימה, שלשול או עייפות מוגברת.

1. למה מיועדת התרופה ?

להורדת חום ולשיכוך כאבים קלים עד בינוניים, לתינוקות ילדים מגיל 3 חודשים ועד 12 שנים (השוקלים 40 ק"ג בערך).

קבוצה רפואיית: נגד דלקת שאינם סטרואידים (NSAIDs).

2. לפני השימוש בתרופה

תרופה זו מתאימה לרוב האנשים אך על אנשים מסוימים להימנע מהשימוש בה. היועץ ברוקח או ברופא אם אין בטוח.

אין להשתמש בתרופה אם:

- אתה או ילך רגשים (אלרגיים) לאיבופרופן או לכל אחד מהמרכיבים הננספים אשר מכילה התרופה (ראה סעיף 6).
היו לך או ילך תגבות אלרגיות (כגון אסתמה, דלקת אף (ריניטיס), נפיחויות תה עריבות (אנגיואדמיה) או חרפת (אורטיקריה)) כתוצאה מנטיילת איבופרופן, חומצה אצטילסיליצילית (אספירין) או תרופות אחרות נגד דלקת שאינן סטרואידים (NSAIDs).
- יש לך או ילך או היו לך או ילך כיב/דימום בקיבה (שני אירועים מובהקים או יותר של התנקבות או דימום מוכחים).
- אתה או ילך סבלתם בעבר מדימום או התנקבות במערכת העיכול הקשורים לטיפול קודם בתרופות נגד דלקת שאינן סטרואידים (NSAIDs).
- אתה או ילך סובלים Mai ספיקת כבד, אי ספיקת כלויות או אי ספיקת לב חמורות.
הנр בשלושת החודשים האחרונים להרין.

ازהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה

לפני הטיפול בנוורופן לילדיים ספר לרופא אם:

- אתה או ילך סובלים או סבלתם מלחץ דם גבוה, בעיות לב או שbez מוחי, כיוון שישנה עליה קטנה בסיכון לב בעיות לב שימוש באיבופורופן.
- אתה או ילך סובלים מגורם סיכון לביעות לב, כגון סוכרת או מולטיטרול גבוהה.
- אתה או ילך סובלים מאסתמה או מחלת אלרגית כלשיה של הריאות.
- אתה או ילך סובלים או סבלתם מעבויות כבד, כליה, לב או מעי.
- אתה או ילך מיבושים, כיוון שקיים סיכון לביעות כליה.
- אתה או ילך סובלים מזאתת אדמנטיית מערכת (SLE, מחלת קרונה או מחלת כיבית של המעי הגס (קளיטיס כיבית).
- אתה או ילך סובלים מבעה תורשתית בהתחדשות עם פרוקטוז/סוכר פירוט (אי סובלות תורשתית לפראקטוז), היות והגופ יכול לייצר מעט פרוקטוז מהרכיב מלטיטול.
- מומלץ להימנע מהשימוש בתרופה במהלך הזמן בו יש **אבבעות רוח** (Varicella), **למטופל יש זיהום** - היות ותרופה זו עלולה להסתיר סימנים של זיהומים כגון חום וכאב. לכן, ניתן שתרופה זו עלולה לעכב טיפול浑身, דבר העולם להוביל לסיכון מוגבר לשיכרים. דבר זה נצפה בדלקת ריאות הנגרמת על ידי חיידקים וזיהומי עור חיידקים הקשורים לאבבעות רוח. אם אתה נוטל תרופה זו בזמן שיש לך זיהום ותסמיין הזיהום שלך נMSCים או מחמירים, היועץ ברופא לא דיחוי.

תגובה עורית - דוחה תגובה עורית חמורות בהקשר לטיפול בתרופה זו. עלייך להפסיק ליטול/لتת את התרופה ולפנות מיד לקבالت טיפול רפואי, אם אתה או ילך מפתח פריחה בעור, נגעים ברקמות הריריות, שלפוחיות או סימנים אחרים של אלרגיה להיות שזה יכול להיות הסימן הראשון של תגובה עורית חמורה מאוד. ראה סעיף 4.

ازהרות נוספת:

ازהרות הבאות מתיחסות בעיקר למוגרים. ככל מקרה, שקול אותם היטב לפני מתן או נטילת תרופה זו:

- לתרופות כגון נורופן עלול להיות קשור עם עליה קטנה בסיכון להתקף לב (אטם שריר הלב) או שbez מוחי. הסבירות לסיכון כלשהו تعالה עם נטילת מינונים גבוהים וטיפול ממושך. אין לעבור על המינון או משך הטיפול המומליצים.
 - אם אתה סובל מעבויות לב, עברת שbez מוחי או אתה חושב שאתה נמצא במצבים אלו (לדוגמא אם אתה סובל מלחץ דם גבוה, מסוכרת או מולטיטרול גבוה, או אם אתה מעשן), עלייך לשוחח עם הרופא או הרוקח אודות הטיפול.
 - אם אתה קשיש היועץ ברופא לפני השימוש בתרופה.
- יש לספר מיד לרופא אם:**
- התסמינים של ילך אינם נעלמים באופן מהיר או אם הם מחמירים.
 - אין בטוח מהי המחלת של ילך או שהמחלה מלאה בפריה, קשיי נשימה, שלשול או עייפות מוגברת.

אנטראקטזיות/תגובה בין תרופתיות:

- אם אתה או ילך לוקחים, או אם לוקחתם לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח. במיוחד אם אתה או ילך לוקחים:
- תרופות אחרות המכילות איבופורופן או תרופות אחרות נגדות דלקת שאין סטרואידים, כולל אלו אותן אתה יכול לרכוש ללא מרשם.
 - אספירין במינון נמוך (עד 75 מ"ג ליום)
 - משתנים (עוזרים במתן שתן)
 - נוגדי קרישה (תרופות מדלולות דם כגון וורפרין)
 - תרופות לטיפול בלחץ דם גבוה (כגון קפטופריל, אטנולול, לוסרטן)
 - ליתיאם (להפרעות במצב רוח).
 - מתותרקסט (לפסוריאזיס, דלקת מפרקים וסוגים של סרטן)
 - זידובודין (ל- HIV, נגיף החיסוני האנושי).
 - קווטיקוסטרואידים (תרופה אנטי דלקתית)
 - גליקוזידים של הלב (לביעות לב)
 - ציקלוספורין או טקROLימים (למניעת דחית איברים לאחר השתלה)

- מיפוריסטן (להפסקת הריאן)
- אנטיביוטיקה מקבוצת הקווינולוניים (לziehomim)
- תרופות נוגדות טסיות כגון דיפירידאמול, קלופידוגרל
אם אין בטוח אילו סוג תרופות ילך נוטל, הראה את התרופה לרופא או לרוקח.

שימוש בתרופה ומזון
במטופלים בעלי קיבה רגישה, ניתן להשתמש בתרופה עם או לאחר ארוחה.

הריאן, הנקה ופוריות:

הריאן

لتכשיר זה קיימת תופעת לוואי אפשרית של פגעה כל'ית בעורר ומיועט מי שפיר החל בשבוע 20 להריין. מומלץ להימנע משימוש בתכשירים ממפחחת-hNSAIDs החל בשבוע 20 להריין ולהיעזר באיש צוות רפואי במידת הצורך. יש להיעזר ברופא טרם נטילת תרופה זו במהלך 6 החודשים הראשונים של ההריין. אין להשתמש בנורופן לילדים אם את ב- 3 החודשים האחרונים להריין.

הנקה במחקריהם אחדים, נמצא ריכוזים נמוכים מאוד של איבופורופן בחלב אם, אולם לא סביר שלຄמויות אלו תהיה השפעה על התינוק היונק.

פוריות

איבופורופן שיר לקבוצה של תרופות, אשר עלולה לפגוע בפוריות בנים. הדבר הפיך עם הפסיקת השימוש בתרופה. אין זה סביר כי שימוש בתרופה זו מעת לעת ישפיע על סיכוי להיכנס להריין, עם זאת, ספרי לרופא לפני השימוש בתרופה אם את סובלת מקרים להיכנס להריין.

נהיגה ושימוש במכונאות:

לא צפויות השפעות על היכולת לנוהג ולהפעיל במכונות במינונים ובמשך הטיפול המומלצים.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה

- התרופה מכילה מלטיטול. אם נאמר לך על ידי רופא שיש לך אי סבירות לסתוררים מסוימים, עליך להתייעץ עם הרופא לפני נטילת תרופה זו.
- יתכן שלמלטיטול תהיה השפעה משלשת קלה. הערך הקלורי של מלטיטול: 2.3 קילו קלוריות/גרם כל 5 מ"ל מכילים 9.08 מ"ג נתרן.
- נורופן לילדים תפוץ – מכיל בנוסף רמות נמוכות מאוד של גלוטון (מעמילן חיטה). התרופה נחשבת 'לא גלוטן' ולא סביר שהיא תגרום לביעות בחולי צלייאק. 5 מ"ל של התרופה מכילים לא יותר מ- 0.225 מיקרוגרים של גלוטון. אין לקחת את התרופה אם הנך סובל מאלרגיה לחיטה (מצב השונה ממחלה צלייאק).

3. כיצד תשתמש בתרופה ?

עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אין בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר.

המינון המקביל בדרך כלל הוא:
5-10 מ"ג לך"ג כל 6 עד 8 שעות עד מקסימום 4 פעמים ביום ובמרווחים של לפחות 4 שעות בין מנה למנה. אין עברור על מינון של 40 מ"ג לך"ג ביוםמה. המינון המქסימלי מעל גיל 12 שנים הוא 1200 מ"ג ליוםמה.

טבלת מינונים לפי משקל

משקל (ק"ג)	מינון לפי מ"ל לשימוש בזמן מדידה	מספר פעמים ב-	מינון לפי מרשם רופא
מתחת ל- 5 ק"ג			
2 מ"ל	2	3-4	5-5.4
2.5 מ"ל	2.5	3-4	5.5-8.1
3.75 מ"ל	3.75	3-4	8.2-10.9
5 מ"ל	5	3-4	11-15
7.5 מ"ל	7.5	3-4	16-21

3-4	10 מ"ל	22-26
3-4	12.5 מ"ל	27-32
3-4	15 מ"ל	33-43

טבלת מינונים לפי גיל

מספר פעמיים ב- 24 שעות	מינון לפי מ"ל לשימוש במזרק מדידה	גיל (שנתיים)
	לפי מרשם רופא	6-3 חודשים
3-4	2.5 מ"ל	6-11 חודשים
3-4	3.75 מ"ל	12-23 חודשים
3-4	5 מ"ל	2-3 שנים
3-4	7.5 מ"ל	4-5 שנים
3-4	10 מ"ל	6-8 שנים
3-4	12.5 מ"ל	9-10 שנים
3-4	15 מ"ל	11-12 שנים

ילדים בגילאים זהים יכולים להיות בעלי משקלים שונים באופן משמעותי. לכן יש לעשות מאבחן ולברר את משקל הילד ולקבוע מינון לפי טבלת המשקל. רק אם אין אפשרות לברר את משקל הילד ניתן לקבוע מינון לפי טבלה זו.

אין לתת בתינוקות מתחת לגיל 3 חודשים. לתינוקות בגילי 6-3 חודשים או מתחת לו - 5 ק"ג השימוש הוא על פי מרשם רופא.

מגיל 6 חודשים ומעלה השימוש הוא ללא מרשם רופא. אם ידוע לך משקל הילד. יש לתת את המינון כפי שמופיע בטבלת המשקל המציגת מינון לפי משקל. רק במקרה שלא ידוע משקל הילד. יקבע המינון על פי הגיל כפי שמופיע בטבלת הגיל המציגת מינון לפי גיל הילד.

اذהרה: אין לעבור על המנה המומלצת.

משך הטיפול

לשימוש קצר טוחן בלבד.

אין להשתמש בתרופה זו ליותר מ- 24 שעות בתינוקות בגiley 6-3 חודשים. אם התסמים נמשכים יותר מ- 24 שעות או מחמירים, יש להיוועץ ברופא.

אין להשתמש בתרופה זו ליותר מ- 3 ימים בילדים מגיל 6 חודשים ומעלה. אם התסמים נמשכים יותר מ- 3 ימים או מחמירים, יש להיוועץ ברופא.

יש ליטול את המנה הנמנוכה ביוטר ולזמן הקצר ביותר על מנת להקל על התסמים. היוועץ ברופא ללא דיחוי אם ילך נוטל תרופה זו בזמן שיש לו זיהום ותסמיני הזיהום שלו נמשכים או מחמירים.

צורת הנטילה
תמיד יש לנער את הבקבוק היטב לפני השימוש.

הוראות פתיחה

כדי להסיר את הפקק, יש ללחוץ עליו כלפי מטה, ולסובב אותו נגד כיוון השעון.

פקקים העמידים לפטיחה על ידי ילדים הורידו משמעותית את מספר מקרי ההרעללה הנגרמים על ידי תרופות בכל שנה. אולם, אם אתה מתקשה בפתיחה האריש, אפשרותך לroxח בבקשה להסיר את מגנון הבטיחות של הפקק ולהפכו לפקק רגיל, קל לפטיחה.

אופן השימוש:

האריזה מכילה מזרק למידית מנה של עד 5 מ"ל.

עליך להשתמש במזרק המועד למדידת הכמות הנכונה של התרופה. אם לא צורף אמצעי מדידה לאריש, היוועץ ברוקח. אין להשתמש בכפיית ביתית לצורכי מדידת כמות התרופה. הכספיות הביתיות שונות בגודלן ויתכן שלא תקבל את כמות התרופה הנכונה.

1. הכנס את המזרק בחוזקה לתוך הפתח שבצואר הבקבוק.
 2. למלוי המזרק, הפור את הבקבוק. תור החזקת המזרק במקומו, משור בעדינות את הבוכנה כלפי מטה לשאייבת התוropa עד לימיון המתאים על גבי המזרק. ראה טבלאות מינומיים.
 3. הפור בחזרה את הבקבוק, הוציא את המזרק מפתח הבקבוק על ידי סיבוב המזרק בעדינות.
 4. הכנס את קצה המזרק לפיו של הילד ולחץ בעדינות על הבוכנה מטה כדי להוציא את התוropa באיטיות ובעדינות.
5. לאחר השימוש, סגור את הבקבוק באמצעות הפקק. שטוף את המזרק במים חמימים ואפשר לו להתיבש.
- אם השתמשת או נתת לילדך מינון גבוה יותר**
- אם נטلت או ילך נטול מנה גדולה יותר מהנדרש או אם בטעות בעליל מן התוropa, פנה תמיד לרופא או לבית החולים הקרוב ביותר על מנת לקבל חוות דעת לגבי הסיכון ולהתייעץ בנוגע לפעולה שיש לנ��וט. התסמים עולמים כלולים בחילה, כאב בטן, הקאה (עלולה להיות כמות קטנה של דם), כאב ראש, צלצול באוזניים, בלבול ותנוועת עיניים קופציוניות, במינונים גבוהים דוחה על מנומם, כאבים בחזה, דפיקות לב חזקות, אובדן הכרה, עוויתות (בעיקר אצל ילדים), חולשה וחרחורת, דם בשתן, תחושת קור בגוף וביעות נשימה.
- אם שכחת לhattת או ליטול מנה**
- אם שכחת לhattת או ליטול מנה, תן או טול את המנה הבאה בהתאם לצורך, בתנאי שהלפו לפחות 4 שעות זמן נטילת המנה הקודמת. אין לhattת או ליטול במנה כפולה.
- אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התוoyaת והמנה בכל פעע שהן נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הנך זוקן להם.**
- אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, הייעוץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

- כמו בכל תרופה, השימוש בנורופן לילדים עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלואוי. יתכן ולא תסבול מכך אחת מהן.
- תופעת הלואוי השכיחה ביותר הינה גירוי של הקיבה אשר יכול לגרום לביעויות כגון קשיי עיכול וצרבת. **יש להפסיק את מתן התרופה לילדך ולספור מיד לרופא במקרה של:**
- דם בצואה
 - צואה זיפתית שחורה
 - הקאת דם או חלקיקים כהים הנראים כמו גרגירי קפה
 - צפיפות לא מוסברים, אסטמה, קוצר נשימה, פריחה עורית (העלולה להיות חמורה ומלואה בשלפוחיות או קילוף העור), גירוד או חבורות, תגבות עוריות חמורות כולל תסמנות סטיבנס ג'ונסון, קצב לב מהיר, אצירת נזלים (קרוסליים נפוחים או ירידה בכמות השתן)
 - צואר נוקשה, כאב ראש, בחילה, הקאה, חום וחוסר התמצאות
 - נפיחות של הפנים, הלשון או האגרן (אלו יכולים להיות סימנים של תגבות אלרגיה חמורתה)
 - תגבהה עורית חמורה הידועה כתסמנות DRESS (תסמונת התגובה התרופתית עם אוזינופיליה ותסמים מערכתיים). **טסמיינ (DRESS) כוללים:** פריחה עורית, חום, נפיחות של בלוטות הלימפה ועליה במספר האוזינופילים (סוג של תא דם לבנים).
 - פריחה אדומה, עם קשושים, מפשטה, ועם בליטות מתחת לעור ושלפוחיות הממוקמות בעיקר בקפלים העור, מרכז הגוף והగפיים העליוניים, המלווה בחום בתחילת הטיפול (פוצולוזיס תפרחתית מפשטה חרדה, AGEP) (שכיחות אינה ידועה). ראה סעיף 2.

יש להפסיק את מתן התרופה לילדך ולספור לרופא במקרה של:

- כאב בטן לא מוסבר, קשיי עיכול, צרבת, בחילה או הקאה
- הצהבהה של העיניים, צואה חיוורת ושתן כהה (אלו יכולים להיות סימנים של בעיות כליה או כבד)
- כאב גרון חמוץ המלווה בחום גבוה

- חבותות או דימום שאינם מוסברים, עייפות, הידבקות ביוטר זיהומיים מהרגיל כגון כיבים בפה, הצטננות, כאב גרון, חום (אלו יכולים להיות סימנים של אנמיה או הפרעותدم אחרות)

תופעות לוואי נוספות :
תופעות לוואי שאין שכיחות :

- כאב ראש

- תופעות לוואי נדירות :**
- שלשול, נפיחות או עצירות. ספר לרופא אם תופעות אלו נמשכות יותר ממספר ימים או מטרידות.

- תופעות לוואי נדירות מאוד :**
- בעיות כליה אוCBD עלולות להתרכש בשימוש עם איבופרопן.
 - שבח מוח או בעיות לב עלולים להתרכש בשימוש עם איבופרопן. הסבירות לכך נמוכה ברמת המינון הניתנת לילדיים.
 - החמרה של דלקת בעור הגס (קוליטיס) ומחלת קrhoה.
 - לחץ דם גבוה
 - כאב קיבת, דימום בקיבת, דלקת בירית הקיבת
- תופעות לוואי שכיחותן אינה ידועה**
- במקרים חריגים, זיהומיים חמורים של העור והרകמות רכות התרכשו בזמן אבעבועות רוח (Varicella).
 - העור נעשה רגיש לאור.

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלואוי מחמירה או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צוינה בעלון, עיר להתייעץ עם הרופא.

דיווח של תופעות לוואי
ניתן לדוח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לוחça על הקישור "דיווח על תופעות לוואי" עקב טיפול רפואי" שנמצא בדף הבית של משרד הבריאות (il. www.health.gov) המפנה לטופס המukan לדוח על תופעות לוואי, או ע"י כניסה ל קישור:

<http://sideeffects.health.gov.il>

5. איך לאחסן את התרופה ?

- מנע הרעללה! תרופה זו וכל תרופות אחרות יש לשמר במקומות סגור מחוץ לשדה ראייתם והישג ידם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעללה. אל תגרום להתקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp.date) המופיע על גבי האריזה והבקבוק. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.
- **תנאי אחסון:**
אחסן בטמפרטורה הנמוכה מ- 25°C.
ניתן להשתמש בתכשיר במשך 6 חודשים לאחרפתיחה הבקבוק לראשונה.

6. מידע נוסף

נוסף על החומר הפעיל התרופה מכילה גם:

Xanthan gum, Sodium citrate, Citric acid, Orange 2M-16014, Sodium saccharin, Sodium chloride, Maltitol Liquid, Domiphen bromide, Glycerin, Polysorbate 80, Purified water.

כיצד נראה התרופה ומה תוכן הארץזה:

נורופן לילדים תפוז: תרחיף בטעם תפוז בצבע חלבוי, המשווק באריזות של 100 מ"ל, 150 מ"ל ו- 200 מ"ל - יתכן ולא כל גודלי הארץזה מסווגים.

שם בעל הרישום וכותבו: רקיט בנקיזר (נייר איסט) בע"מ, רחוב הנגר 6, הדר הכרמל 4527704.

שם היצרן וכותבו: רקיט בנקיזר הלט'קר אינטרנשיונל בע"מ, תל, אנגליה.

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:

נורופן לילדיים תפוז: 22-29724-31-116

לשם הפשטות ולהקלת הקראיה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.