نشرة طبية للمستهلك بموجب تعليمة الصيدلية رقم 1986

باروتين 20 مليغرام مطلية

يحتوي كل قرص مطلي على:
باروكساميتين (Paroxetine (as Hydrochloride) 20 mg
(باروكساميتين (كهيدروكلوريد) 20 ملغ
للاطلاع على قائمة المواد غير الفعالة وسيميات الاثر انظر النشرة الـ "معلومات إضافية".

إذا لم تطق عليك أحد هذه الأمور، فاخبر الطبيب دون أن تستعمل باروتين.

تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال الدواء:

قبل العلاج باروتين، أخبر الطبيب إذا:
- كنت تستعمل أية أدوية أخرى (انظر في البند 2 "استعمال الدواء").
- كنت تعاني من أمراض في الكبد أو الكليتين. فقد يتم تغيير الجرعة الدواء حتى لو بدأ لك أن حالتهم الطبية مشابهة.

نشرة الأدوية المضادة للاكتئاب والقلق من خطر تسبب تعرضات ذاتية الخطورة لدى مرضى الاكتئاب حتى سن 25 سنة.

عند البدء بالعلاج بالدواء، يجب على مقلمي الصحة الصحية مراقبة المرضى الذين يتلقون التعرضات الذاتية مثل تفكير الاكتئاب، الافكار الانتحارية، العدوانية وما شابه ذلك. إذا حدثت تغيرات جديدة، يجب توجيه المرضى إلى الطبيب.

1. لأي غرض مخصص هذا الدواء؟

باروتين مخصص لعلاج الاكتئاب البالغين المصابين بالاضطراب الاكتئابي الشديد/السريري و/أو باضطرابات القلق. استطرادات القلق التي يستعمل باروتين لعلاجها هي: اضطراب الوسواس القهري، اضطراب القلق الاجتماعي، اضطراب الهلع، القلق العام واضطراب الضغط القبل المعمم.

الفصيلة العلاجية: مثبطات استرداد السيروتونين الانتقائية (SSRI)

كيف يعمل الدواء؟ يعمل الدواء على زيادة مستويات السيروتونين الانتقائية لدى الدماغ. السيروتونين هو مادة تساعد على منع الاكتئاب والقلق. باروتين يعمل على مستويات مهم من أجل مساعدتك على الشعور بالتحسن.

2. قبل استعمال الدواء

لا يجوز استعمال الدواء إذا:

- **كنت لدى حساسية (ارجية)** لباروكساميتين أو لأي من المركبات الأخرى التي يحتوي عليها الدواء (للاطلاع على قائمة المركبات الكاملة، انظر البند 6).
- كنت تعاني من جلوكاوما (زرق - ضغط العين).
- كنت تعاني من انسداد الحنجرة (انظري في البند 2 "الحمل، الإرضاع والخصوبة").
- كان عمرك أقل من 18 عاما (باروتين لا يعطى لـ "الأولاد والمراهقين الذين سنهم دون الـ 18").

إذا انطبق عليك أحد هذه الأمور، يجب عليك طبيبك بهذه الحقيقة. فراجع الى طبيبك واسأله عما عليك فعله بخصوص استعمال باروتين.

إذا الأولاد والمراهقين الذين سنهم دون الـ 18: لا يعطى باروتين لدى الأولاد والمراهقين الذين سنهم دون الـ 18.

تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال الدواء:

قبل العلاج باروتين، أخبر الطبيب إذا:
- كنت تستعمل أية أدوية أخرى (انظر في البند 2 "استعمال الدواء").
- كنت تعاني من أمراض في الكبد أو الكليتين. فقد يتم تغيير الجرعة الدواء حتى لو بدأ لك أن حالتهم الطبية مشابهة.

التفاعلات بين الأدوية:
- كنت تستعمل كحليات لعلاج سرطان الثدي و تعرف أنك تعاني من أعراض تعتمد على هرمون الإستروجين (انظري في البند 2 "الحمل، الإرضاع والخصوبة").
- كنت تستعمل أدوية لعلاج الصرع (انظري في البند 2 "استعمال الدواء").
- كنت تعاني من اضطراب في الكبد أو الكليتين. فقد يتم تغيير الجرعة الدواء حتى لو بدأ لك أن حالتهم الطبية مشابهة.
- كنت تعاني من جلوكاوما (زرق - ضغط العين).
- كنت تعاني من انسداد الحنجرة (انظري في البند 2 "الحمل، الإرضاع والخصوبة").
- كان عمرك أقل من 18 عاما (باروتين لا يعطى لـ "الأولاد والمراهقين الذين سنهم دون الـ 18").

إذا انطبق عليك أحد هذه الأمور، يجب عليك طبيبك بهذه الحقيقة. فراجع الى طبيبك واسأله عما عليك فعله بخصوص استعمال باروتين.

إذا الأولاد والمراهقين الذين سنهم دون الـ 18: لا يعطى باروتين لدى الأولاد والمراهقين الذين سنهم دون الـ 18.

تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال الدواء:

قبل العلاج باروتين، أخبر الطبيب إذا:
- كنت تستعمل أية أدوية أخرى (انظر في البند 2 "استعمال الدواء").
- كنت تعاني من أمراض