

**עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים)**

**השתמ"פ – 1986**  
**מוקדמות**

התרופה מוקדמת על-ידי מרשם רופא בלבד

## רינבוק™ 15 מ"ג

## רינבוק™ 30 מ"ג

## רינבוק™ 45 מ"ג

### טבליות לשחרור ממושך

**המרכיב הפעיל וכמותו:**

כל טבליה לשחרור ממושך מכילה אופדסיטיניב (כמהידרט) 15 מ"ג

Upadacitinib (as hemihydrate) 15 mg

כל טבליה לשחרור ממושך מכילה אופדסיטיניב (כמהידרט) 30 מ"ג

Upadacitinib (as hemihydrate) 30 mg

כל טבליה לשחרור ממושך מכילה אופדסיטיניב (כמהידרט) 45 מ"ג

Upadacitinib (as hemihydrate) 45 mg

**קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה.** עלון זה מכיל מידע ממציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

תרופה זו נרשמה לטיפול עבורך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מצבם הרפואי דומה.

בנוסף לעלון, לתכשיר רינבוק קיים 'כרטיס מידע בטיחותי למטופל'. כרטיס זה מכיל מידע בטיחותי חשוב, שעליך לדעת, לפני התחלת הטיפול ובמהלך הטיפול ברינבוק ולפעול על פיו. יש לעיין בכרטיס מידע בטיחותי למטופל ובעלון לצרכן בטרם תחילת השימוש בתכשיר. יש לשמור את הכרטיס לעיון נוסף במידת הצורך.

### 1. למה מיועדת התרופה?

רינבוק מיועד לטיפול ב:

- דלקת מפרקים שגרונתית (Rheumatoid Arthritis) ביונית עד חמורה במבוגרים, אשר חוו תגובה לא מספקת בטיפול קודם בתרופה אנטי־ראומטית אחת או יותר מקבוצת DMARDs שהשתפלה היה בלתי נסבל עבורם. ניתן להשתמש ברינבוק טיפול יחיד או בשילוב עם מתותרקסאט (methotrexate).
- דלקת מפרקים ספחתית (Psoriatic Arthritis) במבוגרים, אשר חוו תגובה לא מספקת בטיפול קודם בתרופה אנטי־ראומטית אחת או יותר מקבוצת DMARDs או שהטיפול היה בלתי נסבל עבורם. ניתן להשתמש ברינבוק טיפול יחיד או בשילוב עם מתותרקסאט (methotrexate).
- דלקת חוליות מקשחת (Ankylosing Spondylitis) במבוגרים, אשר חוו תגובה לא מספקת לטיפול מקובל.
- דלקת עור אטופית (Atopic Dermatitis) ביונית עד חמורה במבוגרים ובמתבגרים בגילאי 12 ומעלה אשר מועמדים לטיפול סיסטמי.
- קוליטיס כיבית (Ulcerative Colitis) ביונית עד חמורה במבוגרים, אשר חוו תגובה לא מספקת, אובדן תגובה או אי־טבילות לטיפול קונבנציונלי או ביולוגי קודם.

**קבוצה תרפויטית:** מדכאי מערכת חיסון סלולטיביים, מעכבי ג'אנוס קינאז.

רינבוק פועל על ידי הפחתת הפעילות של אנזים בגוף הנקרא "ג'אנוס קינאז" אשר מוריד דלקת.

### דלקת מפרקים שגרונתית

רינבוק משמש לטיפול בדלקת מפרקים שגרונתית במבוגרים. דלקת מפרקים שגרונתית זוהי מחלה הגורמת למפרקים מודלקים. אם אתה סובל מדלקת מפרקים שגרונתית פעילה ביונית עד חמורה, ייתכן ותחילה תקבל תרופות אחרות, אשר אחת מהן תהיה ככל הנראה מתותרקסאט. אם תרופות אלו לא השפיעו באופן מספק, תקבל רינבוק עם או ללא מתותרקסאט לטיפול בדלקת המפרקים השגרונתית שלך.

רינבוק יכול לעזור בהפחתת כאב, נוקשות ונפיחות במפרקים שלך, להפחית עייפות, ויכול להאט את הנזק לצעם ולסחוס במפרקים הלחצי. השפעות אלו יכולות להקל על הפעילות היום-יומית הרגילה שלך ובכך לשפר את איכות חיךך.

### דלקת מפרקים ספחתית

רינבוק משמש לטיפול בדלקת מפרקים ספחתית במבוגרים. דלקת מפרקים ספחתית הינה מחלה הגורמת למפרקים מודלקים ופסוריאזיס. אם אתה סובל מדלקת מפרקים ספחתית פעילה, ייתכן ותחילה תקבל תרופות אחרות. אם תרופות אלו לא השפיעו באופן מספק, תקבל רינבוק עם או ללא מתותרקסאט לטיפול בדלקת המפרקים הספחתית שלך.

רינבוק יכול לעזור בהפחתת כאב, נוקשות ונפיחות במפרקים שלך ומסביבם, כאב ונוקשות בעמדת השרדה, נגיעים ספחתיים בעור ועייפות ויכולה להאט את הנזק לצעם ולסחוס במפרקים שלך. השפעות אלו יכולות להקל על הפעילות היום-יומית הרגילה שלך ובכך לשפר את איכות חיךך.

### דלקת חוליות מקשחת

רינבוק משמש לטיפול בדלקת חוליות מקשחת במבוגרים. דלקת חוליות מקשחת היא מחלה הגורמת בעיקר לדלקת בעמוד השרדה. אם אתה סובל מדלקת חוליות מקשחת פעילה, ייתכן ותחילה תקבל תרופות אחרות. אם תרופות אלו לא השפיעו באופן מספק, תקבל רינבוק לטיפול בדלקת החוליות המקשחת שלך.

רינבוק יכול לעזור בהפחתת כאבי גב, נוקשות ודלקת בעמוד השרדה. השפעות אלו יכולות להקל על הפעילות היום-יומית שלך ובכך לשפר את איכות חיךך.

### דלקת עור אטופית

רינבוק משמש לטיפול בדלקת עור אטופית ביונית עד חמורה במבוגרים ומתבגרים בגילאי 12 ומעלה. רינבוק ניתן לשימוש עם תרופות למריחה על העור שניתנות לדלקת עור אטופית או כטיפול יחיד.

נטילת רינבוק יכולה לשפר את מצב העור, להפחית גרד והתקלחות. רינבוק יכול לסייע בשיפור חסמינים של כאב, חרדה ודיכאון אשר יכולים להופיע בחולים עם דלקת עור אטופית. רינבוק יכול גם לסייע בשיפור הפרעות שינה אויכות החיים הכוללת.

### קוליטיס כיבית

קוליטיס כיבית זו מחלה דלקתית של המעי הגס. רינבוק משמש לטיפול במבוגרים הסובלים מקוליטיס כיבית אשר הגיבו בצורה לא מספקת או שטיפול קודם לא היה נסבל עבורם. רינבוק יכול לעזור בהפחתת סימנים ותסמינים של המחלה הכוללים דימום צואתי, כאב בטני, חדיפות ותכיפות הליכה לשירותים. השפעות אלו יכולות לאפשר קיום שגרת חיים תקינה והקלה בהשגישות.

### 2. לפני השימוש בתרופה

#### אין להשתמש בתרופה אם:

- אתה רגיש (אלרגי) לאופדסיטיניב או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (מפורטים בסעיף 6)
- יש לך זיהום חריף (כגון דלקת ריאות או זיהום עור חיידקי)
- יש לך שחפת פעילה (TB)
- יש לך בעיות כבד חמורות
- היש קבילות (ראי טבליות "הריון, הנקה ופוריות")

#### אזהרות מיוחדות ונוגעות לשימוש בתרופה

**לפני הטיפול ובמהלך הטיפול ברינבוק ספר לרופא אם:**

- יש לך זיהום (חום, הדעה, או צמרמורות, קוצר נשימה, עור חם, אדום או כואב או פצעים על גופך, הרגשת עייפות, שיעול, מחשבת צריבה בעת מתן שתן או מתן שתן לעיתים תכופות יותר מהרגיל, כאב ראש חמור עם צוואר נוקשה), או אם אי פעם היה לך זיהום חוזר – רינבוק יכול להפחית את יכולת הגוף שלך להילחם בזיהומים ולכן עשוי להחמיר זיהום קיים, או להגביר את הסיכוי שלך לפתח זיהום חדש סבלת משחפת או שהיית במגע קרוב עם מישהו חולה שחפת. הרופא שלך יבצע בדיקה להפחתת לפני התחלת הטיפול ברינבוק וייתכן שיחזור יע הבדיקה בזמן הטיפול סבלת מזהום הרפס זוסטר (שלבקת חוגרת), כיוון שרינבוק יכול לאפשר לזיהום לחזור. ספר לרופא שלך אם יש לך פריחה כואבת על העור עם לפלופחית, כיוון שאלו יכולים להיות סימנים לשלבקת חוגרת
- הייתה לך אי פעם דלקת כבד (קוליטיס) מסוג B או C
- קיבלת לאחרונה או שאתה עתיד לקבל חיסון – זאת כיוון שחיסונים חיים אינם מומלצים בזמן השימוש ברינבוק
- יש לך סרטן – מכיוון שהרופא שלך יאסטרך להחליט אם אתה עדיין יכול לקבל רינבוק
- אתה בסיכון גבוה לפתח סרטן עור, הרופא שלך יכול להמליץ על פעולות נוגעות, כגון בדיקות עור שגרניות בזמן נטילת רינבוק. דבר עם הרופא שלך אם אתה מפתח חשד או שינוי בפרחה העור באזור מסוים. מטופלים מסוימים שטופלו ברינבוק במינוח סרטני עור
- יש לך בעיות לב, לחץ דם גבוה או כולסטרול גבוה
- היבד שלך אינו מתפקד כמו שצריך
- היה לך קריש דם בוורידים הרגילים (פקקת ורידים עמוקים) או בריאות (תסחיף ריאתי). ספר לרופא שלך אם יש לך רגל נפוחה וכואבת, כאב בחזה או קוצר נשימה, כיוון שאלו יכולים להיות סימנים לקריש דם בוורידים
- יש לך בעיות בכליות
- יש לך כאב בטני בלתי מוסבר, יש או היתה לך דלקת סעיף (דיברטיקוליטיס, דלקת כואבת של כיסים קטנים בדופן המעי שלך) או כיבים קבויב או במעי, או הינך נוטל תרופות נוגדות דלקת אל סטרואידיות.

אם אתה חווה אחת מתופעות הלוואי החמורות הבאות, פנה מיד לרופא שלך:

- תסמינים כגון פריחה (סרפדת), קשיים בנשימה או נפיחות של השפתיים, הלשון או הגרון, ייתכן שאתה חווה תגובה אלרגית. חלק מהאנשים שנטלו רינבוק חוו תגובות אלרגיות חמורות. אם אתה חווה אחד מהתסמינים במהלך הטיפול עם רינבוק, הפסק לטוול רינבוק ופנה לקבלת עזרה רפואית דחופה באופן מדי
- כאבי עיניים, במיוחד אלו המלווים בחום, בחילות והקאות

#### בדיקות ומעקב

צאטרך לבצע בדיקות דם לפני התחלת הטיפול ברינבוק או בזמן נטילת התרופה. זאת כדי לבדוק אם קיימת ספירת תאי דם אדומים נמוכה (אנמיה), ספירת תאי דם לבנים נמוכה (לויטופניה או לימפופניה), ומת שומנים גבוהה בדם (כולסטרול) או רמות גבוהות של אנזימי כבד. הבדיקות הן כדי לוודא שהטיפול ברינבוק אינו גורם לבעיות.

#### קשיים שיעור

שיעור גבוה יותר של זיהומים בקרב חולים בני 65 ומעלה. ספר לרופא שלך ברגע שאתה מבחין בסימנים או בתסמינים של זיהום.

#### ילדים ומתבגרים

רינבוק לא מומלץ לשימוש בילדים מתחת לגיל 12 או במתבגרים השוקלים פחות מ-30 ק"ג הסובלים מדלקת עור אטופית, מכיוון שהוא זו נחקר בחולים אלו. רינבוק לא מומלץ לשימוש בילדים ובמתבגרים מתחת לגיל 18 עם דלקת מפרקים שגרונתית, דלקת מפרקים ספחתית, דלקת חוליות מקשחת או קוליטיס כיבית, זאת מכיוון שהוא לא נחקר בקבוצת גיל זו.

#### אינטראקציות/תגובות בין תרופותיות

**אם אתה לוקח, או אם אתה לוקחת תרופות, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.** זאת מכיוון שתרופות מסוימות יכולות להפחית את יעילות הטיפול ברינבוק או עלולות להגביר את הסיכון לתופעות לוואי.

- תרופות לטיפול בזיהומים אנטיביוטיים (כגון איטראקונאזול, שטרופטאזול או ווריקונאזול)
- תרופות לטיפול בזיהומים חיידקיים (כגון קלריתרומיצין)
- תרופות לטיפול בתסמונת קושינג' (כגון קטוקונאזול)
- תרופות לטיפול בשחפת (כגון ריפאמפיצין)
- תרופות לטיפול בפרוכוסט או התפקים (כגון פניטואין)
- תרופות המשפיעות על מערכת החיסון שלך (כגון אזאתיופרין, 6-מרקפספורין, זיקלוספורין או טסיקולומבוס)
- תרופות העלולות לגרום לעגלות או הסיכון להתנקבות (פרפוזיה) במערכת העיכול או לדלקת סעיף (דיברטיקוליטיס) כמו תרופות נוגדות דלקת אל סטרואידיות (לרוב משמשות לטיפול בכאב ולא מצבי דלקת של השיירים או המפרקים), ו/או אופיאטידים (לרוב משמשים לטיפול בכאבים עזים), ו/או קורטיקוסטרואידים (לרוב משמשים לטיפול במצבי דלקת)

אם אתה לוקח את אחת מהתרופות מהרשימה מעלה או שאינך בטוח, ספר לרופא או לרוקח שלך לפני נטילת רינבוק.

#### הריון, הנקה ופוריות

הריון

אין להשתמש ברינבוק בזמן הריון.

#### הנקה

אם את מניקה או מתכננת להניק, דברי עם הרופא שלך לפני לקיחת תרופה זו. אין להשתמש ברינבוק בזמן הנקה כיוון שלילאי ידוע אם תרופה זו עוברת לחלב אם. את הרופא שלך תחליטו אם תניקי או תשתמש ברינבוק. אם אתה שניהם.

#### מניעת הריון

אם את אישה היגיל הפוריות, עליך השתמש באמצעי מניעה יעילים כדי להימנע מהריון בזמן נטילת רינבוק ולמשך 4 שבועות לפחות לאחר מנת הרינבוק האחרונה שלך. אם הרת בפרק זמן זה, עליך לפנות מיד לרופא שלך.

אם הילדה שלך קיבלה לראשונה את המחור החודשי בזמן נטילת רינבוק, עליך לעדכן את הרופא.

#### נהיגה ושימוש במכוונת

הריגה אינה השפעה או השעפה מוגבלת על היכולת להגוי ולהשתמש במכוונת.

### 3. כיצד תשתמש בתרופה?

**יש להשתמש בתכשיר תמיד תוך כדי הבטח להוראות הרופא.** עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אתה בנוגע למוינון ואופן הטיפול בתכשיר.

המינון ואופן הטיפול יהיו תלויי בלבוך.

#### דלקת מפרקים שגרונתית, דלקת מפרקים ספחתית או דלקת חוליות מקשחת

המינון המקובל בדרך כלל הוא 15 מ"ג פעם אחת ביום.

#### דלקת עור אטופית

*מבוגרים:*

המינון המקובל בדרך כלל הוא 15 מ"ג או 30 מ"ג פעם אחת ביום, כפי שנרשם על ידי הרופא שלך. הרופא עשוי להחליט אם להעלות או להוריד את המינון שלך בהתאם לפעולת התרופה בגוף.

*קשישים:*

אם אתה בן 65 ומעלה, המינון המקובל בדרך כלל הוא 15 מ"ג פעם אחת ביום.

*מתבגרים (גילאי 17-12) השוקלים לפחות 30 ק"ג:*

המינון המקובל בדרך כלל הוא 15 מ"ג פעם אחת ביום.

#### קוליטיס כיבית

המינון המקובל בדרך כלל הוא 45 מ"ג פעם ביום למשך 8 שבועות. הרופא שלך עשוי להחליט להאריך את המינון ההתחלתי של 45 מ"ג למשך 8 שבועות נוספים (סה"כ 16 שבועות). לאחר מכן המינון המקובל בדרך כלל הוא 15 מ"ג 30 או 45 מ"ג פעם ביום טיפול ארוך טווח. הרופא עשוי להחליט להעלות או להוריד את המינון בהתאם לאופן שבו אתה מגיב לתרופה.

*קשישים:*

אם אתה בן 65 ומעלה, המינון המקובל בדרך כלל הוא 15 מ"ג פעם ביום טיפול ארוך טווח.

הרופא עשוי להחליט להוריד את המינון אם יש לך בעיות בכליות, או שנרשמו לך תרופות מסוימות אחרות.

#### אין לעבור על המנה המומלצת

#### צורת הנטילה

- יש לבלוע את הטבליה בשלמותה עם מים. אין לחצות, לכתוש, לערס או לשבור את הטבליה לפני הבליעה כיוון שזה יכול לשנות את כמות התרופה הנכנסת לגופך
- כדי לעזור לך לזכור לקחת רינבוק, קח אותו כל יום באותו הזמן

- ניתן לקחת את הטבליות עם או ללא מזון
- הימנע מזון או משקה המכילים אשכוליות בזמן שאתה נוטל (או מטופל ב) רינבוק שכן אלו עלולים להגדיל את הסיכוי להפועת תופעות לוואי, על ידי הגדלת כמות התרופה בגופך

**אם נטלת טבעות מינון גבוה יותר** על פנות לרופא שלך. ייתכן שתחווה מספר תופעות לוואי מפורטות בסעיף 4.

אם נטלת מנת יתר או אם טבעות בלע ליד מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא אריות התרופה איתך.

#### אם נסחת טבליות את התרופה

- אם פספסת מנה אחת, קח אותה מיד כשזכורת
- אם נסחת את המנה שלך במשך יום שלם, דלג על המנה שהפסדת וקח רק מנה אחת כרגיל ביום למחרת
- אין לקחת מנה כפולה כדי לפצות על טבליה שנשכחה יש להממיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא.

#### אם אתה מפסיק את נטילת התרופה

אל תפסיק לקחת רינבוק אלא אם הרופא שלך הורה לך להפסיק לקחת אותו.

**אין ליטול תרופות אחרות!** **בדוק תהויות והמנה בכל פעם שהינך נוטל תרופה.** **הרוקח המפסיים אם הינך זקוק להם. אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה זו, היוועץ ברופא או ברוקח.**

#### 4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, המשתמש ברינבוק עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשמת תופעות הלוואי. ייתכן ולא תסבול מאף אחת מהן.

#### תופעות לוואי שכיחות

דבר עם הרופא שלך או פנה מיד לקבלת עזרה רפואית אם אתה חווה סימנים ללשהם של:

- זיהום כגון שלבקת חוגרת או פריחה כואבת על העור עם שלפוחיות (הרפס זוסטר) - תופעות לוואי שכיחות (common) - תופעות שמופיעות ב-10 ל-1 משתמשים מתוך 100
- זיהום בריאות (דלקת ריאות), אשר יכול לגרום לקוצר נשימה, חום ושיעול עם ליחה - תופעות לוואי שאינן שכיחות (uncommon) - תופעות שמופיעות ב-10 ל-1 משתמשים מתוך 1,000
- תגובה אלרגית (לחץ בחזה, צפצופים, נפיחות של השפתיים, הלשון או הגרון, סרפדת) - תופעות לוואי שאינן שכיחות (uncommon) - תופעות שמופיעות ב-10 ל-1 משתמשים מתוך 1,000

#### תופעות לוואי אחרות

דבר עם הרופא שלך אם הבחנת באחת מתופעות הלוואי הבאות:

**תופעות לוואי שכיחות מאוד (very common)** - תופעות שמופיעות ביותר ממשמש אחד מעשרה

- זיהומים בגרון ובאף
- אקנה

#### תופעות לוואי שכיחות (common) - תופעות שמופיעות ב-10 ל-1 משתמשים מתוך 100

- שיעול
- חום
- פצעי קור (הרפס סימפלקס)
- בחילה
- עלייה ברמת אנזים אשר נקרא קראטין קינאז, הנראית בבדיקות דם
- ספירת תאי דם לבנים נמוכה, הנראית בבדיקות דם
- עלייה ברמות כולסטרול (סוג של שומן בדם) כפי שנראה בבדיקות
- עלייה ברמות אנזימי הכבד, הנראית בבדיקות דם (סימן לבעיות כבד)
- עלייה במשקל
- דלקת (נפיחות) של זקיקי השיער
- שפעת
- אנמיה
- כאבים בבטן
- עייפות (תחושת עייפות בלתי רגילה וחולשה)
- כאב ראש
- סרפדת (אורטיקריה)
- זיהום בדרכי השתן
- פריחה

**תופעות לוואי שאינן שכיחות (uncommon)** - תופעות שמופיעות ב-10 ל-1 משתמשים מתוך 1,000

- פטרת הפה (כתמים לבנים בפה)
- עלייה ברמות טריגליצרידים (סוג של שומן) בדם כפי שנראה בבדיקות
- דלקת הסעיף (דיברטיקוליטיס, התפתחות דלקת כואבת בכיסים קטנים שנוצרים בדופן המעי שלך)

**אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מוזממירה או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צוינה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.**

#### דיוח תופעות לוואי

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיוח על תופעות לוואי עקב טיפול בתרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או על ידי כניסה לקישור:

<https://sideeffects.health.gov.il/>

### 5. אין לאחסן את התרופה?

- מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה החיצונית והבליסטר. אחרי התפוגה מתייחס ליום מתווע האחרון של חודש

- עבור רינבוק 15 מ"ג ורינבוק 30 מ"ג

- יש לאחסן בטמפרטורה עד 30°C

- עבור רינבוק 45 מ"ג

- אין תנאי אחסון מיוחדים. מומלץ לשמור בטמפרטורת החדר
- יש לאחסן בבליסטור המקורי כדי להגן מלחות

אין להשליך תרופות כלשהן דרך הביוב או האשפה הביתית. שאל את הרוקח שלך כיצד להשליך תרופות אשר אינך משתמש בהן יותר. אמצעים אלו יעזרו לשמור על הסביבה

### 6. מידע נוסף

#### מה מכיל רינבוק

נוסף על המרכיב הפעיל התרופה מכילה גם:

רינבוק 15 מ"ג טבליות לשחרור ממושך

ליבת הטבליה:

microcrystalline cellulose, mannitol, hypromellose, tartaric acid (powdered), magnesium stearate, silica colloidal anhydrous/colloidal silicon dioxide

ציפוי הפילם:

polyvinyl alcohol, macrogol/polyethylene glycol, talc, titanium dioxide (E171), black iron oxide (E172)/ferrosoferric oxide, iron oxide red (E172)

רינבוק 30 מ"ג טבליות לשחרור ממושך

ליבת הטבליה:

microcrystalline cellulose, mannitol, hypromellose, tartaric acid (powdered), magnesium stearate, silica colloidal anhydrous/colloidal silicon dioxide

ציפוי הפילם:

polyvinyl alcohol, macrogol/polyethylene glycol, talc, titanium dioxide (E171), iron oxide red (E172)

רינבוק 45 מ"ג טבליות לשחרור ממושך