

پارامول

حبسولات، 500 ملغ

تحتوي كل حبسولة على پاراسيتامول (Paracetamol) 500 ملغ. المواد الفعالة والمسببة للحساسية في الدواء - انظر البند 6 "معلومات إضافية" والبند 2 "معلومات هامة عن قسم من مركبات الدواء".

إن نشرة البامعان حتى نهايتها قبل استعمال الدواء، تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا كانت لديك أسئلة إضافية، توجه للطبيب أو الصيدلي.

يعمل هذا الدواء (بتسويق عام) من دون حاجة لوصفة طبيب ومخصص للبالغين. عليك تناول الدواء حسب التعليمات في البند 3 "كيفية استعمال الدواء". في هذه النشرة، استشر الصيدلي إذا كنت بحاجة لمعلومات إضافية.

يجب مراجعة الطبيب إذا استمرت السخونة لأكثر من 3 أيام أو إذا تفاقمت الأعراض أو لم تتحسن في غضون 5 أيام على الرغم من استعمال الدواء.

1. لأي غرض مخصص الدواء؟
الدواء مخصص لتسكين الآلام وتخفيف السخونة الناتجة عن أسباب مختلفة. من مصادر الآلام الأسنان، زكام، انفلونزا، آلام روماتيزمية والآلام الدورة الشهرية (الطمث).

الفصيلة العلاجية: مسكن للآلام وخافض للسخونة.

2. قبل استعمال الدواء

لا يجوز استعمال الدواء إذا:

- كنت حساساً (أرجح) للمادة الفعالة (پاراسيتامول) أو لكل واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء (انظر البند 6).

تحذيرات خاصة بتناول پاراسيتامول
إذا تطورت لديك في الماضي أعراض جانبية جلدية نتيجة تناول مستحضرات تحتوي على پاراسيتامول، فلا يجوز تناول مستحضرات تحتوي على پاراسيتامول، كي لا تحدث ثانية أعراض جلدية وخيمة.

يحتوي المستحضر على پاراسيتامول الذي قد يسبب الضرر للكبد عندما يعطى بجرعة عن عمد. بها أو لفترة طويلة. سبب الوضوءات التحولية خلال فترة العلاج.

قد تتناول أدوية إضافية التي تؤثر على عمل الكبد.

لا يجوز استعمال هذا الدواء لفترات متقاربة بدون استشارة الطبيب. لا يجوز تناول أدوية إضافية تخفيف السخونة وتسكين الآلام، أو أدوية للزكام بدون استشارة طبيب أو صيدلي لمنع تولد الجرعة أو تسمم بالپاراسيتامول.

- لا يجوز تناول أدوية إضافية من عائلة پارامول والى مستحضرات إضافية تحتوي على پاراسيتامول.
- يجب تجنب تناول جرعة عالية (بالحد الموصى به) من هذا الدواء أثناء الصوم.

احك لطبيبك قبل بدء العلاج إذا كنت تعاني وعانيت في الماضي من: حساسية لعدة من أدوية آيا كان مرض كبد أو خيل أو وظيفة الكبد. خلل في وظيفة الكلى. الإسهال على الكحول. بقران. إذا كنت حاملاً أو مرضعة.

تفايلات بين الأدوية إذا كنت تتناول أو تناولت مؤخراً، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، احك للطبيب أو الصيدلي عن ذلك. بالأخص إذا كنت تتناول:

- أدوية ضد تخثر الدم مثل وارفارين، مستحضرات تنشيط إنتاج الإنزيمات في الكبد (مثل: ريفامبين، باريتوراك).
- أدوية الصرع - فينيتوين، كاربامازيبين.
- مستحضرات مضادات الإتهاب الستيروئيدية.
- ميتوكلوراميد و دومبريدون (لعلاج الغثيان، القيؤات ومشاكل هضم أخرى).
- كلورميفينول (مضاد حيوي).
- بروبانسول (لعلاج القرص).
- كورستروامين (لتخفيف فرط دهنيات الدم).

استعمال الدواء واستهلاك الكحول
لا يجوز شرب المشروبات الكحولية خلال فترة العلاج بپاراسيتامول بسبب زيادة الإختطار لحوث ضرر في الكبد.

الحمل والإرضاع
إذا كنت حاملاً أو مرضعة يجب استشارة الطبيب قبل بدء استعمال الدواء.

الحملي:
يجب تناول الجرعة الأدنى الفعالة لديك لتسكين الآلام والى تخفيف السخونة للفترة الزمنية الأقصر الممكنة. استسيري طبيبك إذا لم تطرأ تحسن في الآلام أو في السخونة أو إذا كنت بحاجة لتناول الدواء لفترات متقاربة أكثر الإرضاع.
كميات قليلة من پاراسيتامول تمر عبر حليب الأم. يجب استشارة الطبيب قبل الاستعمال.

السيافة واستعمال الآلات
پاراسيتامول لا يؤثر على القدرة على السياقة أو استعمال الآلات.

الأطفال
هذا الدواء بتسويق عام مخصص للبالغين، انظر البند 3.

معلومات هامة عن قسم من مركبات
يحتوي هذا الدواء على پاراسيتامول (Paracetamol) 500 ملغ، FCF aluminum lake الذي من شأنه أن يسبب رد فعل أرجية. يحتوي هذا الدواء على أقل من 1

ميليمول (23 ملغ) صوديوم الحسولة، أي أنها فعلياً "خالية من الصوديوم".

3. كيفية استعمال الدواء؟

عليك التأكد من الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكدًا من الجرعة وطريقة العلاج بالدواء.

في غياب توصية من الطبيب فإن الجرعة الموصى بها بشكل عام هي: البالغون: 1-2 حبسولات كل 4-6 ساعات حسب الحاجة. لا يجوز تجاوز جرعة 500 حبسولات يوميًا. لا يجوز تجاوز الجرعة الموصى بها. عليك التوجه للطبيب إذا استمرت السخونة لأكثر من 3 أيام أو إذا تفاقمت أو لم تتحسن الأعراض في غضون 5 أيام على الرغم من استعمال الدواء.

طريقة تناول:

يجب بلع الدواء مع القليل من الماء. يسمح بضمير الحبسولات. لا توجد معلومات بالنسبة للمضع أو المسق.

إذا تناولت بالخطأ جرعة زائدة إذا تناولت بالخطأ جرعة مفرطة أو إذا تناولت طوك من الدواء عن طريق الخطأ توجه فوراً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى واحضر عبوة الدواء معك. لا تسبب القيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب. حتى لو كان شعورك جيداً العلاج ضروري بسبب إختطار تطور ضرر وخيم للكبد. أعراض جانبية من الممكن أن تكون غثيان وقيؤات، إسهال، فقدان الشهية، الآم في البطن، انتفاخ، تعرق زائد، ألم أو حساسية في الجزء العلوي من البطن ومن الجائز أنها لا تمكن الضرر الحاصل للكبد.

لا يجوز تناول أدوية في الظلام! تحقق من المصنق والجرعة في كل مرة تتناول فيها دواء. عرج النظارات الطبية إذا كنت بحاجة إليها. استعمال الدواء، استشر الطبيب أو الصيدلي.

4. الأعراض الجانبية

كما هو الحال مع أي دواء، استعمال پارامول قد يسبب أعراضاً جانبية مثل الدوار، لدى بعض الأشخاص. لا تفرغ من قراءة قائمة الأعراض الجانبية. من الممكن أن لا تعاني من أي واحد منها. الأعراض الجانبية قد تكون وخيمة أكثر لدى المسنين.

أعراض جانبية وخيمة:
يجب التوقف عن الاستعمال ومراجعة الطبيب حالاً عند ظهور:

- ردود فعل أرجية وخيمة مثل طفح وحكة، انتفاخ الوجه، الطفح، التؤان، الحجدرة التي من الممكن أن تؤدي لصعوبة في التنفس أو الفلج، انتفاخ الأطراف.
- في حالات نادرة، أمراض جلد وخيمة التي من الممكن أن تكون أعراضها: إجمار، طفح، حويصلات، إصابة جلدية واسعة.
- قد تظهر أعراض جانبية جلدية وخيمة حتى لو تناولت في الماضي مستحضرات التي تحتوي على المركب الفعال پاراسيتامول بدون مشكل.
- إذا ظهرت عوارض جانبية جلدية،

- يجب إيقاف العلاج ومراجعة الطبيب حالاً.
- علامات تغيرات في جهاز الهضم مثل: انزفة، ظهور كدمات بسهولة.
- تطور الأتهابات بسهولة أكبر نتيجة إختفاض شديد بعدد خلايا الدم البيضاء.
- ضيق تنفس (نادر).

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقم أحد أعراض الجانبي أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يذكر في النشرة، عليك استشارة الطبيب.

التبليغ عن أعراض جانبية

يمكن تبليغ وزارة الصحة عن أعراض جانبية من خلال الضغط على الرابط "تواصل مع توفפות لواء عكب سبيل تروفوت" الموجود على الصفحة الرئيسية في موقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يوجه إلى الإستشارة الإلكترونية للتبليغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق دخول الرابط:

<https://sideeffects.health.gov.il>

5. كيفية تخزين الدواء؟

تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي ومجال رؤية الأطفال والرضع وهكذا. تمنع التسمم. لا تسبب القيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب. لا يجوز استعمال الدواء بعد تاريخ انتهائه الصلاحية (التاريخ المتواجده الظاهر على العبوة). تاريخ انتهاء الصلاحية يرجع إلى اليوم الأخير من نفس الشهر. شروط التخزين: لا يجوز التخزين فوق 25°C.

6. معلومات إضافية

بالإضافة إلى المركب الفعال يحتوي الدواء أيضاً على:

Povidone, hypromellose, titanium dioxide (E171), croscarmellose sodium, magnesium stearate, macrogol, quinoline yellow aluminum lake (E104), sunset yellow FCF aluminum lake (E110), carnauba wax

كيف يبدو الدواء وما هو محتو

العبوة:
حبسولة مطولة باللون الأصفر مع خط للنظر من كلا الطرفين.

أحجام العبوات المصنق عليها (بتسويق عام): 16, 8 حبسولة. قد لا تكون جميع أحجام العبوات مسوقة.

زادت النتيج في آذار 2023 وفقاً لتعليمات وزارة الصحة.
رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الحكومي هي وزارة الصحة: 00-30764-00/17-96-96
للتبسيط وتسهيل القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بعبارة المذكر بالرغم من ذلك، الدواء مخصص لكلا الجنسين.

المنتج وصاحب التسجيل: بيسل مرض، شارع بيسل 1، اور عيفا 3060000، إسرائيل

Paramol Caps 500 mg GSL PIL PB0423-07