עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו – 1986
התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד

סקיירידי™ 360 מ"ג
תמיסה להזרקה במחסנית מוכנה לשימוש

החומר הפעיל וריכוזו:
כל מחסנית מוכנה לשימוש מכילה ריאזאקיומאב 360 מ"ג ב-2.4 מ"ל תמיסה (150 מ"ג/1מ"ל)
Risanekizumab 360 mg/2.4 ml (150 mg/1 ml)

לרשימת חומרים בלתי פעילים ואלרגנים, אנא ראה סעיף 6 "מידע נוסף" בעלון זה.

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע חמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.
תרופה זו נרשמה לטיפול עבורך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מצבם הרפואי דומה.

1. למה מיועדת התרופה?

סקיירידי מיועדת לטיפול במטופלים מגיל 16 שנים ומעלה עם מחלת קרוהן פעילה בדרגה בינונית עד חמורה, אשר חוו תגובה לא מספקת, אובדן תגובה, או אי סבילות לטיפול קונבנציונלי או ביולוגי קודם, או אם טיפולים אלו אינם מומלצים.

קבוצה תרפויטית:
מדכאי מערכת החיסון, מעכבי אינטרלוקין.
סקיירידי פועלת על ידי חסימת חלבון בגוף המכונה 'IL-23', אשר גורם לדלקת.
מחלת קרוהן היא מחלה דלקתית של מערכת העיכול. אם יש לך מחלת קרוהן פעילה, תחילה תקבל תרופות אחרות. אם תרופות אלו אינן משפיעות באופן מספק, תקבל סקיירידי לטיפול במחלת הקרוהן שלך.
סקיירידי מפחיתה את הדלקת ולכן יכולה לעזור להפחית את הסימנים והתסמינים של המחלה שלך.

2. לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה אם:
- אתה רגיש (אלרג) לריאזאקיומאב או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה תרופה זו (מפורטים בסעיף 6).
- יש לך זיהום, כולל שחפת פעילה, שלדעת הרופא שלך הינו משמעותי.

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה
לפני הטיפול ובמהלך השימוש בסקיירידי ספר לרופא אם:
- יש לך זיהום כעת או אם אתה סובל מזיהומים חוזרים.
- יש לך שחפת (TB)
- קיבלת לאחרונה או שאתה מתכנן לקבל חיסון. עליך להימנע מקבלת חיסונים מסוגים מסוימים במהלך השימוש בסקיירידי.

תגובות אלרגיות
ספר לרופא שלך או פנה מיד לעזרה רפואית אם אתה מבחין באחד מהסימנים של תגובה אלרגית במהלך השימוש בסקיירידי, כגון
- קושי בשימה או בבליעה
- נפיחות של הפנים, השפתיים, הלשון או הגרון
- גרד חמור של העור, המלווה בפריחה אדומה או בנגעי עור מורמים

ילדים ומתבגרים
סקיירידי אינה מיועדת עבור ילדים ומתבגרים מתחת לגיל 16 שנים. לא קיים מידע לגבי בטיחות ויעילות השימוש בסקיירידי עבור ילדים ומתבגרים מתחת לגיל 16.

אינטראקציות/תגובות בין תרופתיות
אם אתה נוקח, או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח. במיוחד אם קיבלת לאחרונה או אתה עומד לקבל חיסון. עליך להימנע מקבלת חיסונים מסוגים מסוימים במהלך השימוש בסקיירידי.
אם אינך בטוח, שוחח עם הרופא. הרוקח או האחות שלך לפני ובמהלך השימוש בסקיירידי.

הריון, הנקה ופוריות
אם הינך אישה בגיל הפוריות, עליך להשתמש באמצעי מניעה במהלך השימוש בתרופה זו, ובמשך 21 שבועות לפחות לאחר המנה האחרונה של סקיירידי.
לא קיים מידע מספק בנוגע לשימוש בסקיירידי בהריון; ועל כן, כאמצעי זהירות, מומלץ להימנע מהשימוש בתרופה במהלך ההריון.
לא ידוע אם סקיירידי מופרשת לחלב אם. ספרי לרופא שלך אם הינך מניקה או מתכננת להניק לפני השימוש בתרופה זו.

נהיגה ושימוש במכונות
סקיירידי לא עפיה להשפיע או עפויה להשפיע באופן זנית על הנהיגה שלך והשימוש במכונות.

סקיירידי מכילה נתרן
תרופה זו מכילה פחות מ- 1 מילימול נתרן (23 מ"ג) בכל מחסנית, כלומר למעשה היא 'נטולת נתרן'.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

יש להשתמש בתרופה תמיד בהתאם להוראות הרופא.
עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתרופה.
תרופה זו ניתנת בזריקה מתחת לעור (נקראת 'הזרקה תת-עורית').
המינון ואופן הטיפול יקבע על ידי הרופא בלבד. המינון המקובל בדרך כלל:
אתה תתחיל את הטיפול בסקיירידי עם מנה התחלתית שתינתן על ידי הרופא שלך או האחות דרך עירוי בזרוע שלך (עירוי תוך-ורידי).

מינונים התחלתיים

	כמה?	מתי?
מינונים התחלתיים	600 מ"ג	מתי שהרופא שלך אמר לך
	600 מ"ג	4 שבועות אחרי המנה ה- 1
	600 מ"ג	4 שבועות אחרי המנה ה- 2

לאחר מכן, אתה תקבל סקיירידי 360 מ"ג כזריקה מתחת לעור שלך.

מינוני אחזקה

	כמה?	מתי?
מנת אחזקה ראשונה	360 מ"ג	4 שבועות לאחר מנת ההתחלה האחרונה (בשבוע 12)
עוד מנות	360 מ"ג	כל 8 שבועות, החל לאחר המתן של מנת האחזקה הראשונה

אתה והרופא, הרוקח או האחות שלך תחליטו האם אתה אמור להזריק תרופה זו בעצמך. אל תזריק לעצמך תרופה זו עד שתקבל הדרכה מהרופא, הרוקח או האחות שלך. גם מטפל יכול להזריק לך אחרי הדרכה מתאימה.

אין לעבור על המנה המומלצת.
עיין בסעיף 7 "הוראות שימוש" בסוף עלון זה לפני שתזריק לעצמך סקיירידי.

אם הזרקת בטעות מינון גבוה יותר
אם בטעות הזרקת יותר סקיירידי ממה שהיית צריך או שהמנה ניתנה במועד מוקדם יותר מזה אשר נקבע על פי מרשם רופא או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא אריזת התרופה החיצונית איתך.

אם שכחת להזריק סקיירידי
אם שכחת להזריק סקיירידי, עליך להזריק מנה מיד כשנזכרת. שוחח עם הרופא שלך אם אינך בטוח בנוגע למה עליך לעשות.
יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא.
גם אם חל שיפור במצב בריאותך, אין להפסיק הטיפול בתרופה ללא התייעצות עם הרופא.

אם אתה מפסיק להשתמש בסקיירידי
אין להפסיק להשתמש בסקיירידי ללא התייעצות תחילה עם הרופא. אם תפסיק את הטיפול, התסמינים שלך עלולים לחזור.

אין לדלג תרופות בתוך! בדוק התווית והמנה בכל פעם שאתה נוטל תרופה. הרכב משקפיים
אם אתה זקוק להם.
אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בסקיירידי עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. ייתכן ולא תסבול מאף אחת מהן.

תופעות לוואי חמורות
עליך לשוחח עם הרופא אם לפנות לעזרה רפואית באופן מיידי אם יש לך תסמינים של זיהום חמור, כגון:
- חום, תסמינים דמויי שפעת, הזעות ליליה
- תחושת עייפות או קוצר נשימה, שיעול שאינו חולף
- עור חם, אדום וכואב, או פריחה כואבת בעור עם שלפוחיות

הרופא שלך יחליט אם תוכל להמשיך להשתמש בסקיירידי.

תופעות לוואי נוספות
ספר לרופא שלך אם מופיעה אחת מתופעות הלוואי הבאות:

תופעות לוואי שכיחות מאוד (very common) (תופעות שמופיעות ביותר ממשתמש 1 מתוך 10):
- זיהומים במערכת הנשימה העליונה המלווים בתסמינים כגון כאב גרון וגודש באף

תופעות לוואי שכיחות (common) (תופעות שמופיעות ב- 1-10 משתמשים מתוך 100):
- תחושת עייפות
- זיהום סנרייתי בעור
- תגובות במקום ההזרקה (כגון אדמומיות או כאב)
- גרד
- כאב ראש

תופעות לוואי שאינן שכיחות (uncommon) (תופעות שמופיעות ב- 1-10 משתמשים מתוך 1,000):
- בליטות קטנות, אדומות ומורמות על העור

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צוינה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

דיווח תופעת לוואי
ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעי מניעה בהתאם להנחיה "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il)
המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או ע"י כניסה לקישור:
https://sideeffects.health.gov.il

5. איך לאחסן את התרופה?

- מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים ואו תינוקות ועל-מי כך תמנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מרוקח.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גב תווית המחסנית המוכנה לשימוש ואריזת הקרטון החיצונית. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.
- תנאי אחסון: יש לאחסן במקרר (2°C-8°C). אין להקפיא.
- יש לשמור את המחסנית המוכנה לשימוש באריזת הקרטון המקורית על מנת להגן מאור.
- אין להשתמש בתרופה זו אם הנוזל עכור או מכיל פתיתים או חלקיקים גדולים.
- אין להשליך תרופות לביוב או לפח אשפה ביתי. שאל את הרוקח שלך כיצד להשליך תרופות שאינן עוד בשימוש. אמצעים אלו יסייעו להגן על הסביבה.

6. מידע נוסף

- **מה סקיירידי מכילה**
  נוסף על החומר הפעיל, התרופה מכילה גם:
  Trehalose dihydrate, sodium acetate trihydrate, polysorbate 20, acetic acid glacial and water for injection.
- **כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה**
  סקיירידי היא נוזל צלול וחסר צבע עד צהוב הנמצא בתוך מחסנית מוכנה לשימוש. הנוזל עלול להכיל חלקיקים עיריים בצבע לבן או שקוף.
  כל אריזה מכילה 1 מחסנית מוכנה לשימוש 1- 1 באיבר הזרקה צמוד גוף.
- **בעל הרישום וכתובתו:** אבווי ביופארמה בע"מ, הרחש 4, הוד השרון, ישראל.
- **שם היצרן וכתובתו:** אבווי בע"מ, דרך וואוקגן 1N, צפון שיקגו, אילנוי 60064, ארה"ב
- **עלון זה נבדק ואושר על ידי משרד הבריאות בפברואר 2023.**
- **מספר רישום התרופה בפנקס התרופות המלכתי במשרד הבריאות: 172-09-37477**

abbvie care with you

למידע נוסף ולמקוד תוכנית המתיכה התקשרו 6718*

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.

7. הוראות שימוש

אנא קרא את סעיף 7 במלואו לפני השימוש בסקיירידי
סקיירידי אביזר הזרקה צמוד גוף (אביזר ההזרקה)
מראה קדמי

מראה אחורי



מראה צידי

מחסנית מוכנה לשימוש



מידע חשוב שעליך לדעת לפני שתזריק סקיירידי
- יש לאחסן במקרר (2°C-8°C). אין להקפיא.
- יש לשמור את המחסנית באריזת הקרטון המקורית על מנת להגן מפני אור.
- עליך לקבל הדרכה כיצד להזריק סקיירידי לפני מתן הזריקה. שוחח עם הרופא, הרוקח או האחות שלך אם אתה זקוק לסיוע.
- יש לסמן על גבי לוח השנה שלך את התאריכים, כך שתדע מתי להזריק סקיירידי
- אביזר ההזרקה לשימוש חד פעמי תוכנן לשימוש עם מחסנית סקיירידי בלבד
- יש לשמור את סקיירידי באריזת הקרטון המקורית על מנת להגן על התרופה מפני אור עד למועד השימוש
- יש להוציא את אריזת הקרטון מהמקרר ולהשאיר אותה בטמפרטורת החדר, הרחק מאור שמש ישיר, למשך לפחות **45 עד 90 דקות** לפני ההזרקה
- **אין** לאפשר לאביזר ההזרקה להרטיב במים או בכל נוזל אחר
- **אין** לגעת בלחצן ההתחלה עד שתמקם את אביזר ההזרקה לשהוא טעון עם מחסנית על גבי העור שלך ואתה מוכן להזריק
- ☺ ניתן ללחוץ פעם **אחת** על לחצן ההתחלה
- יש לבצבץ את הפעילות במהלך תהליך ההזרקה. פעילות מתונה יכולה להתבצע, כגון הליכה, השענת יד והתכופפות
- **אין** לעכב את הזרקת התרופה לאחר הטענת המחסנית הנקייה לתוך אביזר ההזרקה. המתנה תייבש את התרופה ולאחר מכן, אביזר ההזרקה לא יעבוד
- **אין** להזריק אם הנוזל בחלון הבדיקה עכור או מכיל פתיתים או חלקיקים גדולים. הנוזל צריך להיראות צלול עד צהוב ועלול להכיל חלקיקים עיריים לבנים או שקופים
- **אין** לנער את אריזת הקרטון, המחסנית או את אביזר ההזרקה
- אם יש לך שאלות כלשהן לגבי השימוש במחסנית או באביזר ההזרקה, שוחח עם הרופא, הרוקח או האחות שלך לסיוע

החזר תרופה זו לבית המרקחת
- אם תאריך התפוגה (EXP) חלף
- אם הנוזל אי פעם קפא (אפילו אם הפשיר)
- אם המחסנית או אביזר ההזרקה נפל או נפגם
- אם אריזת הקרטון אינה שלמה
- אם הכיסוי הלבן של המגשית שבור או חסר

עקוב אחר השלבים מטה בכל פעם שאתה משתמש בסקיירידי

שלב 1 – הכנה

הוצא את אריזת הקרטון במהקרר והשאר אותה בטמפרטורת החדר. הרחק מאור שמש ישיר. המשך **למתוח 45 עד 90 דקות** לפני ההזרקה.
- בדוק את תאריך התפוגה (EXP) שעל אריזת הקרטון. אין להשתמש בסקיירידי אם תאריך התפוגה (EXP) חלף.
- **אין** להוציא את המחסנית את אביזר ההזרקה מהקרטון בעת הנעת סקיירידי לטמפרטורת החדר.
- **אין** לחמם את סקיירידי בכל דרך אחרת, לדוגמה, **אין** לחמם אותו במיקרוגל או במים חמים.



אסוף את כל הציוד ושטוף את ידייך
הנח את הפריטים הבאים על משטח נקי ושטוח
- מגשית פלסטיק המכילה 1 אביזר הזרקה ו- 1 מחסנית
- 2 פדי אלכוהול (לא כלול באריזת הקרטון)
- 1 דוגר צמר גפן או פד גזה (לא כלול באריזת הקרטון)
- מכל מיוחד לפסולת (לא כלול באריזת הקרטון)

שטוף וייבש את ידיך.



הסר את הכיסוי הלבן של המגשית
- אחר את החץ השחור
- קלף את הכיסוי הלבן ממגשית הפלסטיק



הרם את מכסה הפלסטיק
- אחר את הפתח המעוגל הנמצא על המכסה העליון
- הכנס את האצבע המורה בפתח והנח את האגודל שלך על הצד הנגדי
- הרם את המכסה להסרה והנח אותו בצד



בדוק את אביזר ההזרקה
- בדוק שאביזר ההזרקה הינו שלם ואינו פגום
- הדלת האפורה צריכה להיות מעט פתוחה
- אם הדלת האפורה לא נפתחה, לחץ פנימה בחוזקה על חריצי הדלת האפורה (צידה השמאלי של הדלת) ופתח את הדלת
- **אין** לסגור את הדלת האפורה לפני הטענת המחסנית
- **אין** להשתמש באביזר ההזרקה אם הפלת אותו, גילית שחסרים חלקים, או אם הוא פגום
- **אין** לגעת בלחצן ההתחלה האפור עד שאתה מוכן להזריק. ניתן לחזיק עליו פעם אחת בלבד
- **אין** לגעת באזור מכסה המחט או במחט

אם לחצן ההתחלה האפור נלחץ לפני שמיקמת אותו על הגוף שלך, לא ניתן להשתמש באביזר ההזרקה. אם הדבר קרה, שוחח עם הרופא, הרוקח או האחות שלך.

שלב 2 – מקם את אביזר ההזרקה

פתח את הדלת האפורה במלואה
- אחר את הדלת האפורה לאחור מכסה המחט בחלק האחורי של אביזר ההזרקה. המחט נמצאת מאחורי מגן המחט
- פתח את הדלת האפורה עד הסוף לימין
- אם הדלת האפורה אינה נפתחת, לחץ פנימה בחוזקה על חריצי הדלת האפורה (צידה השמאלי של הדלת) ופתח את הדלת
- **אין** לסגור את הדלת האפורה לפני הטענת המחסנית

הנח את אביזר ההזרקה בצד.



בדוק את המחסנית
הוצא את המחסנית המחסנית ממגשית הפלסטיק.
- אין לסובב או להסיר את החלק העליון של המחסנית

בדוק את המחסנית
- הנוזל צריך להראות צלול עד צהוב ועלול להכיל חלקיקים עיריים לבנים או שקופים. זה תקין לראות בועה אחת או יותר
- **אין** להשתמש אם הנוזל עכור, שינה צבע, או מכיל פתיתים או חלקיקים גדולים
- חלקי המחסנית והפלסטיק השקוף אינם סדוקים או שבורים
- **אין** להשתמש אם הנוזל קפא (אפילו אם הפשיר).
- **אין** להשתמש במחסנית אם הפלת אותה, גילת שחסרים חלקים, או אם היא פגומה.





נקה את הקצה התחתון הקטן יותר של המחסנית
אחר את הקצה התחתון הקטן יותר של המחסנית
- נקה את הקצה התחתון הקטן יותר של המחסנית עם פד אלכוהול. הקפד לשחרר פד אלכוהול לקנות את המרכז של הקצה התחתון הקטן יותר של המחסנית
- **אין** לגעת בקצה התחתון הקטן יותר של המחסנית לאחר הניקוי



הטען את המחסנית הנקייה לתוך אביזר ההזרקה
- **אין** לסובב או להסיר את החלק העליון של המחסנית
- הכנס תחילה את הקצה התחתון הקטן יותר של המחסנית לתוך אביזר ההזרקה
- דחוף מטה בחוזקה את החלק העליון של המחסנית, עד שתשמע "קליק"
- לאחר הטענת המחסנית, אתה עלול לראות מספר טיפות של תרופה בחלק האחורי של אביזר ההזרקה. זה תקין

הקפד להתקדם לשלב הבא ללא עיכוב. המתנה תגרום להתייבשות התרופה.



סגור את הדלת האפורה
דחוף את הדלת האפורה שמאלה, ואז, לחץ בחוזקה והקשב עד שהדלת האפורה תיסגר ב"נקישה".
- הדלת האפורה צריכה להישאר נעולה לאחר הטענת המחסנית
- **אין** לסגור את הדלת האפורה אם המחסנית לא הוכנסה במלואה או חסרה
- המשך ללא עיכוב לשלב הבא

שלב 3 – הכנה להזרקה



בחר נקה את מקום ההזרקה שלך
בחר מתוך 3 אוזרים אלו כדי להזריק:
- החלק הקדמי של ירך שמאל
- החלק הקדמי של ירך ימין
- הבטן שלך, 5 ס"מ לפחות מהטבור שלך

אין להוריק לתוך אוזרים של עור המתקפלים או בולטים באופן טבעי, בגלל שאביזר ההזרקה עלול ליפול במהלך ההזרקה.

לפני ההזרקה, נגב עם פד אלכוהול בתנועה מעגלית את המקום שבו תזריק.
- **אין** לגעת או לנשוף על מקום ההזרקה לאחר שנוקית אותו. יש לתת לעור להתייבש טרם מיקום אביזר ההזרקה על העור
- **אין** להזריק דרך בגדים
- **אין** להזריק לעור פצוע, חבול, אדום, קשה, מצולק, או בעל סימני מתיחה, שמנתת או עם שיער יתר. אתה יכול לקצוץ/לגלח את השיער המיותר ממקום ההזרקה



קלף את שתי השלוניות כדי לחשוף את המדבקה
הפוך את אביזר ההזרקה כדי לאתר את שתי לשוניות המשיכה הירוקות.
- הימנע מלגעת במכסה המחט (המחט בפנים)

קלף את היחידה הגדולה תוך שימוש בלשונית המשיכה הירוקה כדי לחשוף את המדבקה

קלף את היחידה הקטנה תוך שימוש בלשונית המשיכה הירוקה כדי לחשוף את המדבקה. פעולה זו תסיר את רצועת הפלסטיק השקופה, שמפעילה את אביזר ההזרקה.
- בדוק את נורית המצב כאשר אביזר ההזרקה מצופץ
- נורית המצב תהבהב בכחול כאשר אביזר ההזרקה מופעל
- אם נורית המצב אינה מהבהבת בכחול, יש להתקשר למוקד תוכנית התמיכה של אבווי קר 6718* לסיוע
- **אין** לוחץ על לחצן התחלה האפור עדיין
- **אין** לגעת במכסה המחט או במחט
- **אין** למשוך את חומר הדבק מאביזר ההזרקה או לאפשר לצד הדביק להתקפל ולהידבק לעצמו

יש למקם את סקיירידי אביזר ההזרקה על העור ולהתחיל בהזרקה תוך 30 דקות לאחר הסרת לשוניות המשיכה הירוקות, אחרת הוא לא יעבוד. הקפד להמשיך לשלב הבא ללא עיכוב.

אם נורית המצב מהבהבת באדום, אביזר ההזרקה אינו עובד כראוי. אין להמשיך להשתמש בו.
יש להתקשר למוקד תוכנית התמיכה של אבווי קר 6718* לסיוע.
אם אביזר ההזרקה מחובר לגוף, הסר אותו בזהירות מהעור.



הכן את אביזר ההזרקה להצמדה
- עבור הבטן, הזז והחזק את העור כדי ליצור משטח מצפץ ושטוח להזרקה לפחות 5 ס"מ מהטבור שלך. הקפד לשבת זקוף כדי למנוע קפלים ובליטות בעור.
- אין צורך למשוך את העור כדי לשטח אותו לעבר החלק הקדמי של הירך המשאלית את הירך הימנית.

הקפד למקם את אביזר ההזרקה כך שתוכל לראות את נורית המצב הכחולה.



הנח את אביזר ההזרקה על העור שלך
- כאשר האור הכחול מהבהב, אביזר ההזרקה מוכן. הנח את אביזר ההזרקה על עור נקי כשנורית המצב גלויה
- **אין** לחנים את אביזר ההזרקה על בגדים. יש להניח על עור חשוף בלבד
- העבר את האצבע שלך סביב החומר הדביק כדי להצמיד אותו
- **אין** להזיז או לכוונן את אביזר ההזרקה לאחר שהוא הודבק על העור שלך

המשך לשלב הבא ללא עיכוב.

שלב 4 – הזרקת סקיירידי



התחל בהזרקה
- לחץ בהזרקה על לחצן ההתחלה האפור ושחרר
- אתה תשמע "קליק" וייתכן שתחוש בצביטת מחט
- בדוק את נורית המצב כאשר אביזר ההזרקה מצפצף
- לאחר התחלת ההזרקה, נורית המצב תהבהב בירוק ללא הפסקה
- לאחר התחלת ההזרקה, אתה תשמע צלילי שאיבה כאשר אביזר ההזרקה מספק את התרופה
- במהלך ההזרקה ניתן לבצע פעילויות מתונות, כגון הליכה, השטת יד והתכופפות.

אין להמשיך להשתמש באביזר ההזרקה אם נורית המצב מהבהבת באדום. אם נורית המצב מהבהבת באדום הסר את אביזר ההזרקה בזהירות מהעור. אם זה קורה, יש להתקשר למוקד תוכנית התמיכה של אבווי קר 6718*.



המתן לסיום ההזרקה
- ייתכן שדרשו עד 5 דקות להשלמת מנה מלאה לעור התרופה. אביזר ההזרקה יפסיק אוטומטית כאשר ההזרקה מסתיימת
- במהלך ההזרקה נורית המצב תמשיך להבהב בירוק
- במהלך ההזרקה אתה תשמע צלילי שאיבה כאשר אביזר ההזרקה מספק את התרופה
- במהלך ההזרקה ניתן לבצע פעילויות מתונות, כגון הליכה, השטת יד והתכופפות.

אין להמשיך להשתמש באביזר ההזרקה אם נורית המצב מהבהבת באדום. אם נורית המצב מהבהבת באדום הסר את אביזר ההזרקה בזהירות מהעור. אם זה קורה יש להתקשר למוקד תוכנית התמיכה של אבווי קר 6718*.



ההזרקה הסתיימה כאשר
- אביזר ההזרקה מפסיק מצפצפ
- אתה שומע צפצוף נורית המצב משתנה לירוק קבוע. אם נורית המצב השתנתה לירוק קבוע, המשעמות היא שההזרקה הסתיימה



הסר את אביזר ההזרקה
- **אין** להניח את האצבעות על הצד האחורי של אביזר ההזרקה בעת הסרתו מהעור
- בסיום ההזרקה, תפוס בפינת המדבקה כדי לקלף בזהירות את אביזר ההזרקה מהעור
- הימנע מלגעת בכיסוי המחט או במחט בחלק האחורי של אביזר ההזרקה
- לאחר הסרת אביזר ההזרקה, תשמע מספר צפצופים ונורית המצב תיכבה
- כיסוי המחט יכסה את המחט כאשר אביזר ההזרקה יורד מהעור
- זה תקין לראות כמה טיפות קטנות של נוזל על העור לאחר הסרת אביזר ההזרקה
- לחץ כדור צמר גפן או פד גזה על מקום ההזרקה בעור והחזק למשך 10 שניות
- **אין** לשפשף את מקום ההזרקה
- דימום קל במקום ההזרקה הוא תקין

המשך לשלב הבא.

שלב 5 – סיום



בדוק את אביזר ההזרקה
בדוק את חלון התרופה ואת נורית המצב.
בדוק וראה שבובוכנה הלבנה ממלאת את חלון התרופה והנורית הירוקה הקבועה נכבתה, אלו מאפשרים לך לדעת שכל התרופה הוזרקה.
- אם הבובוכנה הלבנה אינה ממלאת את החלון, התקשר למוקד תוכנית התמיכה של אבווי קר 6718*.

השלכה למיכל מיוחד
השלך את אביזר ההזרקה המשומש למכל לפסולת מיוחדת מיד לאחר השימוש.
- אביזר ההזרקה מכיל סוללות, חלקי אלקטרוניקה ומחט.
- השאר את המחסנית בתוך אביזר ההזרקה.
- **אין** להשליך את אביזר ההזרקה המשומש לאשפה הביתית.
- הרופא, הרוקח או האחות שלך יאמרו לך כיצד להחזיר את המכל לפסולת מיוחדת לאחר שהתמלא.



מידע נוסף
- טווח טמפרטורות ההפעלה של אביזר הזרקה צמוד גוף הוא 18°C ועד 28°C וטווח הלחות היחסית 25% עד 75%
- טווח הגובה הוא מינוס 400 מטר עד 3,200 מטר

מילון מונחים של סמלים

סמל	תיאור הסמל
	שמור יבש
STERILE EO	עבר עיקור על ידי אתילן אוקסיד
	אין לעשות שימוש חוזר
	אין להשתמש אם האריזה פגומה ויש לעיין בהוראות השימוש
	תאריך ייצור
LOT	קוד אצווה
REF	מספר קטלוגי
SN	מספר סידורי
	יש לעיין במדריך הוראות השימוש / חוברת
	מכשיר מסוג BF (אביזר במגע עם המטופל)
MR	MR unsafe – לא בטיחותי לתהודה מגנטית