

סקייריזטM 600 מ"ג**תמייסה מרכזית להכנת תמייסה לעירוי**

החומר הפעיל וריכוזו:

כל בקבוקן מכיל ריזאנקיזומאב 600 מ"ג ב-10 מ"ל
תמייסה מרכזית (60 מ"ג/1 מ"ל)
Risankizumab 600 mg/10 ml (60 mg/1 ml)

לשימוש חומרים בלתי פעילים וארגנינים, אנה ראה סעיף

6 "מידע נסף" בעלון זה.

קרא בעIRON את העלון עד סופו בטרפם תשמש בתורופה.
עלון זה מציין תמציתין על התורופה. אם יש לך שאלות
נוספחות, פונה אל הרופא או הרוקח.
תורפה זו גරשה לטיפול עבורה. אל תעביר אותה לך כי מצבם
היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כך כי מצבם
הרופאי דומה.

1. מה מיעדת התורפה?

סקייריזי מיועד לטיפול בטרופלים מגיל 16 שנים ומעלה
עם מחלת קrhohn פעילה בדרגה בינונית עד חמורה, אשר
חו תובוה מחלת קrhohn בגוף המכוון -IL
משמעותו של מחלת קrhohn הגובה, או אי סיבילות
טיפול קונגניציוני או ביולוגי קודם, או אם טיפולים
אלאים מומלצים.

קבוצה ורפואית:

מדכאי מערכת החיסון, מעכבי אינטראלקין.
סקייריזי פועלת על ידי חסימת חלבון בגוף המכוון -IL
ב-23', אשר גורם לדלקת.

מחלת קrhohn היא מחלה דלקטיבית של מערכת העיכול.
אם יש לך מחלת קrhohn פעילה, תחולח הקבל טיפול תרופה
אחריה. אם תרופה אלו אין משביפות באופן מספק,
תקבל סקייריזי לטיפול במחלת קrhohn שלך.

סקייריזי מפחיתה את הדלקת ולכך יכולת לעזור给你
את הסימנים והסתמים של המחלה שלך.

2. לפני השימוש בתורופה

אין לשמש בתורופה אם:

- אתה רגיש (אלרגי) לריזאנקיזומאב או לכל אחד
מהמרכבים הנוספים אשר מכילה תרופה זו (יפורטים
בסעיף 6).

- יש לך יותרם, כולל שחפת פעילה, שלדעת הרופא
שלך הינו ממשותי.

اذירות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתורופה:

לפני הטיפול ובמהלך השימוש בסקייריזי ספר לרופא

אם:
• יש לך יותרם כתף או אם אתה סובל מזיהומיים חורניים.
• יש לך שחפת (TB).

• קיבלת לאחרונה או שאתה מתכנן לקבל חיסון. עלייך
להימנע מתקבל חיסונים מסוימים במהלך מהלך
השימוש בסקייריזי.

תגובה אלרגית:

ספר לרופא שלך או פנה מיד לעזרה רפואייה בשימוש
בסקিיריזי, כגן, גורם לבלב
בסקিיריזי או בלבול השינה או בלבול
המוח של הגוף, המלווה בפריחה אדומה או בעגוי

עור מורמיים

ילדים ומתבגרים:

סקייריזי אינו מיועד עבור ילדים ומתבגרים מתחלת גיל
16 שנים. לא קיימים מידע לגבי בטיחות ויעילות השימוש
בסקিיריזי עבור ילדים ומתבגרים מתחלת גיל 16.

אינטראקטיות/תגובה בין תרופויות:

אם אתה לווק, או אם לך מחלת קrhohn, תרופה אחרת
כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך
לרופא או לרוקח. במקרה אם קיבלת לאחרונה או אתה
עד מהלך הרווחה, עליך להימנע מהשימוש בסקייריזי.

אם אין בטוחו, שוחח עם הרופא, הרוקח או האחות של
פני ובמהלך השימוש בסקייריזי.

הירון, הנקה ופוריות:

אם הייר אישה בגיל הפוריות, עלייך לשמש בתורופה
מנעה במהלך המenses של גוףך, ובמשך 21 שבועות
לפחתה לאחר המenses של סקייריזי.

לא קיימים מידע בוגר למבוגרים למשך מושגים
על כן, כאמור זורית, ממלץ להימנע מהשימוש בתורופה
במהלך הרווחה.

אם ידוע לך סקייריזי מופרשת לחבל אם. ספרו לרופא
שלך אם הירך מניקה או מתכנתה להניק לפני השימוש
בתורופה זו.

הגעה ונשיות המכונות:

סקייריזי לא צפוי להשפיע או צפוי להשפיע באופן
גוני על הנשימה שלך והשימוש המכונות.

סקייריזי מכילה נתרן:

תורפה זו מכילה מ-1 מילימול נתרן (23 מ"ג) בכל
בקבוקן, ככלומר למעשיה היא י'טולת נתרן'.

3. כיצד תשמש בתורופה?

יש לשמש בתורופה תמיד בהתאם להוראות הרופא.
עליך לבדוק אם הרופא או הרוקח אם אין בטוח בוועג
למיןון ואופן הטיפול בתורופה.

המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד. המינון
המקובל בדרך כלל:

אתה תחיל את הטיפול בסקייריזי עם מנת דrink וזרוע
ששתוון על ידי הרופא או האחות של דrink וזרוע
שלך (ערורי תוך-ורדי).

מינונים התחלתיים:

כמות?	מתי?	מינונים התחלתיים
600 מ"ג	מתי שהרופא שלך אומר לך	
600 מ"ג	שבועות אחרי המנה – 1	
600 מ"ג	שבועות אחרי המנה – 2	

לאחר מכן, אתה תקבל סקייריזי 360 מ"ג כוריקת מתחת
לעור שלך. ראה עלון לזר肯 של סקייריזי 360 מ"ג תמייסה
להרזה במחסנית מוכנה לשימוש.

מינוני אחזקה:

כמות?	מתי?	מינון אחזקה ראשונה
360 מ"ג	4 שבועות לאחר האחרונה (שבוע 12)	
360 מ"ג	כל 8 שבועות, החל לאחר המנת הראשונה	

אם שחתה להזריק סקייריזי
אם שחתה או פספסת את התורף לקבלת אחות מהזריקות
שלך, פונה לרופא שלך לקיבוע תורף חדש מיד שנוכחת.
יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא.

גם אם חל שיפור במצב בריאותך, אין להפסיק הטיפול
בתורפה ללא התיעצויות עם הרופא.

אם אתה מפסיק לשימוש בסקייריזי
אין להפסיק לשימוש בסקייריזי ללא התיעצויות תחילה
עם הרופא. אם תפסיק את הטיפול, התסמים שלך עלולים
לחזור.

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה
בכל עם שסתמה נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם
אתה זקוק להם.
אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתורפה,
היויעץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בסקייריזי עלול לגרום לתופעות
ללאוורן בחלק המהשכנותים. אל תיבהל למקרא רשות
תופעות הללו. ייתקן ולא תסבול מכך אחת מהן.

תופעות לוואי חמורות

עליך לשוחח עם הרופא או פנו ל佗ריה על עצורה רפואייה באופן
מיידי אם יש לך טסמן של יהום חמור, כגון:

- חום, טסמינים דמיורי שפעת, כאב שיניים חריף
- עורם חם, אדום וכואב, או פירחה כואבת בעור עם
שלפוחיות

הרופא שלך יחוליט אם תוכל להמשיך לשימוש בסקייריזי.

תופעות לוואי נספות

ספר לרופא שלך אם מופיעעה אחת מתופעות הללו
שאנו מודע לך:

ב- 1-10 משרותם מותוך (common):
• תופעות לוואי שכיחות (common) (every common):

• זהותיים במעטפת הגשיה העליונה המלווה בתסמים

כגון כאב גרון וגודש באף

• תופעות לוואי עייפות

• זיהום פטריריאטי בעור

• גרד

• כאב ראש

ב- 1-10 משרותם מותוך (uncommon):
• תופעות לוואי קטניות, אדרומות ומורחות על העור

אם הופיעה תופעה לוואי, אם אתה מותענת ממה שאל
מחמירה או כאשר אתה סובל ממה שאל תהייעץ עם הרופא
כגינה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

5. איך לאחסן את התורפה?

נתן לך על תופעות לוואי ייחודיים המבאים לאחסנות
להחשה על הקישור "דוחות על תופעות לוואי" ערך בטוףול
תרופתי" שנמצא בדף הבית שלך תרופה על
(www.health.gov.il) המפנה לך למידע רפואייה.

תופעות לוואי, או ע"י כניסה ליקנית.

<https://sideeffects.health.gov.il>

6. מידע נוסף

מה סקייריזי מכילה

נסוף על החומר הפעיל, התורפה מכילה גם:

Trehalose dihydrate, sodium acetate trihydrate,
polysorbate 20, acetic acid glacial and water for
injection.

כיצד נರאית התורפה ומה תוכנן הארידזין

סקייריזי ריאני הוא מינוח עבורי ולילדים ומתבגרים מתחלת גיל
16 שנים. לא קיימים מידע לגבי בטיחות ויעילות השימוש
בסקייריזי עבור ילדים ומתבגרים מתחלת גיל 16.

אינטראקציות/תגובה בין תרופויות:

אם אתה לווק, או אם לך מחלת קrhohn, תרופה אחרת
כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך
לרופא או לרוקח.

במיוחד אם קיבלת לאחרונה או אתה
עד מהלך הרווחה, עליך להימנע מהשימוש בסקייריזי.

אם ידוע לך סקייריזי מופרשת לחבל אם. ספרו לרופא
שלך אם הירך מניקה או מתכנתה להניק לפני השימוש
בתורפה זו.

7. מינונים התחלתיים

מינונים התחלתיים:

</

The following information is intended for healthcare professionals only

Traceability

In order to improve the traceability of biological medicinal products, the tradename and the batch number of the administered product should be clearly recorded.

Instructions for intravenous induction dosing regimen

1. Skyrizi should be prepared by a healthcare professional using aseptic technique.
2. Skyrizi medicinal product must be diluted before administration.
3. Skyrizi for intravenous administration must be diluted into an infusion bag containing 5% dextrose in water (D5W) IV infusion bag or glass bottle (600 mg/10 mL in 100 mL, 250 mL or 500 mL) to a final drug concentration of approximately 1.2 mg/mL to 6 mg/mL.
4. The solution in the vial and dilutions should not be shaken.
5. Prior to the start of the intravenous infusion, the content of the infusion bag or glass bottle should be at room temperature.
6. Infuse the diluted solution over a period of at least one hour. The infusion should be completely administered within 8 hours of the dilution in the infusion bag.
7. Skyrizi vial solution should not be administered concomitantly in the same intravenous line with other medicinal products.

Each vial is for single use only and any unused medicinal product or waste material should be disposed of in accordance with local requirements.

Storage of diluted solution:

The prepared infusion should be used immediately. If not used immediately, the diluted Skyrizi solution can be stored (protected from light) for up to 20 hours between 2°C to 8°C. Subsequently, the diluted Skyrizi solution can be stored (protected from direct and indirect sunlight) for 8 hours at room temperature after dilution (cumulative time after preparation including the storage and infusion period). Do not freeze.