

Instructions for use
GONAL-f®
pre-filled pen

300 IU/0.5 mL

450 IU/0.75 mL

900 IU/1.5 mL

Follitropin Alfa



تعليمات الاستعمال

جونال - إف®

قلم جاهز للحقن

הוראות שימוש

جونال-اف®

عط מוכן להזרקה

MERCK

معلومات هامة عن جونال - إف قلم جاهز للحقن	52
كيفية استعمال مفكرة العلاج بجونال - إف قلم جاهز للحقن	54
تعرف على جونال - إف قلم جاهز للحقن	56
المرحلة ① جاهزي المعدات.....	57
المرحلة ② استعدّي للحقن.....	58
المرحلة ③ صلي الإبرة.....	59
المرحلة ④ اضبطي المقدار الدوائي.....	64
المرحلة ⑤ احقني المقدار الدوائي.....	66
المرحلة ⑥ انزععي الإبرة بعد كل عملية حقن.....	68
المرحلة ⑦ بعد الحقن.....	69
المرحلة ⑧ احفظي جونال - إف قلم جاهز للحقن.....	70
مفكرة العلاج بجونال - إف قلم جاهز للحقن	72

لتبسيط وتسهيل القراءة، تمت صياغة تعليمات الحقن هذه بصيغة المؤنث. مع هذا فالدواء معدّ لكلا الجنسين.

معلومات هامة عن جونال - إف قلم جاهز للحقن

- اقرأي تعليمات الاستعمال ونشرة المستهلك قبل استعمال جونال - إف.
- تصرّفي دائمًا بحسب تعليمات الاستعمال هذه وبحسب الإرشادات التي أعطيت لك من قبل الطاقم الطبي، حيث قد تكون مختلفة عن تجربتك السابقة. تتيح لك هذه المعلومات إمكانية تفادى العلاج الخاطئ أو العدوى (التلوّث) نتيجة للوخز بالإبرة أو لإصابة بسبب زجاج مكسور.
- قلم جونال - إف مخصص للحقن تحت الجلد فقط.
- استعملني قلم جونال - إف فقط إذا قام الطاقم الطبي بإرشادك إلى كيفية استعماله بصورة صحيحة.
- سيقوم الطاقم الطبي بإبلاغك كم قلما من جونال - إف ستحتاجين من أجل إكمال العلاج.
- احقني الدواء في نفس الساعة من كل يوم.

- تمثل الأرقام الظاهرة في نافذة عرض المقدار الدوائي (الجرعة) عدد الوحدات الدولية (IU) وتعرض جرعة فوليتروپين ألفا. سيقول لك الطاقم الطبي كم وحدة دولية من فوليتروپين ألفا يجب حقنها في كل يوم.



الرسم 1



الرسم 2



الرسم 3

- تساعدك الأرقام الظاهرة في نافذة عرض المقدار الدوائي على:

أ. ضبط المقدار الدوائي الذي وصف لك (الرسم 1)

ب. التأكد من إجراء حقن كامل (الرسم 2)

ج. قراءة المقدار الدوائي المتبقى للحقن بواسطة قلم إضافي (الرسم 3)

- انزعِي الإبرة عن القلم فوراً بعد كل عملية حقن.

لا يجوز إعادة استعمال الإبر.

لا يجوز مشاركة القلم وأدوات الإبر مع شخص آخر.

لا يجوز استعمال قلم جونال - إف إذا سقط، تصدع أو تعرض للضرر لأن ذلك قد يسبب الإصابة.

كيفية استعمال مفكرة العلاج بـ جونال - إف قلم جاهز للحقن

مفكرة العلاج موجودة في الصفحة الأخيرة من تعليمات الاستعمال.

استعمل مفكرة العلاج لتوثيق الكمية التي تم حقنها. قد يؤثر حقن كمية غير صحيحة من الدواء على علاجك.

- وثقي رقم يوم العلاج (العمود 1)، التاريخ (العمود 2)، ساعة الحقن (العمود 3) وحجم القلم (العمود 4).
- وثقي المقدار الدوائي الذي وصف لك (العمود 5).
- تأكدي من أنك تضبطين المقدار الدوائي الصحيح قبل الحقن (العمود 6).
- بعد الحقن، اقرأي الرقم الظاهر في نافذة عرض المقدار الدوائي.
- تأكدي من أنك أخذت حقنة كاملة (العمود 7) أو سجلي الرقم الظاهر في نافذة عرض المقدار الدوائي إذا كان مختلفاً عن الرقم "0" (العمود 8).
- عند الحاجة، احقني نفسك بواسطة قلم إضافي، اضبطي المقدار الدوائي المتبقى الظاهر في القسم "الكمية التي يجب ضبطها لعملية الحقن التالية" (العمود 8).
- وثقي هذا المقدار الدوائي المتبقى في البند "الكمية المضبوطة للحقن" (العمود 6) في السطر التالي.
يتيح لك استعمال مفكرة العلاج لتوثيق عمليات الحقن اليومية إمكانية التأكد في كل يوم من أنك تلقيت المقدار الدوائي الكامل الذي تم وصفه لك.

نموذج لمفكرة علاج بواسطة قلم 450 وحدة دولية/0.75 مل:

تعرف على جونال - إف قلم جاهز للحقن



المراحل ① جهز المعدات



1.1. اتركي القلم في درجة حرارة الغرفة لمدة 30 دقيقة قبل الاستعمال، لتنحي للدواء إمكانية الوصول لدرجة حرارة الغرفة.

لا تستعمل الميكرو-ويف أو أي جسم تسخين آخر لتسخين القلم.

1.2. جهز سطحاً نظيفاً ومستوياً، مثل طاولة أو سطح حجر (شايش) في مكان جيد الإنارة. الرسم 4



الرسم 5



الرسم 6

• إسفنجة كحول وحاوية للأغراض الحادة (الرسم 4).

1.4. اغسل يديك بالصابون والماء وجففيهما جيداً (الرسم 5).

1.5. استعمل يدك لإخراج قلم جونال - إف من العبوة.

لا تستعمل أي أدوات، قد يسبب استعمال الأدوات الضرر للقلم.


1.6. افحصي الاسم على القلم: "Gonal-f".

1.7. افحصي تاريخ الصلاحية على ملصقة القلم (الرسم 6).


لا تستعمل قلم جونال - إف إذا انقضى تاريخ الصلاحية أو إذا لم يكن مكتوباً عليه

"Gonal-f"

المراحل ② استعدّي للحقن



الرسم 8



الرسم 7



الرسم 9

. 2.1. اسحبِي وانزعِي غطاء القلم (الرسم 7).

. 2.2. تأكدي من أن الدواء شفاف، لا لون له ولا يحتوي على جزئيات.

لا يجوز استعمال القلم إذا تغيّر لون الدواء أو إذا كان الدواء معكراً لأن ذلك قد يسبب التلوث.

. 2.3. تأكدي من أن نافذة عرض المقدار الدوائي مضبوطة على "0" (الرسم 8).

اختاري منطقة الحقن:

. 2.4. يجب على الطاقم الطبي أن يريكم مناطق الحقن الممكن استعمالها حول منطقة البطن (الرسم 9). للحدّ من تهيج الجلد، اختاري منطقة حقن مختلفة في كل يوم.

. 2.5. نظفي الجلد في منطقة الحقن من خلال مسحه بواسطة إسفنجية الكحول.

لا تلمسِي أو تغطي الجلد الذي قمت بتنظيفه.



الرسم 10



الرسم 11

هام: التزمي دائماً باستعمال إبرة جديدة لكل عملية حقن. قد تؤدي إعادة استخدام الإبر لحصول عدوى (تلوث).

- .3.1. خذى إبرة جديدة. استخدمي فقط الإبر "للاستعمال مرة واحدة" التي تم تزويدها.
- .3.2. تأكدي من أن غطاء الإبرة الخارجي ليس متضرراً.
- .3.3. أمسكي غطاء الإبرة الخارجي بقوّة.
- .3.4. تأكدي من أن لسان الإغلاق المحكم القابل للنزع الموجود على غطاء الإبرة الخارجي غير متضرر أو مرتخٍ، وأن تاريخ الصلاحية لم ينقض بعد (الرسم 10).
- .3.5. انزعى لسان الإغلاق المحكم (الرسم 11).

لا يجوز استعمال إبرة إذا كانت متضررة، منتهية الصلاحية أو إذا كان غطاء الإبرة الخارجي أو لسان الإغلاق المحكم متضررين أو مرتخين. قد يؤدي استعمال إبرة منتهية الصلاحية أو إبر ذات لسان إغلاق محكم أو غطاء خارجي متضررين، إلى حالات عدوى. إرميها في حاوية النفايات الحادة وخذى إبرة جديدة.



الرسم 12



الرسم 13



الرسم 14



الرسم 16

.3.6. ثبتي غطاء الإبرة الخارجي على الطرف اللولبي (البرغي) من قلم جونال - إف إلى أن تشعر بمقاومة خفيفة (الرسم 12).

لا تقومي بثثبيت الإبرة أقوى مما يجب، قد يكون من الصعب نزع الإبرة بعد الحقن.

.3.7. انزعي غطاء الإبرة الخارجي من خلال شدّه بلطف للخارج (الرسم 13).

.3.8. ضعيه جانبا لإعادة استعماله لاحقا (الرسم 14).


لا يجوز رمي غطاء الإبرة الخارجي، لأنه يمنع الوخز والعدوى عند فصل الإبرة عن القلم.

.3.9. أمسكي قلم جونال - إف بحيث تكون الإبرة متوجهة للأعلى (الرسم 15).

.3.10. انزعي وaci الإبرة الداخلي الأخضر بلطف وتخصي منه (الرسم 16).

لا تغطي الإبرة مجدداً بواسطة وaci الإبرة الداخلي الأخضر، لأن ذلك قد يؤدي للوخز والعدوى (التلوث).


3.11. انظري عن قرب إلى طرف الإبرة وابحثي عن قطرات صغيرة من السائل.



الرسم 17


إذا	عندما
كنت تستخدمين قلماً جديداً	افحصي إذا كانت هناك قطرة سائل في طرف الإبرة (الرسم 17). • إذا رأيت قطرة سائل صغيرة، استمر ل المرحلة 4 أضبطي المقدار الدوائي. • إذا لم ترى قطرة صغيرة في طرف الإبرة أو بقربها، عليك القيام بالمراحل التي في الصفحة التالية من أجل إخراج الهواء من الجهاز.
كنت تستخدمين القلم مجدداً	لا حاجة لفحص قطرة السائل. استمر مباشرة ل المرحلة 4 أضبطي المقدار الدوائي.

إذا لم تشاهد قطرة/ قطرات صغيرة من السائل على طرف الإبرة في أول مرة تستخدمن فيها قلماً جديداً:




الرسم 18

1. قومي بلف زر ضبط المقدار الدوائي بلطف إلى الأمام إلى أن يظهر "25" في نافذة عرض المقدار الدوائي (الرسم 18).
 - يمكنك لف زر ضبط المقدار الدوائي للخلف إذا تجاوزت القيمة "25".



الرسم 21



الرسم 20



الرسم 19

- 2.** أمسكي القلم بحيث تكون الإبرة متّجهة للأعلى.
- 3.** انقري بلطف على خرطوشة مخزون الدواء (الرسم 19).
- 4.** اضغط على زر ضبط المقدار الدوائي قدر الإمكان. ستظهر قطرة سائل في طرف الإبرة (الرسم 20).
- 5.** افحصي إن كان الرقم "0" يظهر في نافذة عرض المقدار الدوائي (الرسم 21).
- 6.** استمري للمرحلة 4 اضبطي المقدار الدوائي.

إذا لم تظهر قطرة سائل صغيرة، تواصلبي مع الطاقم الطبي.

المرحلة ④ اضبطي المقدار الدوائي

ملاحظة:


يأتي القلم بثلاثة أشكال مختلفة متعددة المقادير الدوائية:

- قلم جونال - إف الذي يحتوي على **300 وحدة دولية** من فوليتروبين ألفا.
أقصى جرعة يمكنك ضبطها هي 300 وحدة دولية.
- قلم جونال - إف الذي يحتوي على **450 وحدة دولية** من فوليتروبين ألفا.
أقصى جرعة يمكنك ضبطها هي 450 وحدة دولية.
- قلم جونال - إف الذي يحتوي على **900 وحدة دولية** من فوليتروبين ألفا.
أقصى جرعة يمكنك ضبطها هي 450 وحدة دولية.
- أقل جرعة يمكنك ضبطها هي 12.5 وحدة دولية، يمكن لف زر ضبط الجرعة بفارق تبلغ 12.5 وحدة دولية.

4.1

قومي بلف زر ضبط المقدار الدوائي إلى أن تظهر الجرعة المرغوب بها في نافذة عرض المقدار الدوائي.

- مثال: إذا كانت الجرعة المرغوب بها هي "150" وحدة دولية، تأكدي من أن نافذة عرض المقدار الدوائي تريك "150" (الرسم 22). قد يؤثر حقن مقدار دوائي غير صحيح من الدواء على علاجك.



الرسم 23



الرسم 22

- بالإمكان لف زر ضبط المقدار الدوائي للخلف إذا قمت بلفه أكثر من المقدار الدوائي المرغوب به (الرسم 23).

- قومي بلف زر ضبط المقدار الدوائي إلى الأمام (الرسم 22).

4.2

تأكد من أن نافذة عرض المقدار الدوائي تظهر الجرعة الكاملة التي تم وصفها لك قبل أن تنتقل إلى المرحلة التالية.

المراحل ٥ احقني المقدار الدوائي



الرسم 24

هام: احقني المقدار الدوائي كما شرح لك الطاقم الطبي.
5.1. أدخل الإبرة كاملة، ببطء، داخل الجلد (الرسم 24).



الرسم 25

5.2. ضعي الإبهام وسط زر ضبط المقدار الدوائي. اضغط ببطء على زر ضبط المقدار الدوائي للأسفل، قدر الإمكان، وأبقيه هكذا من أجل إتمام الحقن بالكامل (الرسم 25).

ملاحظة: كلما كان المقدار الدوائي أكبر، تكون هناك حاجة لوقت أطول للحقن.


5.3

أبقي زر ضبط المقدار الدوائي مضغوطاً للأسفل لمدة 5 ثوانٍ على الأقل (5s) قبل أن تخرج الإبرة من الجلد (الرسم 26).



الرسم 26

- سيعود الرقم الظاهر في نافذة عرض المقدار الدوائي إلى "0".
- بعد 5 ثوانٍ على الأقل، اسحب الإبرة لخارج الجلد مع الإبقاء على زر ضبط المقدار الدوائي مضغوطاً (الرسم 27).
- عندما تصبح الإبرة خارج الجلد، حرّري زر ضبط المقدار الدوائي.



الرسم 27

لا تحرّري زر ضبط المقدار الدوائي قبل أن تخرج الإبرة من الجلد.

المرحلة ⑥ انزعجي الإبرة بعد كل عملية حقن




الرسم 28



الرسم 29



الرسم 31



الرسم 30

.6.1. ضعي غطاء الإبرة الخارجي على سطح مستو.

.6.2. أمسكي قلم جونال - إف بقوّة بإحدى اليدين، وأدخل الإبرة لداخل غطاء الإبرة الخارجي بسلامة (الرسم 28).

.6.3. واصلّي دفع الإبرة المغطاة باتجاه السطح الثابت إلى حين سماع نقرة "كليك" (الرسم 29).

.6.4. أمسكي غطاء الإبرة الخارجي وحرّري الإبرة من خلال لفّها بالاتجاه العكسي (الرسم 30).

.6.5. تخلّصي من الإبرة المستعملة بصورة آمنة في حاوية للأغراض الحادة (الرسم 31). تعاملّي مع الإبرة بحذر، لتفادي الإصابة بسبب الإبرة.

لا يجوز إعادة استعمال الإبرة أو مشاركة إبرة مستعملة.



الرسم 32



الرسم 33

7.1. تأكدي من أنك تلقيت حقنة كاملة:

- تأكدي من أن الرقم "0" يظهر في نافذة عرض المقدار الدوائي (الرسم 32).
إذا ظهر في نافذة عرض المقدار الدوائي الرقم "0"، فقد أكملت المقدار الدوائي.
إذا ظهر في نافذة عرض المقدار الدوائي رقم أكبر من "0"، يكون قلم جونال - إف فارغاً. لم تكمل المقدار الدوائي الكامل الذي تم وصفه لك، وعليك القيام بالمرحلة 7.2 أدناه.


7.2. أكملي الحقن الجزئي (عند الحاجة فقط):

- تظهر في نافذة عرض المقدار الدوائي الكمية الناقصة التي يجب عليك حقنها بواسطة قلم جديد. في المثال المعروض، الكمية الناقصة هي "50" وحدة دولية (الرسم 33).

- من أجل إكمال المقدار الدوائي بواسطة القلم الثاني، كرّري المراحل

.1-8

المراحل ⑧ احفظي جونال - إف قلم جاهز للحقن



الرسم 34

.8.1. أعيدي غطاء القلم إلى مكانه لتفادي العدوى (الرسم 34).

.8.2. احفظي القلم في عبوته الأصلية في مكان آمن، وبحسب ما هو مذكور في نشرة المستهلك.

.8.3. عندما يصبح القلم فارغاً، اسأل الطاقم الطبي عن كيفية التخلص منه.

لا يجوز حفظ القلم بحيث تكون الإبرة ما تزال موصولة، لأن ذلك قد يسبب العدوى.

لا يجوز إعادة استعمال قلم جونال - إف إذا سقط، تصدع أو تعرّض للضرر لأن ذلك قد يسبب الإصابة.

إذا كانت لديك أسئلة، توجهي للطاقم الطبي.

مفكرة العلاج بـ جونال - إف قلم جاهز للحقن

1 رقم يوم العلاج	2 التاريخ	3 ساعة الحقن	4 حجم القلم (IU) <small>300 IU/0.5 mL 450 IU/0.75 mL 900 IU/1.5 mL</small>	5 المقدار الدوائي الموصوف	6 الكمية المضبوطة للحقن	7 نافذة عرض المقدار الدوائي	8 الكمية التي يجب ضبطها لعملية الحقن الثانية
							
	:	/				<input type="checkbox"/> إذا لم يكن "0"، احقني الكمية تم إكمال الحقن بواسطة قلم جديد	<input type="checkbox"/> إذا كان "0"، تم إكمال الحقن
	:	/				<input type="checkbox"/> إذا لم يكن "0"، احقني الكمية تم إكمال الحقن بواسطة قلم جديد	<input type="checkbox"/> إذا كان "0"، تم إكمال الحقن
	:	/				<input type="checkbox"/> إذا لم يكن "0"، احقني الكمية تم إكمال الحقن بواسطة قلم جديد	<input type="checkbox"/> إذا كان "0"، تم إكمال الحقن
	:	/				<input type="checkbox"/> إذا لم يكن "0"، احقني الكمية تم إكمال الحقن بواسطة قلم جديد	<input type="checkbox"/> إذا كان "0"، تم إكمال الحقن
	:	/				<input type="checkbox"/> إذا لم يكن "0"، احقني الكمية تم إكمال الحقن بواسطة قلم جديد	<input type="checkbox"/> إذا كان "0"، تم إكمال الحقن

<input type="checkbox"/> إذا لم يكن "0"، احقني الكمية بواسطة قلم جديد	<input type="checkbox"/> إذا كان "0"، تم إكمال الحقن				:	/
<input type="checkbox"/> إذا لم يكن "0"، احقني الكمية بواسطة قلم جديد	<input type="checkbox"/> إذا كان "0"، تم إكمال الحقن				:	/
<input type="checkbox"/> إذا لم يكن "0"، احقني الكمية بواسطة قلم جديد	<input type="checkbox"/> إذا كان "0"، تم إكمال الحقن				:	/
<input type="checkbox"/> إذا لم يكن "0"، احقني الكمية بواسطة قلم جديد	<input type="checkbox"/> إذا كان "0"، تم إكمال الحقن				:	/
<input type="checkbox"/> إذا لم يكن "0"، احقني الكمية بواسطة قلم جديد	<input type="checkbox"/> إذا كان "0"، تم إكمال الحقن				:	/
<input type="checkbox"/> إذا لم يكن "0"، احقني الكمية بواسطة قلم جديد	<input type="checkbox"/> إذا كان "0"، تم إكمال الحقن				:	/

تم تحرير تعليمات الحقن في تشرين الثاني 2022 وفق تعليمات وزارة الصحة.

GONAL-f
גונאל-פָּ



גונאל-פָּ
gonal-f

סולוציון ליניג'טן
לירוק גונאל-פָּ
Solution for injection in pre-filled pen

300 IU/0.5 mL 450 IU/0.75 mL

900 IU/1.5 mL

סולוציון ליניג'טן
לירוק גונאל-פָּ
gonal-f

N19Z1608H

