

بطاقة معلومات حول الأمان للمتعالج

ريمسيما 100 ملغ داخل الوريد إنفليكسيماب (Infliximab)

أظهر هذه البطاقة
لكل طبيب
يشارك بعلاجك.

تحتوي بطاقة المعلومات حول الأمان
للمتعالج على معلومات هامة حول
الأمان، عليك معرفتها قبل بدء العلاج
بـ ريمسيما 100 ملغ داخل الوريد،
وخلاله.

متعالج:

طبيب:

رقم الهاتف:

من المهم أن تكتب أنت وطبيبك الإسم التجاري
للدواء الذي تتلقاه وكذلك رقم التشغيلة
للمقدار الدوائي.

اسم المستحضر:

رقم التشغيلة:



تاريخ بدء العلاج بـ ريمسيما 100 ملغ داخل
الوريد:

تواريخ تلقي الدواء في الدورة الحالية:

عندما تبدأ ببطاقة جديدة، الرجاء إحفظ هذه
البطاقة لفترة أربعة شهور إضافية، لقراءتها
بتمعن إذا دعت الحاجة.

اقرأ بتمعن "نشرة المستهلك" لـ
ريمسيما 100 ملغ داخل الوريد قبل أن تبدأ
بإستعمال هذا الدواء.

ريمسيما 100 ملغ داخل الوريد عبارة عن
مستحضر مشابه حيوي. لمعلومات إضافية عن
المستحضرات المشابهة حيويًا يجب تصفح
موقع وزارة الصحة:

<https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/MTI/Drugs/Registration/Pages/Biosimilars.aspx>

إنّته، صادقت وزارة الصحة على إجراء تبديل
لمرة واحدة بين الدواء الأصلي وبين الدواء
المشابه حيويًا وبالعكس. يزودك الطبيب
بشرح عن الدواء ودلالة التبديل.

كل تبديل بدواء بيولوجي يجب أن يتم من قبل
الطبيب المعالج. الإسم التجاري للدواء الظاهر
في الوصفة الطبية يجب أن يكون مطابق
للإسم التجاري الظاهر على علبة الدواء التي
صرفت لك في الصيدلية. في أي حالة شك، يجب
التوجه للصيدلي أو للطبيب المعالج.

أطلب من طبيبك أن يوثق أدناه نوع وتاريخ
الفحص (الفحوص) الأخير (الأخيرة) للكشف
عن السل الذي/التي أجري/ت لك:

فحص: _____ / _____

تاريخ: _____ / _____

نتيجة: _____ / _____

قائمة تحسسات (أليرجيا) معروفة:

قائمة أدوية إضافية تتناولها:

تلوثات

قبل إستعمال ريمسيما

- إحك لطبيبك إذا كنت تعاني من أي تلوث.
- من المهم جداً أن تحك لطبيبك إذا أُصبت ذات مرة بمرض السل، أو إذا كنت على تماس قريب مع شخص مريض بالسل أو أُصيب في الماضي بالسل. سيفحصك الطبيب للتأكد فيما إذا كنت مصاباً بالسل. أطلب من طبيبك أن يوثق على بطاقتك نوع وتاريخ الفحص (الفحوص) الأخير (الأخيرة) للكشف عن السل الذي/ التي أُجري/ت لك.
- إحك لطبيبك إذا كنت مريضاً بالتهاب الكبد (hepatitis) من نوع B أو إذا كنت على علم أو إذا كنت تشك بأنك حامل للفيروس المسبب لهذا المرض.

خلال العلاج بـ ريمسيما

- بلغ الطبيب حالاً إذا كنت تعاني من علامات تلوث. هذه العلامات تشمل سخونة، إرهاق، سعال (متواصل)، ضيق تنفس، إنخفاض الوزن، تعرق ليلي، إسهال، جروح، مشاكل في الأسنان، الشعور بحرقة أثناء التبول أو علامات تشبه الإنفلونزا.

مشاكل في القلب

قبل إستعمال ريمسيما

- إحك للطبيب إذا كنت تعاني من مشاكل في القلب أياً كانت، مثل قصور القلب.
- خلال العلاج بـ ريمسيما
- بلغ طبيبك حالاً إذا كنت تلاحظ أعراضاً لمشكلة في القلب. هذه الأعراض تشمل ضيقاً في التنفس، إنتفاخ الرجلين أو تغيرات بنظم القلب.

الحمل واللقاحات

إذا تلقيت هذا الدواء خلال الحمل، فمن المهم إبلاغ الطاقم الطبي عن ذلك قبل أن يتلقى رضيعك أي لقاح. لا يجوز إعطاء "لقاح حي" لرضيعك خلال الـ 6 أشهر الأولى بعد الولادة. لا يجوز إعطاء رضيعك لقاح BCG (المخصص لمنع مرض السل)، خلال الـ 12 شهراً الأولى بعد الولادة.

يمكن أن تظهر الأعراض الجانبية بعد فترة طويلة من تلقيك المقدار الدوائي الأخير. بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "تبليغ عن أعراض جانبية عقب علاج دوائي" الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة www.health.gov.il الذي يوجهك إلى النموذج المباشر للتبليغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق تصفح الرابط:

<https://sideeffects.health.gov.il>

إضافة لذلك، بالإمكان تبليغ شركة باداجيس بواسطة العنوان التالي:

padagis.co.il

من أجل سهولة وتهوين القراءة، تمت صياغة هذه البطاقة بصيغة الذكر. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.

تمت المصادقة عليه من قبل وزارة الصحة في

نيسان 2023