

**ريبلوزيل® 25 ملخ
ريبلوزيل® 75 ملخ**

مسحوق تحضير محلول للحقن

المادة الفعالة وكميتها:

ريبلوزيل® 25 ملخ: تحتوي كل قبضة على 25 ملخ لوسياتيرسيبت (luspatercept) (luspatercept) 75 ملخ: تحتوي كل قبضة على 75 ملخ لوسياتيرسيبت (luspatercept) (luspatercept) بعد التحضير، يحتوي كل مل محلول على لوسياتيرسيبت (luspatercept) 50 ملخ

المواد غير الفعالة - انظر الفصل 6 "معلومات إضافية" والبند "معلومات مهمة عن قسم من مركيبات الدواء" في الفصل 2.

اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها وذلك قبل البدء باستعمال الدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا كانت لديك أسئلة إضافية، توجه إلى الطبيب أو الصيدلي.

ووصف هذا الدواء لعلاجك. لا تعطه لآخرين، لأنه قد يضرهم، حتى لو بدا لك تشابه بين حالتك الصحية وحالتهم.

بالإضافة إلى النشرة، هناك دواء ريبيلوزيل بطاقة للمعالجة (النساء القادرات على الحمل). تتضمن البطاقة معلومات أمان هامة عليك معرفتها قبل بدء العلاج بريبلوزيل وخلاله، والعمل بمحاجها. يجب مراعاة البطاقة للمعالجة (النساء القادرات على الحمل) والنشرة للمستهلك قبل البدء باستعمال المستحضر. يجب الاحتفاظ بالبطاقة لمراجعتها ثانية عند الحاجة.

1. لم أعد هذا الدواء؟

- ريبيلوزيل معد لعلاج المعالجين البالغين الذين لديهم فقر الدم المعتمد على تسلسليات متلازمات خلل التنسج الغ蓑ي (MDS) وتحتوي خطر منخفض جداً، منخفض أو متعدد، مع أرومة حديبة حقيقة، والذين استجابوا بشكل غير كاف أو أنهم غير قادرين على تلقى علاج يعتمد على الإريثروبيوتين.

- ريبيلوزيل معد لعلاج المعالجين البالغين الذين لديهم فقر الدم المعتمد على نقل الدم والمرتبط بيتا ثالسيمي.

المجموعة العلاجية: أدوية مضادة لفقر الدم

متلازمات خلل التنسج الغ蓑ي (MDS) متلازمات خلل التنسج الغ蓑ي (MDS) هي مجموعة كبيرة من اضطرابات مختلفة في الدم ونخاع العظم.

• تصبح خلايا الدم الحمراء غير سليمة ولا تتطور كما ينبغي.

• قد يعاني المرضى من بعض العلامات والأعراض التي تشمل تعداداً منخفضاً لخلايا الدم الحمراء (فقر الدم) وقد يحتاجون إلى تسلسليات خلايا دم حمراء.

بيتا ثالسيمي

بيتا ثالسيمي هي مشكلة في الدم تنتقل بالوراثة.

• إنها تؤثر في إنتاج الهيموغلوبين.

• قد يعاني المرضى من بعض العلامات والأعراض التي تشمل تعداداً منخفضاً لخلايا الدم الحمراء (فقر الدم) وقد يحتاجون إلى تسلسليات خلايا دم حمراء.

كيف يعمل الدواء

يحسن ريبيلوزيل قدرة جسمك على إنتاج خلايا الدم الحمراء. تحتوي خلايا الدم الحمراء على الهيموغلوبين، وهو يروي بنقل الأكسجين إلى كل أعضاء الجسم. كلما أنتج جسمك خلايا دم حمراء أكثر ترتفع مستويات الهيموغلوبين.

يمكن للعلاج بريبلوزيل أن يمنع أو يقلل الحاجة إلى تسلسليات خلايا الدم الحمراء.

• قد تؤدي تسلسليات من خلايا الدم الحمراء إلى مستويات مرتفعة وغير سليمة للحد في الدم وأعضاء مختلفة في الجسم. قد تسبب هذه الحالة ضرراً مع مرور الوقت.

2. قبل استعمال الدواء: يُمنع استعمال الدواء إذا:

• كانت لديك حساسية (أرجية) لللوسياتيرسيبت، أو لأحد المركبات الأخرى التي يحتوي عليها الدواء (كما هو مفصل في الفصل 6).

• كنت حاملاً (انظري البند "الحمل، الإرضاع والخصوصية").

تحذيرات خاصة المتعلقة باستعمال الدواء

قبل بدء العلاج بريبلوزيل، أخير الطبيب إذا:

• كنت تلقى علاج لديك بيتا ثالسيميما واجتنزت استعمال الطحال. قد تكون معرضاً لخطر من تغافل أكثر لخثرة الدم.

○ علاج هرموني بديل أو

○ خثرة دموية سابقة

قد يستعمل الطبيب وسائل وقائية أو أدوية لتقليل مخاطر تعرضك لخثرة دموية.

• كان لديك ذات مرة ضغط دم مرتفع - لأن ريبيلوزيل قد يسبب ارتفاع ضغط الدم. يُقاس ضغط دمك قبل أن تحصل على ريبيلوزيل وطوال العلاج. ستلتقي العلاج بريبلوزيل إذا كان ضغط دمك متوازناً فقط.

الأطفال والمرأهقون

هذا الدواء غير مخصص للأطفال والمرأهقين دون سن 18 عاماً.

الفحوصات والمتابعة

سوف تختار فحص م قبل أن تحصل على كل جرعة من ريبيلوزيل. وذلك، لأن على الطبيب أن يتأكد من أن مستوى الهيموغلوبين لديك ملائم لباقي العلاج.

إذا كنت تعاني من مشاكل في الكلى فقد يجري الطبيب فحوصات إضافية.

التقاعلات/رود الفعل بين الأدوية

إذا كنت تتناول، تناولت، تناولت موخرًا، أو قد تتناول أدوية أخرى، بما فيها أدوية دون وصفة طبية ومكملات غذائية، أخير الطبيب أو الصيدلي بذلك.

الحمل، الإرضاع والخصوصية

• يُمنع استعمال ريبيلوزيل خلال الحمل ولمدة 3 أشهر على الأقل قبل بدء الحمل. قد يلحق ريبيلوزيل ضرراً بالجنين.

• يجري لك الطبيب فحص حمل قبل أن تبدأي بالعلاج.

• إذا كنت تظنين أنك حامل أو كنت تخططين للحمل، استشيري الطبيب قبل استعمال الدواء.

الإرضاع

• لا يجوز لك الإرضاع أثناء استعمال الدواء ولمدة 3 أشهر بعد الجرعة الأخيرة. ليس معروفاً فيما إذا كان الدواء ينتقل إلى حليب الأم.

وسائل منع الحمل

• عليك استعمال وسيلة منع حمل ناجحة أثناء العلاج بريبلوزيل، ولمدة 3 أشهر على الأقل بعد الجرعة الأخيرة.

تحتفي الطبيب عن وسائل منع الحمل الملائمة لك خلال استعمال ريبيلوزيل.

الخصوصية

إذا كنت امرأة، فقد يؤدي هذا الدواء إلى مشاكل في الإخصاب. وهو قد يؤثر في قدرتك على الحمل. استشيري الطبيب قبل استعماله.

السيارة واستعمال الماكينات

قد يكون هناك تأثير قليل لريبلوزيل على القدرة على السيارة وتشغيل الماكينات. وربما يتضرر رد الفعل عند القيام بهذه الخطوات لأنك قد تشعر بالتعب، الدوار أو قد تتعرض للإغماء خلال استعمال ريبيلوزيل. إذا حدث ذلك فلا تقد سيارة أو تستعمل أدوات أو ماكينات وأنصت بالطبيب فوراً.

معلومات مهمة عن قسم من مركيبات الدواء

تحتفي الطبيب عن ملجم الصوديوم (23 ملغراماً) في الجرعة، لهذا يعتبر "خلايا من الصوديوم".

3. كيف تستعمل الدواء؟

يجب استعمال الدواء دائمًا حسب تعليمات الطبيب.

عليك أن تفحص مع الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكداً فيما يتعلق بالجرعة وطريقة العلاج بالدواء.

قبل أن تحصل على الدواء، يجري الطبيب فحوصات دم ويقرر إذا كان يتعين عليك تلقى ريبيلوزيل.

يُعطى ريبيلوزيل بحقنة تحت الجلد (الاستعمال تحت الجلد).

الجرعة وطريقة العلاج بحدهما الطبيب فقط. الجرعة الموصى بها عادة هي:

تعتمد الجرعة على وزنك - بالكيلوغرامات. يعطي طبيب أو ممرضة الخطة.

• الجرعة الافتراضية الموصى بها هي 1.0 ملخ لكل كغم وزن الجسم.

• يجب إعطاء هذه الجرعة كل 3 أسابيع.

• يفحص الطبيب تقدمك، وقد يغير الجرعة وفق الحاجة.

يرصد الطبيب ضغط دمك أثناء استعمال بريبلوزيل.

متلازمات خلل التنسج الغ蓑ي

جرعة قصوى واحدة مقدارها 1.75 ملخ لكل كغم وزن الجسم.

بيتا ثالسيمي

جرعة قصوى واحدة مقدارها 1.25 ملخ لكل كغم وزن الجسم.

يُمنع تجاوز الجرعة الموصى بها.

إذا حققت جرعة أعلى عن طريق الخطأ أو إذا ابتلع طفل من الدواء عن طريق الخطأ، تحدث فوراً مع الطبيب أو توجهه فوراً إلى غرفة الطوارئ في المستشفى. خذ معك عبوة الدواء وهذه النشرة.

إذا نسيت استعمال جرعة من الدواء، فإذا تقطعت حقنة ريبيلوزيل أو إذا تأخر الدور، ستحصل على حقنة ريبيلوزيل في أسرع وقت ممكن. بعد ذلك، ستظل جرعة فارغة كما تم وصفها لك - بفارق 3 أسابيع، على الأقل، بين الجرعات.

يجب الدوامة على العلاج حسب توصية الطبيب.

حتى إذا طرأ تحسن على حالتك الصحية، لا يجوز لك التوقف عن استعمال الدواء من دون استشارة الطبيب.

يُمنع تناول الأدوية في الظلام! تتحقق من المقص على عبوة الدواء ومن الجرعة الدوائية في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا كنت بحاجة إليها.

إذا كانت لديك أسئلة إضافية تتعلق باستعمال الدواء، استشيري الطبيب أو الصيدلي.

4. الأعراض الجانبية

مثل أي دواء، يمكن أن يسبب استعمال ريبيلوزيل أعراضًا جانبية لدى بعض المستخدمين. لا تفزع عند قراءة قائمة الأعراض الجانبية.

آخر الطبيب أو الصيدلي فوراً إذا لاحظت الأعراض التالية:

• صعوبة في المشي أو الكلام، دوخة، فقدان التوازن والتباكي، نقص الإحساس أو شلل الوجه، الساق أو الذراع (يحدث أحياناً في جانب واحد من الجسم)، وضبابية في الرؤية. قد تكون كل هذه الأعراض أعراضًا لسكتة دماغية.

• انتفاخ مصحوب بالدوار وشعور بالضغط في الرجل أو اليد (خثرات دموية).

• تورم في المنطقة حول العينين، الوجه، الشفتين، الفم، اللسان أو الحجرة.